Genera

rem. Hipochoeris. Lapsana. Rhagadiolus. Tragopogon.

NOMENCLATOR EX *HISTORIA* PLANTARUM INDIGENARUM HELVETIAE EXCERPTUS

AUCTORE

ALBERTO v. HALLER.

BERNÆ.

Sumptibus SOCIETATIS TYPOGRAPHICÆ.
1769.

AUCTORIS

PRAEFATIO.

CUM nuper majorem Stirpium Helveticarum Hiſtoriam ederem, facile vidi, plurimos rei herbariae Cultores ejus Operis, ut amplioris & pretio ſuo incommodi, uſu carituros, tirones etiam potiſſimum. Quare, ut etiam qui bibliothecam botanicam nolunt colligere, ſtirpes beatae Patriae

 meae

meae in ſuis per agros, ſylvas & Alpes excurſionibus in numerato habeant, decerpſi de tribus illis voluminibus ſola nomina mea, eorumque cuique nomen boni Auctoris addidi, in quo tiro iconem, aut certe deſcriptionem inveniat, quae ad cognoſcendam plantam ſufficiat. Signum † indicat plantam, cui praefigitur, in LINNÆI libris, hactenus editis, non reperiri. Nomina paſſim leviter emendavi, numeri tamen iidem ſunt, qui in majori opere. Iterum vale LECTOR BENEVOLE, & decedenti de theatro actori fave.

BERNÆ 8. Jun. 1768.

I. PLANTÆ STAMINIBUS PRÆDITÆ.

I. ET PETALIS.

I. FLORE COMPOSITO.

I. PLANIPETALÆ.

I. PLACENTA SQUAMOSA.

1. CICHOREUM foliis pinnatis, pinnis triangularibus dentatis, floribus sessilibus. *Cichoreum sylvestre* BLAKWELL. t. 183. Ad vias.

2. HYPOCHOERIS caule unifloro, foliis dentatis hirsutis Hist. t. 1. *Hieracium I. latifolium hirsutum incanum, flore magno* I. R. H. In pratis alpinis.

3. HYPOCHOERIS foliis semipinnatis hirsutis, caule nudo, brachiato. *Hieracium tertium* DODON. p. 639. In herbosis sylvarum.

3*. HYPOCHOERIS foliis glabris semipinnatis. *Hypochoeris porcellia* TABERN. p. 179. In agris rarior.

I. I. I. I. PLACENTA NUDA.

4. LAPSANA foliis ovatis, dentatis, caulibus nudis, sub flore tumentibus. *Hyoseris angustifolia* TABERN. p. 180. In agris submontanis, rarior.

5. LAPSANA caule nudo indiviso, foliis semipinnatis, pinnis retroversis, dentatis. *Leontodoides alpinus glaber, Erysimi folio, radice crassa, fœtida* MICHEL. *nov. gen.* p. 31. t. 28. In umbrosis sylvarum alpinarum.

6. LAPSANA caule brachiato, foliis ovatis, longe petiolatis, petiolis pinnatis. *Lampsana* DODON. p. 675. In sylvis cæduis & ruderosis.

Lapsana Rhad. 7. RHAGADIOLUS foliis femipinnatis afperrimis. *Hieracium parvum, hirtum, caule aphyllo, criſpum quando ſiccatum* I. B. II. p. 1038. Ad pedem M. *Saleva.*

Tragop. pratense 8. TRAGOPOGON foliis gramineis, carinatis, amplexicaulibus, caudatis, fubcrifpis, calyce flori æquali. *Tragopogon ſ. barbula hirci*, CAMERAR. *Epit.* p. 313. In pratis.

majus 9. TRAGOPOGON foliis gramineis amplexicaulibus, calyce florem fuperante. *Barba hirci altera*, CAMERAR. *Epit.* p. 313. Ad pedem alpium occidentalium, auftrum fpectante: in pratis.

10. SCORZONERA caule nudo unifloro, foliis lanceolatis †. In rupibus occidentalibus.

11. SCORZONERA caule nudo unifloro, foliis linearibus. *Scorzonera humilis anguſtifolia* CLUS. *Pannon.* p. 656. 657. Similibus locis, rarior.

12. SCORZONERA caule foliofo, ramofo, foliis anguftiffimis, imis rariter femipinnatis, fuperioribus linearibus, lanceolatis. *Tragopogon laciniatis foliis* COLUMN. *phytobaſ.* P.II. p.21. Ad vias *Valeſiæ.*

13. LACTUCA foliis imis femipinnatis, fuperioribus amplexicaulibus, hamatis, nervo fpinofo. *Lactuca ſylveſtris anguſto ſaligno folio*, &c. RUPP. edit. noftr. p. 207. t. 4. In agris circa pontem *Birſæ*, Bafileæ.

14. LACTUCA foliis femipinnatis, nervo fpinofo. *Lactuca ſylveſtris coſta ſpinoſa* C. B. In calidioribus ad vias.

15. LACTUCA foliis ovatis, patulis, nervo fpinofo. *Lactuca ſylveſtris latifolia, odore viroſo* I. B. II. p. 1002. Genevæ.

16. LACTUCA foliis glabris, pinnatis, caule brachiato. *Chondrilla cærulea* TABERNÆM. p. 176. In rupibus calidioribus.

17. CHONDRILLA. *Juncea viminea arvenſis* TABERNÆMONT. p. 178. In agris calidis.

18. PRENANTHES foliis ferratis, pinnatis, pinna fuprema triangulari, trilobata. *Sonchus levior vulgaris II.* CLUS. *hiſt.* L. XVI. In muris.

19. PRENANTHES foliis amplexicaulibus, petiolatis, lanceolatis, ferratis. *Sonchus levis purpureus tetrapetalos* COLUMN. p. 244. 246. Sylvæ montanæ.

20. SON-

20. SONCHUS foliis amplexicaulibus, petiolatis, triangularibus, petiolo pinnato, floribus ſpicatis. *Sonchus levis cæruleo flore* CLUS. *Pannon.* p. 650. 651. alpinus, etiam montanus.

21. SONCHUS foliis amplexicaulibus, dentatis, integris & ſemipinnatis, calycibus levibus. *Sonchus levis latifolius* TABERNÆMONT. p. 190. & *anguſtifolius* p. 189. In runeroſis.

22. SONCHUS foliis amplexicaulibus, rigidis, integris & ſemipinnatis, dentatis, calycibus levibus. *Sonchus aſper* DODON. p. 693. *Sonchus aſper, laciniatus, latifolius* LOESEL. ic. 77. In ruderoſis.

23. SONCHUS foliis amplexicaulibus, ſemipinnatis, ſerratis, calycibus hiſpidis. *Hieracium majus* FUCHS p. 319. In agris.

24. PICRIS aſpera, foliis oblongis, dentatis, ſuperioribus amplexicaulibus. *Cichoreum luteum* TABERNÆM. p. 172. & *Hieracium intybaceum aſperum* EJ. p. 184. Ad agrorum limites.

25. PICRIS caule nudo, unifloro, foliis aſperis, dentatis. *Hieracium dentis leonis folio, caulibus aphyllis glabris* DILLEN. *E. N. C. Cent. VI. append.* p. 62. t. 9. In pratis & ſylvis.

26. PICRIS caule unifloro, foliis glabris, ſemipinnatis, calyce levi †. *Leontodon Danubiale* JACQUIN. *Vindob.* n. 69. In pratis humidis.

27. PICRIS caule hirſuto, unifloro, foliis glabris, ſemipinnatis, calycibus hirſutiſſimis. *Dens leonis alp. foliis oblongis, raro dentatis, calyce hiſpido nigreſcente* SEGUIER. *Supplem.* p. 266. Alpium editiorum.

28. PICRIS caule nudo, brachiato, foliis glabris ſemipinnatis. *Hieracium minus* FUCHS. p. 320. In gramineis & ſylvis.

29. CREPIS foliis ſcabris pinnatis, pinnis anguloſis, dentatis, retroverſis, extrema triangulari maxima. *Hieracium foliis Cichorei ſylveſtris, odore caſtorei* MAGNOL. *Bot. Monſp.* p. 129. In agris calidis & ad vias.

30. CREPIS foliis ſubſcabris, ſemipinnatis, pinna extrema maxima. *Hieracium Erucæ folio ſubhirſutum* I. B. II. p. 1025. In pratis & agris.

31. CREPIS foliis radicalibus pinnatis, supernis amplexicaulibus, pinatis, hastatis. *Hieracium aliis Cichorium luteum hirsutum* I.B.II p. 1024. In agris & pratis.

β. CREPIS foliis linearibus integerrimis. Alpina.

32. CREPIS calycibus muricatis Cl. LA CHENAL †. Basileæ ad sepes.

33. CREPIS caule ramosissimo, foliis glaberrimis, integris & dentatis. *Hieracioides Endiviæ folio, flore minimo, folio inciso* VAILLANT. Locis aridis, & ad rudera.

34. HIERACIUM foliis linearibus, subdentatis, sparsis, floribus umbellatis LINN. *Hieracium fruticosum angustifolium majus* I. R. H.

β. & *minus* DILL. *E. N. C. Cent. app.* t. 13. &

γ. angustissimo folio PETIVER. t. 13. Ad oras sylvarum; & γ. Genevæ.

35. HIERACIUM foliis hirsutis, dentatis, inferioribus ellipticis, superioribus lanceolatis. *Hieracium caule ramoso, continuo folioso, foliis ex cordato lanceolatis, denticulatis, amplexicaulibus* GMELIN. *Flor.* T. II. t. 14. n. 30. Passim ad vias adclives inque pratis.

β. *Hieracii sabaudi varietas I.* I. B. II. p. 103.

36. HIERACIUM foliis ovato lanceolatis, rariter dentatis, amplexicaulibus †. *Hieracium pumilum saxatile, asperum, radice præmorsa* C. B. Ad rupes calidas.

37. HIERACIUM foliis ovatis, crassis, lanatis. *Hieracium montanum tomentosum* DILLEN. *hort. Eltham.* t. 150. f. 180. In calidis vallibus Valesiæ.

38. HIERACIUM caule unifloro, foliis caulinis ovato lanceolatis, dentatis, amplexicaulibus. *Hieracium latifolium montanum, prealtum, glabrum Endiviæ folio* BOCCONE *Mus. di piant.* t. 153. In subalpinis Aquilejensibus.

39. HIERACIUM foliis amplexicaulibus serratis, glabris, hamis aristatis, calycibus villosis †. *Hieracium montanum majus, latifolum, Genevense* I.B.II. P. 1036. Adclivia subalpina & montana.

40. HIERACIUM foliis lanceolatis, serratis, hirsutis, calycibus villosis. *Hieracium montanum asperum Conyzæ folio* C. B. In alpinis & subalpinis pratis.

41. HIE-

41. HIERACIUM foliis asperis, oblongis, lanceolatis, dentatis, calyce hirsutissimo †. *Hieracium intybaceum, flore magno, albido* C. B. SCHEUCHZER *It. IV.* p. 336.

42. HIERACIUM foliis ovato lanceolatis, dentatis, petiolatis, petiolis dentatis †. Alpium editiorum, & asperrimarum.

44. HIERACIUM foliis villosis integerrimis, radicalibus ligulatis, caulinis ovatis, amplexicaulibus. *Hieracium alpinum hirsuto folio* CLUS. *Pann.* p. 647. Alpina.

β. Varietas major & levior.

45. HIERACIUM foliis glabris, dentatis, imis petiolatis, superioribus amplexicaulibus, calycibus hirsutis. *Hieracium latifolium glabrum, ex valle Griesßbachiana* I. B. II. p. 123. In pratis sylvisque humidis.

46. HIERACIUM caule subnudo, paucifloro, foliis ovato lanceolatis, circa petiolum dentatis. *Auricula muris major* TRAG. p. 276.

β. Ejusd. species in sylvis Brocomagi EJ. p. 277.
γ. *Pulmonaria gallica femina* TABERNÆM. p. 195.
δ. *Pulmonaria gallica tenuifolia* EJ. ib.
ε. *Pulmonaria gallica rotundifolia* BARRELIER. n. 342.

47. HIERACIUM foliis levibus integerrimis, radicalibus longe petiolatis, ellipticis, caulinis amplexicaulibus, hamis obtusis. *Hieracium glabrum, succisæ folio integro* VAILLANT. Montana.

48. HIERACIUM caule nudo brachiato paucifloro, foliis linearibus, rariter dentatis. *Hieracium folio statices, caule nudo* VAILLANT. Alpina, & glarearum ad torrentes alpinos.

β. *Hieracium montanum Asphodeli foliis acuminatis* BOCCONE *Mus. di piant.* t. 106. Ad rupes calidas occidentales.

49. HIERACIUM caule unifloro, foliis lingulatis, dentatis, hirsutis, calyce hirsuto. *Hieracium pumilum II. Fr. Gregorii* COLUMN. *Ecphras. II.* p. 129. 130. Alpina.

Hier. auratiacū 50. HIERACIUM caule fubnudo, foliis ovatis, integris, floribus umbellatis aurantiis. *Hieracium Germanicum I. Fr. Gregorii* COLUMN. ib. p. 28. Alpina, etiam montana, pratenfia.

51. HIERACIUM caule nudo, foliis petiolatis, ovatis, integerrimis, hirfutis, floribus fpicatis. *Hieracium pratenfe latifolium non finuatum, majus*, In fylvis *Bafileæ, Neocomi.*

51*. HIERACIUM caule fubnudo, foliis hirfutis, lanceolatis, floribus umbellatis, petiolis ramofis. *Pilofella minori flore, hirfutior & altior non repens* I. B. II. p. 1040. In fylvis borealibus.

52. HIERACIUM caule nudo, ftolonibus reptantibus, foliis longe pilofis, lanceolatis, floribus umbellatis. *Pilofella minor, folio anguftiori non repens* I. B. II. p. 1040. Ad vias & in glareofis Aquilejæ.

53. HIERACIUM caule nudo, paucifloro, ftolonibus reptantibus, foliis longe pilofis, lanceolatis. *Pilofella major prima* TABERNÆMONT. p. 196. In pratis, torfaceis &c.

54. HIERACIUM caule brachiato, paucifloro, foliis lanceolatis, longe pilofis, calycibus glabris †. In Valefia. Bafileæ.

55. HIERACIUM caule unifloro, ftolonibus reptantibus, foliis petiolatis, ovatis, longe pilofis, fubtus tomentofis. *Pilofella* CAMERAR. *Epit.* p. 708. Ad vias.

β Varietas tota tomentofa. Alpes.

56. TARAXACUM calycibus glabris, fquamis imis reflexis. *Dens Leonis* CAMER. *Epit.* p. 286. In pratis, ad vias

57. TARAXACUM calycibus hirfutis, fquamis rectis. Hift. T. I. *Hieracium alterum minus IV.* COLUMN. *Ecphr. II.* p. 29. 31. Prata alpina, etiam montana.

I. I. I. II. RADIATÆ.

I. SEMINIBUS PAPPO CORONATIS.

58. SENECIO corollis nudis, foliis pinnato finuatis, amplexicaulibus, floribus fparfis LINN. fpec. p. 1216. *Senecio Erigeron* TABERN. p. 168. Horti, rudera.

59. SENE-

59. SENECIO foliis pinnatis, pinnis alterne majoribus, ſemipinnatis, anguloſis, calycibus levibus, radiis breviſſimis revolutis ad RUPP. T. III. *Senecium montanum* TABERNÆM. p 169. In ſylvis cæduis rariſſime.

60. SENECIO foliis viſcidis, pinnatis, pinnis ſemipinnatis, anguloſis, calycibus hirſutis. *Jacobea Pannonica mollior* CLUS. *Pann.* p. 372. In ſylvis cæduis vulgo.

61. SENECIO tomentoſus, foliis pinnatis, pinnis ſubrotundis, umbella globoſa. *Chryſanthemum alpinum I.* CLUS. *Pannon.* p. 566. Alpes occidentales.

62. SENECIO foliis lineatis, pinnis dentatis, extrema maxima. *S. Jacobi herba* FUCHS p. 341. 342.

β. absque radiis.

γ. foliis viridibus rigidis & laciniatis GERBER.

δ. *Groundſell ragwort* PETIVER t. 17.

ε. latifolia I. B. II. p. 1057.

Prima vulgo ad vias. Altera Rupe. Quarta in ſylvis. Quinta in aquoſis & foſſis.

62*. SENECIO foliis pinnatis, acutis, floribus umbellatis, calycibus pelviformibus †. *Jacobea alpina, laciniata, flore buphthalmi* SCHEUCHZER. poſth. In M. *Fracto.*

63. SENECIO foliis cordato lanceolatis, ſerratis †. *Jacobea latifolia altera* C. B. *Prodr.* p. 69. Circa caſas paſtorias alpium.

64. SENECIO foliis ovato lanceolatis, ſerratis, ſubtus hirſutis, floribus umbellatis. *Jacobea nemorenſis, latiore, rigidiore, & hirſuto folio* RUPP. p. 142. Hercynica, non certa civis.

65. SENECIO foliis lanceolatis, ſerratis, glabris, floribus umbellatis. *Solidago Saracenica* I. B. II. p. 1062. Montana, etiam ad vias ſubalpinas.

66. SENECIO foliîs linearibus ſerratis, floribus umbellatis. *Conyza aquatica maxima, ſerrato folio* THAL. p. 11. n. 111. Prata aquoſa.

67. SENECIO foliis craſſis, ſerratis, imis petiolatis ſubrotundis, caulinis lanceolatis. *Doronicum Helveticum incanum* C. B. *Prodr.* p. 97. &c. Alpina, etiam montana.

68. SENECIO foliis imis petiolatis, cordatis, obiter dentatis, caulinis lingulatis sessilibus. *Jacobea Pannonica folio non laciniato*, CLUS. *Pannon.* p. 574. 575.

69. SOLIDAGO caule anguloso, hirsuto, foliis ovato lanceolatis, dentatis, racemis multifloris spicatis. *Virga aurea vulgaris latifolia* I. B. II. p. 1062. Montana.

β. Virga aurea montana minor BARRELIER ic. 783. Alpina.

70. SOLIDAGO foliis tomentosis, ovatis & semipinnatis †. Alpium occidentalium.

71. SOLIDAGO foliis vaginosis, pinnatis, pinnis perangustis, acutis, simplicibus & bifidis. *Chrysanthemum alpinum II.* CLUS. *hist. I.* p. 333. Alpes ad Italiam vergentes.

72. ASTER foliis ovato lanceolatis, serratis, subtus tomentosis, calycinis ovato lanceolatis maximis. *Helenium* CAMER. *Epit.* p. 35. In Rhætia transalpina, prope Neocomum, rarus, locis udis.

73. ASTER caule ramosissimo, foliis ovato lanceolatis, subtus incanis, floribus umbellatis † t. 2. Bernæ in arundinetis.

74. Nullus est.

75. ASTER foliis ovatis, venosis, scabris, hirsutis. *Aster luteus, hirsuto salicis folio* ad RUPP. p. 180. In M. *Generoso*: in comitatu *Neocomensi.*

76. ASTER foliis glabris, ciliatis, venosis. *Aster montanus, luteus, salicis folio glabro* C. B. In pratis occidentalibus, & ad vias.

77. Non vera civis.

78. ASTER foliis subhirsutis, radicalibus petiolatis, ellipticis, caulinis sessilibus, lanceolatis, calycinis perangustis. *Conyza aquatica Asteris flore aureo* C. B. Aquosa lacus Lemani.

79. ASTER foliis amplexicaulibus, undulatis, subtus tomentosis. *Conyza tertia vulgaris* CLUS. *Pann.* p. 326. Ubique in subhumidis.

80. ASTER foliis amplexicaulibus, undulatis, hirsutis, radiis brevissimis. *Conyza & Pulicaria* BLAKWELL. t. 103.

81. ASTER

81. ASTER foliis ellipticis, integerrimis, tomentosis, caule unifloro. *Aster montanus hirsutus* LOBEL. p. 350. Rarus, montanus, ad pedes alpium Valesiacarum in *valle Prætoria* frequens.

82. ASTER foliis radicalibus petiolatis, ovatis, scabris, caule unifloro. *Aster atticus V.* CLUS. *Pannon.* p. 533. Alpinus & montanus.

83. ASTER caule folioso, foliis scabris, ciliatis, lanceolatis, obtusis, calycinis squamis ovatis, ciliatis. *Aster atticus* DODON. p. 266. Colles submontani calidi.

84. ERIGERON floribus paniculatis spicatis. *Virga aurea Virginiana hirsuta annua di flor pallido* ZANONI ad MONT. ic. 78. In ruderosis sylvisque cæduis.

85. ERIGERON caule alterne ramoso, petiolis unifloris, semiflosculis pappum æquantibus. *Amellus montanus æquicolorum* COLUMN. *Ecphras. II.* p. 26. In arvis, ad vias.

86. ERIGERON caule alterne ramoso, petiolis unifloris, semiflosculis pappum superantibus. *Asteri montano purpureo similis aut Globulariæ* I. B. II. p. 107. Alpina, etiam montana.

87. ERIGERON caule unifloro, calyce tomentoso, radiis semiflosculosis. *Aster caule unifloro, foliis integerrimis, calyce villoso, subrotundo* LINN. *Flor. Lapon.* n. 307. t. 9. f. 3.

88. DORONICUM foliis cordatis, obtusis, imis longe petiolatis, superioribus amplexicaulibus. *Aconitum pardalianches* DODON. *purg.* p. 305. In M. *Thuiry*, neque alibi.

89. ARNICA foliis alternis, argute serratis, radicalibus petiolatis. *Doronicum austriacum III.* CLUS. *Pann.* p. 520. 521. In alpinis lapidosis.

90. ARNICA foliis conjugatis, ovatis, integerrimis. *Caltha alpina* DODON. *purg.* p. 62. Prata subalpina.

91. ARNICA uniflora, foliis alternis ovato lanceolatis, hirsutis, integerrimis, calyce hirto. *Doronicum primum, vel minus* CLUS. *Pannon.* p. 517. 518. In Rhætorum alpibus, rara.

92. ARNICA caule nudo, unifloro, foliis ovato lanceolatis, serratis. *Bellis media* CAMER. *Epit.* p. 324. In pratis montanis & subalpinis.

Erigeron, Doronicum, Arnica — Bellis, Calendula, Pyrethrum, Matricaria

I. I. I. II. II. SEMINIBUS PAPPO NON CORONATIS.

93. BELLIS ſcapo nudo LINN. p. 1248. *Bellis minor ſylveſtris* C. B. Ubique ad vias.

94. CALENDULA foliis lanceolatis, amplexicaulibus, dentatis, floribus concoloribus. *Calendula arvenſis* TABERNÆM. p. 335. In agris.

95. PYRETHRUM foliis pinnatis, pinnis ſemipinnatis, acute dentatis, floribus umbellatis. *Tanacetum inodorum I.* CLUS. *Pann.* p. 550. & *II.* EJ. p. 551. In ſylvis calidioris Helvetiæ.

96. PYRETHRUM caule unifloro, foliis petiolatis, palmatis. *Leucanthemum alpinum I.* CLUS. *Pann.* p. 564. Alpina.

97. PYRETHRUM caule unifloro, foliis radicalibus petiolatis, ſemipinnatis, caulinis ſeſſilibus, acute dentatis †. *Leucanthemum alpinum anguſtifolium* BARRELIER. ic. 458. Alpina.

98. MATRICARIA foliis radicalibus petiolatis, ovatis, crenatis, caulinis amplexicaulibus dentatis. *Bellis major* C. B. BLAKWELL. t. 42.

 β. *Bellis alpina major, folio rigido* C. B. *Prodr.* p. 121.

 γ. *Bellis montana major folio acuto* EJ. ib. Illa pratenſis & arvenſis, hæ β. γ. alpinæ & montanæ.

99. MATRICARIA foliis amplexicaulibus, pinnatis, pinnis ſemipinnatis, acute dentatis, radiis breviſſimis. *Chryſanthemum Creticum I.* CLUS. *Pannon.* p. 334. 335. Alpes meridionales, rarius.

100. MATRICARIA foliis pinnatis, pinnis ſemipinnatis, laciniis obtuſis, floribus umbellatis *Matricaria coron.* p. 236.

101. MATRICARIA foliis capillaribus, duplicato pinnatis, pinnis lanceolatis, bifidis trifidisque. *Anthemis Chamomilla* MATTHIOL. p. 905. Ad vias, in agris.

102. CHAMÆMELUM foliis ſubhirſutis, nervo duro, pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis inciſis. *Chamæmelum odoratum* DODON. *coron.* p. 243. Incerta civis, in agris calidioribus.

103. CHA-

103. CHAMÆMELUM foliis glabris, duplicato pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, semine levi. *Chamæmelum inodorum s. cotula non fœtida* I. B. III. p. 120. In arvis, in primis sabulosis.

104. CHAMÆMELUM foliis glabris, duplicato pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, semine exasperato. *Chamæmelum fœtidum* C.B. In agris, ad vias.

105. CHAMÆMELUM foliis hirsutis, pinnatis, pinnulis simplicibus lanceolatis. *Buphthalmum* MATTHIOL. p. 909. Passim circa Basileam.

106. ACHILLEA foliis hirsutis, pinnatis, pinnis æqualibus, pinnatis, pinnulis integris & trifidis, floribus luteis umbellatis. *Stratiotes lutea* CLUS. *hisp.* p. 371. In Valesia inferiori ad vias.

107. ACHILLEA foliis pinnatis, punctatis, pinnis æqualibus, pinnulis trifidis & quinquefidis. *Millefolium terrestre minus Dioscoridis* TABERNÆM. p. 130. Ad vias.

108. ACHILLEA foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, incisis & integris. *Stratiotes*, *Millefolium* MATTHIOL. p. 1007. In Rhætia, & Helvetia transalpina.

109. ACHILLEA foliis tomentosis, duplicato pinnatis, pinnis crenatis, pinnulis semipinnatis *Nobile Millefolium* TRAG. p. 476. In calidis sub Jura & in Valesia.

110. ACHILLEA foliis hirsutis, pinnatis, pinnis acute dentatis, latescentibus †. In *Gomsensibus.*

111. ACHILLEA foliis glabris, pinnatis, pinnis simplicibus & multifidis. *Parthenium alpinum* CLUS. *Pann.* p. 242. Saxosa alpium.

112. ACHILLEA foliis glabris, punctatis, pinnatis, pinnis simplicibus †. *Assenzo III. alpino umbellifero* PONA *bald.* p. 120. Alpes Rhæticæ & Valesiacæ.

113. ACHILLEA foliis tomentosis, pinnatis, pinnis simplicibus & incisis. *Millefolium alpinum incanum, flore specioso* I. B. III. p. 138. In alpibus Rhæticis & Valesiacis.

114. ACHIL-

Chamaemelum, Achillea, Buphthalmum, Bidens —
β b c c α c

114. ACHILLEA foliis tomentoſis, longe petiolatis, palmatis. *Abſinthium montanum umbelliferum* CLUS. *Pann.* p. 553. 555. In M. *Generoſo.*

115. ACHILLEA foliis pinnatis, pinnis acute ſerratis, extremis confluentibus. *Ptarmica alpina Matricariæ foliis* TRIUMPHETTI obſſ. p. 83. Alpina.

116. ACHILLEA foliis ſemipinnatis, pinnis minutiſſime ſerratis. *Ptarmica alpina Millefolii folio* BOCCONE t. 120. Inter alpinas SCHEUCHZERUS.

117. ACHILLEA foliis linearibus, lanceolatis, acutiſſime ſerratis. *Ptarmica* CAMER. *Epit.* p. 354.

118. BUPHTHALMUM foliis hirſutis, imis petiolatis, ovatis, ſuperioribus amplexicaulibus, lanceolatis, rariter dentatis. *Conyza major altera* THAL. ic. II. p. 21. In montanis & ſubalpinis.

119. BUPHTHALMUM foliis conjugatis, flore nudo, nutante †. *Conyza capite nutante* I.B. II. p. 1055 *Michelfeldæ* olim repertum.

120. BIDENS foliis ſeſſilibus ſerratis, floribus nutantibus, circumvallatis. *Eupatorium aquaticum femina, ſeptentrionalium ſtellato & odoro flore* LOBEL. ic. p. 429.

β. *Conyza paluſtris foliis ſerratis* LOESEL. p. 54. ic. 11.

γ. *Verbeſina minima* DILLEN. *Syn. III.* t. 7. f. 2. In foſſis.

121. BIDENS foliis petiolatis trilobatis, & quinque lobatis, ſerratis, floribus circumvallatis. *Cannabina aquatica, folio tripartito diviſo* C. B. Similibus locis.

β. *Conyza paluſtris, foliis tripartito diviſis* LOESEL. p. 53. ic. 10.

I. I. I. III. FLOSCULOSÆ.

I. SEMINE PAPPO NON CORONATO.

I. DISCO SQUAMIS DISTINCTO.

122. XERANTHEMUM herbaceum, foliis lanceolatis. *Ptarmica auſtriaca* CLUS. *Pannon.* p. 548. 549. Viæ arenoſæ Valeſiæ.

123. SAN-

123. SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis LINN. p. 1179. *Polium Theophrasti & Dioscoridis* COLUMN. *Ecphras.* p. 54. Circa *Fouly.*

II. DISCO PAPPOSO.

124. APSINTHIUM foliis incanis, pinnatis, pinnis primis bilobatis, pinnulis incisis, lanceolatis, spicis heteromallis, floribus pendulis. *Absinthium* CAMERAR. *Epit.* p. 652. Ad vias *Aquilejæ*, *Valesiæ.*

125. APSINTHIUM foliis sericeis, petiolatis, pinnatis, pinnulis trifidis & quinquefidis. *Absinthium alpinum, candidum, humile* C. B. ALLIONE *Spec.* T. I f. 3. Alpinum Valesiacarum summarum.

126. APSINTHIUM ex alis floridum, foliis sericeis, pinnatis, pinnis trifidis & quinquefidis. *Assenzo alpino IV.* PONA *bald.* p. 21. Alpina.

III. DISCO NUDO.

127. ARTEMISIA foliis sericeis, radicalibus petiolatis, pinnatis, incisis, caulinis semipinnatis. *Absinthium pumilum palmatumque minus, argenteo sericeoque folio* BOCCONE t. 71. Alpium *Aquilejensium & Valesiacarum.*

128. ARTEMISIA foliis tomentosis, multifidis, floribus erectis, longe spicatis, subsessilibus †. *Herba alba* GESNER. *herb.* p. 244. 289. b. Ad vias Valesiæ mediæ.

129. ARTEMISIA foliis sericeis, duplicato pinnatis, pinnulis parallelis. *Absinthium ponticum* CAMER. *Epit.* p. 454. Alpium & montium rara civis. In M. *Beverin*, & supra *Couvet.*

130. ARTEMISIA foliis inferne tomentosis, pinnatis, pinnis acute dentatis, spica paniculata erecta. *Artemisia rubra* TABERN. p. 7. & *alba* p. 8. Ad rudera, sepes, ripas fluviorum.

131. ARTEMISIA caulibus declinatis, foliis sericeis, calvescentibus, pinnatis, pinnis multifidis acutis. *Abrotanum campestre* TABERN. p. 16. Ad vias planiores & calidiores, inque rupibus.

132. TA-

Xeranthemum, Santolina — Absinthium — Artemisia, Tanacetum, Carpesium — Conyza, Eupatorium, Cacalia, Petasites

132. TANACETUM foliis pinnatis, pinnis ſemipinnatis, acute dentatis. *Tanacetum* TRAG. p. 158. In muris vetuſtis, & ad ripas.

133. TANACETUM foliis ovatis, ſerratis. *Balſamita* major DODON. *coron.* p. 299. In Helvetia transalpina, & circa *Moutru* in muris.

134. CARPESIUM floribus terminalibus LINN. p. 1029. *Aſter cernuus* COLUMN. *Ecphr.* p. 251. 252. Cum Menthis in ſubudis calidis.

II. SEMINIBUS PAPPO CORONATIS.

135. CONYZA foliis ovato lanceolatis, rariter ſerratis, floribus umbellatis. *Conyza major* MATTHIOL. p. 870. In collibus & ſylvis.

136. EUPATORIUM foliis ovato lanceolatis, tripteris. *Eupatorium Avicennæ* FUCHS p. 265.
  ß. Foliis integris. In udis.

137. CACALIA foliis cordatis, ſerratis, longiſſime petiolatis, floribus umbellatis. *Cacalia incano folio* CLUS. *Pann.* p. 500. 501.

138. PETASITES floribus denſe ſpicatis, floſculis androgynis. *Petaſites* DODON. p. 997. In aquoſis, ad rivos.

139. PETASITES ſpicis laxis, umbellatis, floſculis pleriſque androgynis. *Petaſites flore albo* CAMERAR. *Epit.* p. 593. Ad torrentes alpinos.

140. PETASITES floribus ſpicatis, pendulis, pétiolis multifloris, calycibus æqualibus, floſculis pauciſſimis androgynis. *Petaſites major floribus longis, pediculis inſidentibus*, DILLEN. *Hort. Elth.* p. 309. ic. 237. Ad montanos rivos Juræ.

141. PETASITES floribus ſpicatis, erectis, foliis calycinis lanceolatis, floſculis pauciſſimis androgynis. *Petaſites minor* SCHEUCHZER. *It. VI.* p. 425. Ad torrentes alpinos & montanos.

142. PETASITES ſcapo unifloro, foliis reniformibus. *Tuſſilago alpina I.* CLUS. *Pann.* p. 296. 297. In ſylvis alpinis & montanis.

143. PETASITES ſcapo unifloro, flore radiato. *Tuſſilago* CAMERAR. *Epit.* p. 490. 491. In aggeribus & agris humidis.

144. CHRY-

144. CHRYSOCOMA. *Osyris austriaca* CLUS. *Pann.* p. 310. 211. In rupibus calidis.

145. FILAGO foliis linearibus, oris contractis, ramis simplicissimis, umbella convexa terminatis. *Stoechas Citrina tenuifolia Narbonensis* I.B III. p. 154. Supra *Blonai*, nuper non reperta.

146. FILAGO foliis lanceolatis, subtus tomentosis, floribus umbellatis. *Gnaphalium Americanum* CLUS. *hist.* p. 327. In colle ad *Arolam*, proxime *Drakau*.

147. FILAGO foliis mollissimis, tomentosis. obtusis, umbellis convexis, electrinis. *Chrysocoma altera* CLUS. *hisp.* p. 327. In Valesia & Helvetia transalpina ad vias.

148. FILAGO foliis linearibus, alis spiciferis. *Gnaphalium rectum* I. B. III. p. 160, In sylvis.

149. FILAGO caule simplicissimo, spica pauciflora. *Gnaphalium supinum*, *Lavendulæ folio* BOCCONE t. 85. alpina.

150. FILAGO caule simplici, umbella pauciflora, calycis basi tomentosa †. *Filago alpina minor*, *erecta* SCHEUCHZER. *It. II.* p. 133. alpina.

151. FILAGO caule ramosissimo, diffuso, umbella sessili terminato. *Gnaphalium humile ramosum*, *capitulis nigris* RAJ. p. 295. In fossis & hortis.

152. FILAGO floribus sessilibus, umbellatis, foliis umbellam excedentibus, tomentosis. *Gnaphalium alpinum* CLUS. *Pann.* p. 495. Alpium, etiam summorum montium.

153. FILAGO caule dichotomo, corymbo sphærico, in angulo sessili. *Gnaphalium* FUCHS. p. 222. In arvis.

154. FILAGO caule erecto, ramosissimo, foliis mollissimis, tomentosis, florum acervis sessilibus, in spicas continuatis. *Filago incana*, *tomentosa*, *erecta* VAILLANT. ad vias, Basileæ, in Valesia.

155. FILAGO caule dichotomo, floribus glomeratis spicatis. *Filago minor* I. R. H. Basileæ in agris.

156. FILAGO glomerulis foliis filiformibus insidentibus. *Gnaphalium vulgare tenuifolium* I. B. III. p. 159. In agris Basileæ.

157. FILAGO flagellis reptans, sexu distincta, flosculis omnibus androgynis. *Pilosella minor* DODON. p. 68. In collibus aridis.

I. I. I. IV. CAPITATÆ.

I. CALYCE PROPRIO.

158. ECHINOPS caule ramoſo, foliis ſemipinnatis, pinnis dentatis, dentibus ariſtatis. *Echinopus minor* I. B. III. p. 69. ad vias Valeſiæ.

II. CALYCE PROPRIO NULLO.

I. FLOSCULIS OMNIBUS ANDROGYNIS.

159. ONOPORDUM caule alato, foliis ovatis, dentatis, dentibus anguloſis, ariſtatis. *Spina alba* FUCHS. p. 57. ad vias agri Aventici.

160. CENTAURIUM foliis petiolatis, lanceolatis, ad pediculum emarginatis. *Rhaponticum alterum, anguſtiori folio* LOBEL. ic. p. 285. In ſummis alpibus Rhæticis, Valeſiacis.

161. LAPPA. *Perſonata ſ. Lappa major altera* MATTHIOL. p. 1155. capitulis lanatis & glabris

162. CARDUUS inermis, foliis imis pinnatis, ſuperioribus ovato lanceolatis, ſerratis, ſquamis calycinis reflexis t. 3. *Cirſium majus caule alato, polycephalon, capitulis majoribus perſonatæ æmulis*, RAJ. *Syll. exter.* p. 399. ad ſepes & in dumetis ſubalpinis.

163. CARDUUS inermis, foliis glabris, ſerratis, imis ovatis, ſuperioribus ſemipinnatis. *Serratula tinctoria* TABERNÆM. p. 256. & II. p. 157. & III. ib. In pratis paludoſis & dumetis.

164. CARDUUS inermis, ſcapo nudo paucifloro t. 4. *Carduus dictus Cirſium folio laciniato, nigrius* I. B. III. p. 43. In ſubalpinis.

165. CARDUUS foliis ovatis & ſemipinnatis, ſubtus tomentoſis, ſpinoſis, calycibus molliter ſpinoſis, reflexis. *Carduus caule criſpo* I. B. III. p. 59. ad vias.

?166. CARDUUS alis caulinis latiſſimis, foliis ſemipinnatis, pinnis anguloſis, ſpinoſis, floribus faſciculatis oblongis. *Carduus acanthoides* I. B. III p. 56. ad fluvios & ſaliceta, non ſatis certa civis.

167. CARDUUS

167. CARDUUS foliis ſemipinnatis, pinnis anguloſis, ſpinoſis, floribus nutantibus, calycinis ſquamis pungentibus, patulis. *Carduus nutans* I. B. III. p. 51. Ad vias.

168. CIRSIUM foliis pinnatis, pinnis bilobatis, lanceolatis, ſpinoſis, calycibus ſphæricis, ſpinoſis, tomentoſis. *Carduus eriocephalus* DODON. *purg.* p. 445. Ad vias ſubalpinas & montanas.

169. CIRSIUM foliis ſemipinnatis, pinnis bilobatis, ſpinoſis, capitulis congeſtis, tomentoſis, conicis. *Carduus lanceatus* TABERNÆM. p. 699. Ad vias.

170. CIRSIUM caule recto, ſubnudo, alato, foliis ſemipinnatis, ſpinoſis, calycibus ariſtatis. *Carduus ſpinoſiſſimus, anguſtifolius, pratenſis* LOESEL. p. 35. cum ic. In pratis udis.

171. CIRSIUM caule anguloſo, ramoſo, foliis ſemipinnatis, pinnis anguloſis. ſpinoſis, calycibus inermibus, cylindricis. *Carduus arvenſis* TABERN. p. 700. in agris & foſſis.

172. CIRSIUM foliis caulinis ſemipinnatis, pinnis anguloſis, ſpinoſiſſimis, terminantibus mollibus, ciliatis, umbellam floralem comprehendentibus t. 5. *Carlina polycephalos alba* SCHEUCHZER *It. II.* p. 131. Alpina.

173. CIRSIUM foliis ciliatis, amplexicaulibus, inermibus, flores comprehendentibus. *Carduus pratenſis* TRAGI I. B. III. p. 42. In pratis, poſt fœniſecium.

174. CIRSIUM foliis pinnatis, pinnis ciliatis, ſquamis calycinis recurvis †. In monte *Jura* ſupra Genevam.

175. CIRSIUM foliis ciliatis, imis ovatis, ſuperioribus ſemipinnatis, floribus ſeſſilibus, obtuſis *Comm. Gotting.* T. I. t. 8. *Eryſithales* LUGD. p. 1054. Subalpina & montana prata.

176. CIRSIUM foliis ciliatis, ſemipinnatis, pinnis anguloſis, ſpinoſis, ſuperioribus amplexicaulibus, LA CHENAL *Act. Helvet.* T. IV. t. 16. In pratis humectis *Rupe.* Circa Baſileam.

177. CIRSIUM radicibus bulboſis, foliis ſemipinnatis, pinnis anguloſis, ciliatis, floribus nudis. *Carduus*

duus bulbosus Monspeliensium LOBEL. *adverſ.* p. 371. *Michelfeldæ*, Genevæ.

178. CIRSIUM floribus acaulis. *Chamæleon exiguus*, TRAG. p. 852. In aridis.

179. CIRSIUM foliis ovato lanceolatis, dentatis, ſubtus tomentoſis, calycibus villoſis t. 6. *Carduus mollis lapathi folio* CLUS. p. 663. 664. Alpium editiorum.

180. CIRSIUM foliis ciliatis, ſubtus tomentoſis, radicalibus petiolatis, ovato lanceolatis, caulinis lanceolatis & ſemipinnatis t. 7. *Cirſium britannicum* CLUS. *pann.* p. 657. ad pedes alpium editiorum.

181. SILYBUM nervis foliorum albis. *Carduus Mariæ* TRAG. p. 850. ad vias inque ruderoſis.

182. CARLINA foliis radicalibus ſemipinnatis, pinnis anguloſis, ſpinoſis, caulinis ovato lanceolatis, amplexicaulibus. *Heracantha* TABERN. p. 697. In aridis.

183. CARLINA caule unifloro. *Carlina altera* DODON. *purg.* p. 440. In ſterilibus montoſis.

184. JACEA foliis radicalibus ſemipinnatis, caulinis ovato lanceolatis †. Inter *Baſileam* & *Befort.*

I. I. III. IV. II. FLOSCULIS RADIALIBUS STERILIBUS.

185. CYANUS foliis radicalibus ſemipinnatis, caulinis ovato lanceolatis, ſquamis calycinis oblongis obtuſis. *Jacea montana humilis hirſuto capite* CLUS. *pann.* p. 543. 545. In Helvetia transalpina ad vias.

186. CYANUS foliis pinnatis, pinnis dentatis, obtuſis, ſquamis calycinis triangularibus. *Scabioſa major* MATTHIOL. p. 969. vulgo in collibus pratisque.

187. CYANUS pinnulis foliorum pinnatis, linearibus. *Stoebe gallica* CLUS. *pann.* p. 546. ad vias Baſileæ & in Valeſia.

188. CYANUS foliis ſubhirſutis, ovato lanceolatis. amplexicaulibus, dentatis, plumulis calycinis reflexis.

Jacea

Jacea montana villoso capite elatior Clus. *pann.* p. 547. 594. alpina.

189. CYANUS foliis lanceolatis, tomentosis, calycinis plumulis reflexis †. *Cyanus montanus Lychnidis candidissimo folio, capite reticulato* Boccone p. 20. t. 2. In Rhætia non certa civis.

190. CYANUS caule unifloro, alato, foliis ellipticis lanceolatis. *Cyanus major* Dodon. *coron.* p. 31. In montanis & subalpinis.

191. CYANUS foliis imis ellipticis, dentatis, superioribus linearibus; semiflosculis latissimis. *Cyanus minor* Camer. *epit.* p. 289.

192. ATRACTYLIS foliis cartilagineis, reticulatis, imis semipinnatis, superioribus lanceolatis, amplexicaulibus. *Atractylis* Camer. *epit.* p. 561. ad vias calidas.

193. CALCITRAPA caule alato, foliis tomentosis, radicalibus semipinnatis, caulinis lanceolatis, dentatis. *Carduus stellatus mitior apulus* Columm. *Ecphras. I.* p. 30. 31. Basileæ & Genevæ ad vias.

194. CALCITRAPA foliis pinnatis, pinnis dentatis, floribus in alis sessilibus. *Carduus stellatus* Dodon. *purg.* p. 448. ad vias planitiei.

195. RHAPONTICUM foliis tomentosis, radicalibus semipinnatis, caulinis lanceolatis. *Jacea nigra* Tab. I. p. 112. In pratis.

196. RHAPONTICUM foliis radicalibus semipinnatis, caulinis lanceolato linearibus, nervosis, calycibus nitidis. *Jacea calyculis argenteis minor* I. R. H. In Helvetia transalpina & Valesia trans St. Pierre.

197. RHAPONTICUM foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, pinnulis lanceolatis, calycibus nitidis. *Stoete Salmatica rubra* Clus. *hisp.* p. 161. In Helvetia transalpina, *Bellinzonæ*, *Lugani*, *&c.*

197* SERRATULA foliis radicalibus petiolatis ovatis, caulinis pinnatis, linearibus, denticulatis, ciliatis. *Senecio carduus apulus* Columm. *Ecphras. I.* p. 32. 34. Prope *Branson* Valesiæ inf.

Cyanus, Atractylis, Carthamus, Rhaponticum, Serratula
— Dipsacus, Succisa, Scabiosa —

I. I. I. II. STAMINIBUS LIBERIS.

I. DISCO COMMUNI.

198. DIPSACUS capitulo ovato, foliis arcuatis circumvallato, glumis erectis. *Labrum Veneris alterum* CAMER. *epit.* p. 432. ad vias.
199. DIPSACUS foliis biauribus, capitulis hemisphæricis. *Virga pastoris* CAMER. *epit.* p. 433. ad vias & in dumetis.
200. DIPSACUS foliis pinnatis, pinnis serratis, capitulis globosis. *Scabiosa alpina* LOBEL. ic. p. 557. In subalpinis *Aquilejæ*, & montanis altioribus *Thuiry*.
201. SUCCISA caule trifloro, floribus convexis, foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis. *Succisa s. Morsus Diaboli* MATTHIOL. p. 623. In herbosis subhumidis.
202. SUCCISA foliis imis ovatis, superioribus pinnatis, pinnis semipinnatis acutis, ciliis flosculorum longitudine. *Scabiosa major* CAMER. *epit.* p. 711. ad vias.
   β. *Scabiosa II. s. alpina* CLUS. *pann.* p. 575. In alpium saxosis.
203. SUCCISA foliis gramineis tomentosis. *Scabiosa argentea angustifolia* C. B. *prodr.* p. 127. ad lacum Locarnicum SCHEUCHZER. posth.
204. SCABIOSA caule hispido, foliis ovato lanceolatis subhirsutis, inferioribus dentatis. *Scabiosa latifolia rubro flore* CLUS. *pann.* p. 535. 536. In dumetis.
205. SCABIOSA foliis lanceolatis, serratis & integris. *Scabiosa annua integrifolia s. Bellidis foliis* MAGNOL. bot. p. 231. in montosis. Nostra non differt a 204. & debet deleri.
206. SCABIOSA foliis petiolatis, ovato lanceolatis, dentatis, superioribus semipinnatis. *Scabiosa flore ex cæruleo purpureo* TABERN. p. 158. ad vias inque pratis.
207. SCABIOSA caule unifloro, foliis tomentosis, imis pinnatis, pinnis dentatis & semipinnatis, caulinis pinnatis.

pinnatis. *Scabiosa multifida alpina repens* BOCCONE *Muſ. di piant.* p. 22. t. 6. CONSTANT circa *Moutru.*

I. II. I. GYMNOMONOSPERMAE.

II. STAMINIBUS LIBERIS.

II. NULLO DISCO COMMUNI.

208. VALERIANA foliis radicalibus petiolatis, ovatis, caulinis pinnatis, ſexubus diſtinctis.

α. Mas. *Valeriana minima* DODON. *purg.* p. 88.

β. Femina. *Valeriana paluſtris, foliis ſubrotundis* LOESEL. p. 279. ic. 84. In udis.

209. VALERIANA foliis integerrimis, radicalibus ovatis, caulinis linearibus obtuſis. *Nardus Celtica ſ. alpina* CLUS. *pann.* p. 514. 515. In ſummis alpibus Valeſiacis, ad vallem *Auguſtam Prætoriam* vergentibus.

210. VALERIANA foliis pinnatia, pinnis dentatis. *Phu minus* CAMER. *epit.* p. 22. ad ſepes ſubhumidas.

211. VALERIANA foliis radicalibus petiolatis, cordatis, ſerratis, caulinis tripteris. *Valeriana alpina* I.B.III. p. 208. In montanis & ſubalpinis.

212. VALERIANA foliis ovato lanceolatis, obiter dentatis. *Valeriana alpina ſcrophulariæ folio* C.B.*prodr.* p. 87. In montanis & ſubalpinis.

213. VALERIANA foliis glaberrimis, floribus calcaratis.

α. *Valeriana rubra* DODON. *purg.* p. 91.

β. *Anguſtifolia* I. B. III. p. 221. In rupeſtribus & caſtellis vetuſtis.

214. VALERIANELLA foliis oblongis, rariter inciſis, ſeminis mucrone ſimplici. *Lactuca agnina* TABERNÆM. p. 167.

215. VALERIANELLA foliis oblongis ſerratis, ſemine tridentato †. *Valeriana altera nudo & umbilicato ſemine* COLUMN. *ecphr.* p.206. In agris vergente æſtate.

-Valeriana, Valerianella — Globularia —
Verbena, Lycopus, Mentha

I. I. I. GYMNOMONOSPERMÆ.

II. PERICARPIÆ.

216. GLOBULARIA caule unifolio, unifloro, foliis emarginatis, nervo ariſtato. *Scabioſa X.* CLUS. In montanis petroſis & ſubalpinis.
217. GLOBULARIA foliis ovatis oblongis, integerrimis, caule nudo, unifloro. *Aphyllanthes III.* LUGD. p. 864. In alpinis.
218. GLOBULARIA foliis radicalibus emarginatis, nervo ariſtato, caulinis lanceolatis. *Bellis cærulea* TABERNÆM. p. 329. In aridis calidiorum.

I.I.II. STAMINIBUS DUOBUS LONGIORIBUS DUOBUS BREVIORIBUS. FLORE DIFFORMI.

I. GYMNOTETRASPERMÆ.

I. BILABIATÆ.

219. VERBENA foliis rugoſis, tripartitis, ſpicis nudis, ſtrigoſis. *Verbenaca* MATTHIOL. p. 1052. ad vias & foſſas.
220. LYCOPUS foliis acute ſerratis, appendiculatis. *Marrubium aquatile* DODON. p. 595. In aquoſis.
221. MENTHA caule proſtrato, foliis ſubrotundis, obiter dentatis, ſtaminibus exſertis. *Pulegium* RIVIN. t. 23. In aquoſis inundatis *Morgiæ*, *Mülhuſiæ*, *Michelfeldæ*.
222. MENTHA foliis lanceolatis, punctatis, ſub verticillo palmatis. *Pulegium anguſtifolium* RIVIN. t. 23. Prope Lauſannam CONSTANT, ſed ſolus, ut planta non ſatis certa ſit.
223. MENTHA floribus verticillatis, foliis hirſutis, ovato lanceolatis, verticillis tomentoſis. *Mentha verticillata* RIVIN. t. 48. In arvis.
224. MENTHA floribus verticillatis, foliis glabris, ovato lanceolatis, verticillis ſubhirſutis. *Mentha anguſtiore folio* RIVIN. t. 38. In foſſis aquoſis.

225. MENTHA foliis ovato lanceolatis, ferratis, verticillis pauciſſimis, terminante maximo. *Mentha paluſtris ſpicata* RIVIN. t. 49. In foſſis & ſubudis.

226. MENTHA foliis ovatis, rugoſis, ſpicis cylindricis. *Menthaſtrum folio rugoſo rotundiore ſpontaneum, flore ſpicato, odore gravi* I. B. III. p. 219. ad vias calidiores.

227. MENTHA foliis elliptico lanceolatis, ſerratis, ſubtus tomentoſis, ſpicis cylindricis, ſtaminibus flore duplo longioribus. *Menthaſtrum* RIVIN. t. 51. vulgo in udis.

228. MENTHA foliis elliptico lanceolatis, ſubtus tomentoſis, ſpicis cylindricis, ſtaminibus floris longitudine †. ad officinas lateritias *Grandiſoni.*

229. MENTHA foliis elliptico lanceolatis glabris, ſpicis cylindricis. *Mentha* CAMER. *epit.* p. 477. ad vias, rarò.

230. MENTHA foliis rugoſis, breviſſime petiolatis, verticillis ſpicatis. *Mentha criſpa* RIVIN. t. 50. ſubinde ad vias.

231. TRIXAGO foliis hirſutis, ovato cordatis, rotunde dentatis. *Stachys arvenſis minima* RIVIN. t. 27. In ſegetibus *au Bevieux.*

232. LAVANDULA foliis linearibus, ſpicis nudis. *Lavandula altera* DODON. *coron.* In collibus arenoſis ſupra *Vuilly.*

233. ORIGANUM foliis ovatis, umbellis coloratis, ſtaminibus exſertis. *Origanum* RIVIN. t. 60. ad vias & colles.

234. ORIGANUM ſpicis aggregatis, prismaticis, rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus LINN. p. 823. *Origanum Monſpelienſe pulchrum* CAMER. *epit.* p. 768. Baſileæ inter S. Jacob & patibulum.

235. THYMUS foliis ovatis, baſi ciliatis. *Serpyllum vulgare flore magno, parvo, hirſutum, citratum &c.* ad vias inque ſterilibus.

236. THYMUS foliis ellipticis hirſutis. *Serpyllum Pannonicum III.* CLUS. *pann.* p. 627. In Valeſiæ ſabuloſis.

 237. CLI-

Trixago, Lavandula, Origanum, Thymus, Clinopodium, Melissa, Horminum
Melissophyllum, Chamæclema, Cataria, Hyssopus

237. CLINOPODIUM foliis ovatis dentatis, flore folio breviore. *Acinus* RIVIN. t. 43. In aridis & muris.

238. CLINOPODIUM foliis ovatis, acutis, ferratis, flore folio majori. *Clinopodium Auſtriacum* RIVIN. *pann.* p. 622. 623. Montoſa & ſubalpina.

239. CLINOPODIUM foliis ovatis, lanceolatis, obiter dentatis, ſtipulis ſetaceis. *Clinopodium* RIVIN. t. 43. ad vias.

240. MELISSA foliis hirſutis, ovato lanceolatis, ſerratis, petiolis florigeris ramoſis, folia ſuperantibus. *Calamintha officinalis* BLAKWELL. t. 167. *Calamintha Sabaudica* RIVIN. t. 47. ad vias inque rupeſtribus.

241. MELISSA foliis ſubhirſutis, ovato lanceolatis, acutè ſerratis, petiolis florigeris ramoſis, folia ſuperantibus. *Calamintha* CAMER. *epit.* p. 481. ſimilibus locis.

242. MELISSA foliis cordatis, ſerratis, petiolis folio brevioribus. *Meliſſa* RIVIN. t. 45. Circa *Aquilejam*, *Martigny &c.*

243. HORMINUM foliis (ovatis) obtuſis, caule nudo LINN. II. p. 831. *Meliſſa Pyrenaica caule brevi Plantaginis folio* MAGNOL. *hort. reg.* p. 133. In *M. Teuri & Alveney.*

244. MELISSOPHYLLUM *verum* FUCHS. p. 498. In dumetis.

245. CHAMÆCLEMA caule procumbente, radicato, foliis reniformibus, rotunde crenatis. *Hedera terreſtris* RIVIN. t. 67.

β. Flore majore VAILLANT. p. 33. t. 6. f. 4. ad vias.

246. CATARIA foliis cordatis, verticillis ſpicatis. *Nepetha* RIVIN. t. 52. In ruderoſis.

247. CATARIA foliis tomentoſis, ellipticis, acute ſerratis, verticillis ſpicatis. *Cataria tenuifolia* CLUS. *pann.* p. 588. In valle *Ternanza*, circa *Weſen &c.*

248. CATARIA foliis imis cordatis obtuſis, ſuperioribus ovatis, verticillis ſeſſilibus, denſiſſimis, ſpicatis. *Cataria hiſpanica Betonicæ folio anguſtiori* I. R. H. In Aquilejenſi ditione ad vias.

249. HYSSOPUS foliis linearibus punctatis, verticillis in ſpicam continuatis. *Hyſſopus* RIVIN. t. 68. In *Valeſia* paſſim ad vias.

250. ROSMARINUS RIVIN. t. 39. Paſſim in Aquilejenſibus.

251. SALVIA foliis cordatis ſerratis, verticillis denſiſſimis, in ſpicam continuatis. *Horminum ſylveſtre latifolium alterum* CLUS. *pann.* p. 577. 578. In Aquilejenſibus frequens.

252. SALVIA foliis cordatis, ſagittatis, ſerratis, acutis, LINN. p. 37. *Horminum flore luteo* RIVIN. t. 31. In ſubalpinis & montanis.

253. SALVIA foliis imis cordatis, ſuperioribus longe lanceolatis, verticillis nudis, in ſpicam continuatis. *Horminum pratenſe* RIVIN. t. 36. ad vias inque pratis aridis.

254. DRACOCEPHALUS foliis ellipticis, faſciculatis, verticillis ſpicatis, bracteis ovato lanceolatis. *Pſeudochamæpitys* RIVIN. t. 75. Alpes aquilejenſes.

255. STACHYS tomentoſa, foliis imis cordatis, ſuperioribus elliptico lanceolatis, verticillis denſiſſimis. *Stachys montana* RIVIN. t. 27. Paſſim ad vias planitiei.

256. STACHYS foliis hirſutis, cordatis, verticillis ſubtomentoſis. *Pſeudoſtachys alpina* C. B. *prodr.* p. 113. Montana & ſubalpina.

257. STACHYS foliis ſubhirſutis, elliptico lanceolatis, breviter petiolatis, verticillis ſpicatis. *Stachys paluſtris* RIVIN. t. 26. In foſſis & agris humidis.

258. MARRUBIUM dentibus calycinis denis, recurvis, LINN. *Marrubium album* RIVIN. t. 67. ad vias & in ruderoſis calidis.

259. BALLOTE foliis cordatis, ſerratis, verticillis nudis. *Marrubiaſtrum* RIVIN. t. 66. ad vias.

260. BETONICA foliis ellipticis, obiter crenatis, verticillis ſpicatis, bractearum dentibus ariſtatis. *Sideritis Valerandi Dourez brevi ſpica* I.B.III.p.427. Ericeta ſupra *Tuiry*.

261. BETONICA foliis ellipticis, acute dentatis, bracteis ſerratis, ariſtatis, verticillis ſpicatis. *Sideritis montana ſcordioides tomentoſa* BARRELIER.ic.343. C. B. ad ripam *Wieſæ* verſus *klein Huningen*.

Rosmarinus, Salvia, Dracocephalus, Stachys, Marrubium
Ballota, Betonica, Galeopsis, Lamium, Cardiaca

262. BETONICA foliis hirſutis, ovatis, rotunde crenatis, bracteis ovato lanceolatis, ariſtatis, integerrimis †. *Sideritis vulgaris hirſuta* I. B. III. p. 425. ad vias.

263. BETONICA foliis ovatis, crenatis, bracteis ovato lanceolatis. *Sideritis flore albo barba luteola* RIVIN. t. 69. In arvis.

264. BETONICA foliis petiolatis, imis cordatis, ſuperioribus crenatis, ſpica brevi, inſidente foliis. *Betonica* RIVIN. t. 28. In pratis udis aut apricis.

265. BETONICA foliis ovatis, rotunde crenatis, ſpica ovata, obeſa †. *Betonica alpina, incana, purpurea* BARRELIER. ic. 340. Montes vallis *Geſſenai, Val de Lie.*

266. GALEOPSIS foliis linearibus ſerratis, verticillis diſſitis. *Ladanum ſegetum* RIVIN. t. 24. In ſterilibus, arvis &c.

267. GALEOPSIS foliis rhomboideis, ſerratis, ſericeis, verticillis diſſitis †. *Ladanum latifolium* RIVIN. t. 24. ad vias & in agris.

268. GALEOPSIS caule hirto, foliis ovato lanceolatis, ſerratis. *Cannabis ſpuria* RIVIN. t. 31. ad maceries & vias.

269. GALEOPSIS caule hirto, foliis ovato lanceolatis, ſerratis, flore calycis quadruplo †. *Cannabis ſpuria flore majore* RIVIN. t. 32. ſimilibus locis.

270. LAMIUM foliis cordato lanceolatis, ſerratis, verticillis paucifloris. *Galeopſis* RIVIN. t. 62. ad vias.

271. LAMIUM foliis cordato lanceolatis, ſerratis, verticillis multifloris. *Urtica iners ſ. Lamium primum flore albo* DODON. *pempt.* p. 353. ad vias.

272. LAMIUM foliis cordatis obtuſis, in ſummo ramo congeſtis. *Galeopſis minor* RIVIN. t. 62. ſimilibus locis.

273. LAMIUM foliis radicalibus petiolatis lobatis, ſuperioribus rotundis, amplexicaulibus, inciſis. *Galeopſis folio caulem ambiente* RIVIN. t. 63. In agris.

274. CARDIACA foliis petiolatis, cordatis, verticillis folioſis. *Lamium flore luteo* RIVIN. t. 20.

275. CARDIACA foliis cordatis, ſerratis, verticillis nudis, ſpicatis. *Stachys ſylvatica* RIVIN. t. 26. In dumetis ad ſepes.
276. CARDIACA foliis tripartitis lanceolatis. *Cardiaca* RIVIN. t. 20. ad maceries.
277. BRUNELLA foliis ovatis, oblongis, calycibus ſuperne truncatis. *Brunella* RIVIN. t. 29. In pratis.
278. BRUNELLA foliis ovatis oblongis, calycibus ſuperne tridentatis. *Brunella flore majore* RIVIN. t. 29. In pratis altioribus.
279. BRUNELLA foliis imis ovatis oblongis, caulinis dentatis & ſemipinnatis. *Brunella laciniato folio* RIVIN. t. 30. In herboſis aridis Baſileæ Rupe &c.
   β. Flore magno I. B. Genevæ &c.
280. CASSIDA foliis oblonge cordatis, crenatis, verticillis nudis, bifloris. *Scutellaria* RIVIN. t. 77.
281. CASSIDA procumbens, foliis ovatis crenatis, ſpicis raris, folioſis. *Teucrium alpinum inodorum, magno flore* C. B. *prodr.* p. 116. Alpes Valeſiæ.

II. FLORE UNILABIATO.

282. BUGULA flagellifera, foliis ovatis dentatis. *Bugula* RIVIN. t. 75. In pratis & ad vias.
283. BUGULA foliis anguloſis hirſutis, calycibus villoſis. *Bugula montana* RIVIN. t. 76.
   β. Rubrifolia alpina, foliis minus anguloſis.
284. BUGULA foliis imis linearibus, caulinis tripartitis. *Chamæpitys* RIVIN. t. 14. In agris & glareoſis Helvetiæ calidioris.
285. CHAMÆDRYS foliis ellipticis integerrimis, contractis, ſubtus incanis, floribus capitatis. *Ajuga folio integra* RIVIN. t. 15. In ſubmontanis calidis.
286. CHAMÆDRYS foliis firmis, ovatis, crenatis, verticillis paucifloris. *Chamædrys* RIVIN. t. 10. ſimilibus locis, etiam minus calidis.
287. CHAMÆDRYS foliis cordatis productis, ſpicis longiſſimis nudis, heteromallis. *Scorodonia* RIVIN. t. 12. In dumetis.
288. CHAMÆDRYS foliis mollibus, hirſutis, ellipticis, crenatis, verticillis paucifloris. *Scordium* RIVIN. t. 11. In paludoſis calidioribus.

Brunella, Cassida - Bugula, Chamaedrys
— — Utricularia, Pinguicula, Orobanche, Squamaria, Tozzia Linnaea Limosella

289. CHAMÆDRYS foliis pinnatis, pinnis dentatis, trilobatis, verticillis paucifloris. *Iva moschata folio multifido* RIVIN. t. 14. Inter ſtipulas.

I. I. II. DIFFORMES. DIDYNAMIÆ.

II. VASCULIFERÆ.

I. MONANGIÆ.

290. UTRICULARIA calcare conico, ſcapo paucifloro LINN. p. 26. *Lentibularia* RIVIN. t. 79. In foſſis paludoſis Bernæ, Paterniaci &c.

291. UTRICULARIA calcare breviſſimo. *Lentibularia minor* PETIVER. *herb. brit.* t. 26. Bernae, circa *la Chatelaz.* In foſſis paludoſis.

292 PINGUICULA calcare floris longitudine, OEDER. *flor.* t. 93. In pratis udis frequens.

293. PINGUICULA calcare breviſſimo. *Pinguicula nectario conico petalo breviore* LINN. *flor. Lap.* t. 12. In udis ſubalpinis.

294. OROBANCHE caule ſimplici, ſtipulis ternatis, calyce quinquefido. *Orobanche IIII.* LOBEL *It.* II. p. 269. *Baſileæ*, *Siſſaci*, *Fouly.*

295. OROBANCHE, caule ſimplici, ſtipula unica, calyce quadrifido. *Orobanche major* CLUS. *Pann.* p. 242. In pratis ſterilioribus.

296. OROBANCHE caule ramoſo, flore quinquepartito. *Orobanche* CAMER. *Epit.* p. 311. In Cannabe.

297. SQUAMARIA caule ſimpliciſſimo, floribus nutantibus, labello trifido. *Anblatum* CORDI p. 89. b. Frequenter ad ſepes viasque umbroſas.

298. TOZZIA, *Alpina lutea Alſines folio radice ſquamata*, MICHELI *nov. gen.* p. 20. t. 16. In rupibus humectis ſylvisque montanis et alpinis paſſim.

299. LINNÆA floribus germinis LINN. *Spec.* p. 380. *flor. Lapon* t. 12. f. 4. ad *viam malam*, et alibi in Rhaetia.

300. LIMOSELLA LINN. *Spec:* 881. *Plantaginella* RUPP *noſtr. ed.* t. 6. Circa *Rieben*, *Mülhauſen*, *Nidau* In orbitis humidis.

301. MONTIA. Linn. II. p. 129. *aquatica major* Michel t. 13. f. 1. & *minor.* ib. In ſylva *Urban* circa *Mülhauſen*, M. *Ballon* &c.

II. DIANGIAE.

302. ERINUS floribus racemoſis Linn. *Ageratum purpureum* Lusd. p. 1184. In ſubalpinis, etiam montanis, ad vias.

303. EUPHRASIA foliis ovato lanceolatis, argute dentatis Linn.
   α. Flore majori. *Euphraſia* Tabern. p. 862.
   β. Flore minori. *Euphraſia lutea alpina minima ſubrotundo folio nigricante.* Boccone *Muſ. di piant.* t. 60. Illa vulgatiſſima, hæc in Alpinis vulgo.
   γ. *Tenuiſſime diſſecto, anguſto folio* Boccone ib. Agauni & circa Aquilejam &c.

304. ODONTITES bracteis ſerratis hirſutis. *Odontites* Rivin. t. 92. ad vias, inque Stipulis.

305. ODONTITES bracteis glabris integerrimis. *Odontites flores luteo* Rivin. t. 91. Rupes calidæ, aquilejenſes.

306. ODONTITES foliis viſcidis, rariter ſerratis. *Pedicularis annua lutea viſcoſa pomum redolens.* Garidel. p. 351. ic. 80. In ſylva ſupra *Salges.*

307. MELAMPYRUM foliis integerrimis floribus hiantibus, Oed. *Flor. Dan.* ic. 145. In montanis & Alpinis ſylvis.

308. MELAMPYRUM foliis imis integerrimis, mediis dentatis, floralibus haſtatis. *Parietaria ſylveſtris Hort. Aichſtet æſt.* ord. 12. t. 2.

309. MELAMPYRUM foliis ovato lanceolatis, floralibus hamatis, acute dentatis, patulis, calycibus hirſutis. *Melampyrum ſylvaticum* Rivin. t. 81. In ſylvis abiegnis.

310. MELAMPYRUM foliis integerrimis, bracteis ſemipinnatis. *Melampyrum arvenſe* Rivin. t. 80. In agris.

311. MELAMPYRUM foliis integerrimis, floribus ſpicatis, bracteis duplicatis, criſtatis. *Melampyrum*

criſta-

Ʋlontia — Erinus, euphrasia, Odontites, Melampyrum, Stæhelina
Alectorolophus, Pedicularis

cristatum RIVIN. t. 81. In pratis subhumidis & nemoribus.

312. STÆHELINIA foliis cordatis, amplexicaulibus, serratis, floralibus coloratis. *Clinopodium alpinum* PONA *Bald.* p. CCCXLIII. In lapidosis gramineis Juræ & alpium.

313. ALECTOROLOPHUS calycibus glabris. *Crista Galli* DODON. *cereal.* p. 259. agrorum & pratorum vitium.

314. ALECTOROLOPHUS calycibus hirsutis. *Pedicularis lutea* TABERNÆM. p. 791. In agris & ad vias, locis siccioribus.

315. PEDICULARIS caule simplici, foliis pinnatis, pinnis dentatis, denticulis retroversis t. 8. f. 3. *Pedicularis caule simplici, foliis semipinnatis, obtusis, laciniis imbricatis, crenatis* LINN. *Lapon.* t. 11. f. 2. In alpibus lapidosis infrequentior. In M. *Neunenen.*

316. PEDICULARIS caule simpliici, foliis pinnatis, floribus spicatis, staminibus eminentibus t. 8. f. 2. Alpes Valesiacæ altiores.

317. PEDICULARIS spica foliosa t. 9. f. 1. *Pedicularis major Dalechampii* I. B. III. p. 438. In alpinis & subalpinis. Scrobes amat rupestres.

318. PEDICULARIS foliis pinnatis quaternis, floribus spicatis t. 9. f. 2. In alpibus frequentior.

319. PEDICULARIS foliis pinnatis, pinnis dentatis, floribus rostratis, spicatis, calycibus tomentosis. *Pedicularis foliis alternis, pinnis semipinnatis, floribus laxe & longissime spicatis* ALLIONE *spec.* p. 54. t. 12. ad *S. Bernhardi* adscensum.

320. PEDICULARIS caule ramoso, foliis pinnatis, pinnis pinnatis, dentatis, calyce bifido. *Pedicularis* RIVIN. t. 92. In aquosis pratis.

321. PEDICULARIS caule ramoso, procumbente, foliis pinnatis, pinnis dentatis. *Pedicularis minor* RIVIN. t. 92. In M. Juræ herbosis, circa *Ferrière.*

322. PEDICULARIS caule procumbente, ramoso, floribus rostratis sparsis t. 6. f. 1. *Pedicularis II.* SEGUIER. p. 125. In summis alpibus.

323. PEDICULARIS caule simplici, floribus spicatis, rostratis,

ſtratis, calycibus glabris t. 10. *Pedicularis bulboſa* 173. III. p. 478. In alpinis & ſubalpinis.

324. PEDICULARIS caule ſimplici, foliis pinnatis, pinnulis obtuſe dentatis, galea roſtrata t. 11. Incerta planta, neque nuper reperta, in M. *Chaude*.

325. SCROPHULARIA caule quadrangulo, alato, paniculato, foliis ovato lanceolatis. *Scrophularia femina* CAMER. *epit.* p. 827. In foſſis aquoſis.

326. SCROPHULARIA caule quadrangulo, paniculato, foliis cordatis oblongis. *Scrophularia* CAMERAR. *epit.* p. 866. ad vias & foſſas.

327. SCROPHULARIA foliis longe petiolatis, cordatis, ſubhirſutis, petiolis in alis ramoſis. *Scrophularia flore luteo* RIVIN. t. 107. circa *Biſchofszell* Turgoviæ.

328. SCROPHULARIA foliis pinnatis, pinnis lobatis, circumſerratis, caule paniculato. *Ruta canina* LOBEL. II. p. 55. In arenoſis ripis.

329. GRATIOLA RIVIN. t. 106. In pratis udis.

330. DIGITALIS foliis calycinis ovatis, galea integra. *Digitalis* RIVIN. t. 103. circa *Badenweiler*.

331. DIGITALIS foliis calycinis lanceolatis, galea inciſa, faucibus maculoſis. *Digitalis lutea* TABERN. p. 567. In montoſis.

332. DIGITALIS foliis calycinis lanceolatis, galea bifida, floribus immaculatis. *Digitalis flore luteo minore* RIVIN. t. 105. ſimilibus locis, adque vias lapidoſas.

333. ANTIRRHINUM foliis ellipticis obtuſis, floralibus ſpicatis, calycinis obtuſis, calcare breviſſimo. *Antirrhinum* RIVIN. t. 82. In transalpinis.

334. ANTIRRHINUM foliis ellipticis obtuſis, floribus ſparſis, calycibus ſubulatis, longiſſimis, calcare breviſſimo. *Antirrhinum arvenſe* RIVIN. t. 182. Paſſim in agris.

335. ANTIRRHINUM viſcidum, foliis inferioribus conjugatis, ellipticis, obtuſis, calcare dimidii floris longitudine. *Linaria arvenſis minima* RIVIN. t. 85. In arenoſis paſſim.

336. ANTIRRHINUM foliis linearibus, adſcendentibus, congeſtis, caule erecto, ſpicato. *Linaria* RIVIN. t. 83. ad vias & foſſas.

Scrophularia, Gratiola, Digitalis, Antirrhinum —
Polygala, Polygaloides — Fumaria — —

337. ANTIRRHINUM foliis linearibus, adſcendentibus, ſpicatis, confertis, calcare flore longiori †. *Linaria lutea montana Geniſtæ tinctoriæ folio* C. B. In *M. S Bernhard* adſcenſu,

338. ANTIRRHINUM caule procumbente, rariter ſpicato, foliis verticillatis. *Linaria Pannonica II.* CLUS. *pann.* p. 309. In glareis alpinis & ſubalpinis.

339. ANTIRRHINUM caule repente, foliis reniformibus, quinquelobatis. *Cymbalaria* RIVIN. t. 86. In muris calidioribus.

340. ANTIRRHINUM caule procumbente, foliis haſtatis, imis conjugatis, ſuperioribus alternis. *Elatine* CAMERAR. *epit.* p. 754. In agris.

341. ANTIRRHINUM caule procumbente, foliis villoſis ovatis, imis conjugatis, ſuperioribus alternis. *Elatine* RIVIN. t. 86. In agris.

342. ANTIRRHINUM foliis imis elliptico lanceolatis, acute dentatis, caulinis capillaribus trifidis. *Linaria odorata* DODON. *coron.* p. 399. In ſegetibus verſus *Vernier* haud longe *Geneva.*

/. I. II. III. STAMINIBUS CONNATIS.

FLORE POLYPETALO DIFFORMI.

I. TRIPETALÆ OCTOSTEMONES.

343. POLYGALA procumbens, foliis imis ſubrotundis, ſupremis linearibus. *Polygala Buxi minoris folio* VAILLANT. t. 32. f. 2. In pratis altioribus.

344. POLYGALA caule erecto, foliis linearibus acutis. *Polygala vulgaris major* VAILLANT. ib. f. 1. In pratis, ad vias.

345. POLYGALOIDES procumbens, foliis duris, ovatis, nervo ariſtato. *Anonymos flore Coluteæ* CLUS. *pann.* p. 47. In montanis & ſubalpinis.

II. TETRAPETALÆ HEXASTEMONES.

346. FUMARIA foliis multifidis, ſubrotunde lanceolatis, fructibus monoſpermis. *Fumaria* RVIIN. *tetrap.* t. 1. In vineis, hortis.

347

347. FUMARIA foliis pinnatis, pinnis pinnatis, pinnulis lobatis, ovatis, ſiliquis brevibus incriſpatis. *Pſeudo-Fumaria flore luteo* RIVIN. t. 74. In transalpinis.

348. FUMARIA radice bulboſa, cava, caule ſimplici bifolio, bracteis ovato lanceolatis. *Fumaria altera* CAMER. *epit.* p. 891. ad ſepes.

349. FUMARIA radice bulboſa, ſolida, caule ſimplici multifolio, bracteis digitatis. *Fumaria bulboſa* ſ. *tuberoſa minor* TABERN. p. 39. In montanis.

++ III. TETRAPETALÆ DECASTEMONES.

PAPILIONACEÆ.

I. FOLIIS SIMPLICIBUS AUT TERNIS.

350. GENISTA inermis, foliis glabris, confertis, ellipticis, lanceolatis, floribus ſeſſilibus, ſpicatis. *Geniſtella* RIVIN. I. B. In arvis ſiccis.

351. GENISTA inermis procumbens, foliis duris, ſubhirſutis, ſpinis brevibus, folioſis. *Chamægeniſta prima* CLUS. *pann.* p. 50. In M. *Juræ* adclivibus.

352. GENISTA foliis ovato lanceolatis, hirſutis, ſpinis ramoſis, in ramis ſeneſcentibus. *Geniſtella ſpinoſa* RIVIN. t. 67. In nemoribus agri Vaudenſis.

353. GENISTA foliis adpreſſis, ellipticis, ſine lanceolato patente. *Chamægeniſta altera* CLUS. *pann.* p. 51. In altioribus ſylvis Vaudenſibus.

354. SPARTIUM foliis inferioribus ternatis, hirſutis, ſuperioribus ſimplicibus. *Geniſta* RIVIN. t. 65. in Helvetia transalpina.

355. SPARTIUM caule decumbente, ramoſo, foliis ſolitariis ovatis, hirſutis, floribus longe petiolatis. † Paſſim in montis Juræ vallibus.

356. ANONIS caule decumbente, ramis ſeneſcentibus ſpinoſis. *Anonis* FUCHS p. 60. In agris, ad vias.

357. ANONIS foliis ſubrotundis, ſerratis, ternatis, petiolis, multifloris. *Cicer ſylveſtre trifolium* I. B. II. p. 295. ad rupes alpium aquilejenſium & Valeſiacarum.

Genista, Spartium, Anonis — Cytisus. Melilotus

358. ANONIS viſcida, foliis petiolatis ternatis, petiolis unifloris. *Ononis lutea* CAMER. *epit.* p. 344. ad ripas & torrentes Aquilejæ, Valeſiæ.

359. ANONIS foliis ternatis, ovatis, ſerratis, hirſutis, floribus ſeſſilibus, calycibus hiantibus. *Ononis lutea ſylveſtris minima* COLUMN. *ecphraſ.* p. 301, 304. ad declivia graminea Aquilejæ, Valeſiæ.

II. FOLIIS TERNATIS.

360. CYTISUS inermis, floribus racemoſis pendulis, foliolis ternatis LINN. *Laburnum* RIVIN. t. 62. in dumetis Aquilejæ, Valeſiæ.

361. CYTISUS foliis ovatis nitidis, floribus ſpicatis, cernuis, calycibus & ſiliquis ſericeis. *Cytiſus primus* CLUS. *pann.* p. 36. in Helvetia tranſalpina.

362. MELILOTUS ſiliquis racemoſis, pendulis, acutis, rugoſis, diſpermis. *Melilotus* RIVIN. t. 6 in agris & ad vias.

363. TRIFOLIUM caulibus diffuſis, ſpicis ovatis ſtrepentibus. *Lupulinum* RIVIN. t. 10. in agris.

364. TRIFOLIUM caule erecto, ſpicis ſtrepentibus paucifloris. *Trifolium lupulinum alterum minus* RAJ. *ſyn. III.* t. 14. f. 3. in pratis ſubudis.

365. TRIFOLIUM caule erecto, ſpicis ſtrepentibus ovatis. *Trifolium lupulinum montanum* C.B. *prodr.* p. 140. in agris & adclivibus.

366. TRIFOLIUM capitulo ſquamoſo aſpero majus C.B. *prodr.* p. 140. *Michelfeldæ* C. B. plantam indicat, ignotam nuperis.

367. TRIFOLIUM caule repente, ſpicis depreſſis, ſiliquis tetraſpermis. *Trifolium repens* RIVIN. t. 13. Plurimæ varietates in viis, pratisque.

368. TRIFOLIUM caule ſubrecto, ſpicis depreſſis, ſiliquis tetraſpermis. *Trifolium orientale altiſſimum, caule fiſtuloſo, flore albo* VAILLANT. t. 25 f. 5. ad pabula cultum.

369. TRIFOLIUM ſcapis radicatis, floribus racemoſis, foliis lanceolatis nervoſis. *Trifolium anguſtifolium alpinum* PONA *bald.* p. 194. in alpinis.

370. TRIFOLIUM caule repente, ſpicis glabris, calycibus

bus fericeis, ampullafcentibus. *Trifolium fragiferum frificum* CLUS.*pofth.* p. 39. in herbofis udis.

371. TRIFOLIUM caulibus proftratis, capitulis ovatis, in alis feffilibus, calycibus rigidis, fegmentis rectis. *Trifolium flofculis albis, in glomerulis afperis, cauliculis proxime adnatis* VAILLANT. t. 33. f. 1. in aridis Bafileæ, Aquilejæ &c.

372. TRIFOLIUM cauliculo paucifloro, foliis elliptico lanceolatis, nervofis, fubtus fubhirfutis. *Trifolium folio longiore, flore albo* RIVIN. t. 12. in pratis adclivibus.

373. TRIFOLIUM caule ramofo, foliis lanceolatis, ferratis, fpicis villofis ovatis. *Lagopus* RIVIN. t. 15. in agris.

374. TRIFOLIUM foliis fubrotundis, fpicis cylindricis, calycibus plumofis. *Lagopus latifolius* RIVIN. t. 17. Genevæ in pratis adclivibus ad *Arve* fl.

375. TRIFOLIUM foliis nervofis, ciliatis, fpicis ovatis, obefis, calycis denticulis plumofis, imo longiffimo. *Cytifus* TRAG. p. 601. in pratis adclivibus calidioribus.

376. TRIFOLIUM foliis nervofis, fupremis conjugatis, vaginis lanceolatis. *Trifolium fpica longiore flore purpureo* RIVIN. t. 12. in pratis montanis & fylvis.

377. TRIFOLIUM caule obliquo, foliis ovatis hirfutis, fupremis conjugatis, vaginis ariftatis. *Trifolium* RIVIN. t. 11. in pratis, potiffimum udis, & pinguibus.

β. Flore ochroleuco, forte diverfum. in alpibus.

378. TRIFOLIUM caule erecto, foliis hirfutis, fupremis conjugatis, fpicis oblongis †. *Trifolium &c.* LA CHENAL *diff.* in p. 2. in pratis circa Bafileam & Roche.

379. BUCERAS filiquis feffilibus, arcuatis, undique divergentibus. *Fœnum græcum polyceratum* RIVIN. t. 82. in agris circa *Fouly.*

380. MEDICA caule diffufo, capitulis hemifphæricis, filiquis reniformibus. *Melilotus minima* RIVIN. t. 8. in viis glareofis.

Trifolium, Bucera, Medica — Dorycnium, Lotus — Coronilla

381. MEDICA foliis oblongis ſerratis, ſiliquis racemoſis falcatis. *Falcata* RIVIN. t. 84. in aridis & ſepibus Aquilejæ, Baſileæ.

382. MEDICA caule recto, foliis oblongis, ſerratis, racemis erectis, ſiliquis planis, iterato contortis. *Medica* DODON. *cereal.* p. 208. ad vias & agros, caſu nata.

383. MEDICA foliis emarginatis, ſerratis, racemis paucifloris, ſiliquis cohinatis globoſis. *Medica echinata minima* I. B. II. p. 386. & *Medica echinata hirſuta* EJ. ib. in Aquilejenſibus, Baſileæ &c.

III. FOLIIS QUINIS.

384. DORYCNIUM *hiſpanicum* CLUS. hiſp. 201. 202. in Sabaudia Helvetiæ finitima, etiam in Rhætia, hic minus certo.

385. LOTUS ſiliquis umbellatis rectiſſimis, cylindricis. *Lotus* RIVIN. t. 76.

ß. *Lotus corniculata glabra minor* I. B. II. p. 355. in pratis, ad vias.

386. LOTUS caule proſtrato, ſcapis unifloris, ſiliquis alatis. *Lotus ſiliquoſa luteo flore* CLUS. *pann.* p. 763. in pratis udis & ad vias.

IV. FOLIIS PINNATIS.

387. CORONILLA caule brachiato, angulato, foliis vigenis, ariſtatis, floribus umbellatis. *Coronilla flore vario* RIVIN. t. 94. in agris & ad ſepes Aquilejenſium &c.

388. CORONILLA caule erecto, foliis undenis, ovatis, floribus umbellatis, ſiliquis articulatis pendulis. *Coronilla montana* RIVIN. t. 99. ad rupes vallium M. Juræ.

389. CORONILLA fruteſcens, foliis retuſis, ſeptenis, ſiliquis longiſſimis, obiter articulatis. *Coronilla major* RIVIN. t. 95. in ſylvis & ad rupes Juranas & ſubalpinas.

390. CORONILLA caulibus lignoſis, procumbentibus, foliis ovatis, floribus umbellatis, ſiliquis alatis.

Polygalon

Polygalon Cortusi I. B. II. p. 351. alpium Aquilejensium & Valesianorum, ut tamen in planitiem usque descendat.

391. FERRUM EQUINUM siliquis umbellatis, undulatis. *Ferrum equinum comosum* RIVIN. t. 97. ad vias aridas.

392. FERRUM EQUINUM siliquis solitariis, lunatim excisis. *Ferrum equinum* RIVIN. t. 98. auctore CHERLERO. in M. *Dolaz & Genevæ.*

393. ORNITHOPODIUM caule prostrato, foliis pinnatis, siliquis umbellatis, articulatis. *Ornithopodium* DODON. *cereal.* p. 155. in agris trans *Rhenum* prope Basileam.

394. GALEGA foliis ellipticis, spinis & siliquis acutis. *Galega* RIVIN. t. 72. in M. *Randenberg & Rhætia.*

395. HEDYSARUM caule erecto, ramoso, foliis ovatis, siliquis pendulis levissimis t. 12. *Astragalus alpinus helveticus* SCHEUCHZER. *It. II.* p. 330. *Comm. Lit. Nor.* 1736. p. 101. in alpibus aquilejensibus &c.

396. ONOBRYCHIS caule erecto, ramoso, floribus spicatis. *Onobrychis* RIVIN. t. 2. Rupium alpinarum, etiam collium.

397. VULNERARIA caule procumbente, foliis pinnatis sericeis, ovato lanceolatis, umbellis globosis. *Barba Jovis pumila villosa, flore globoso purpureo* BREYNE *prodr. II.* p. 41. *Saleva* mons.

398. VULNERARIA foliis radicalibus ovatis, caulinis pinnatis, umbellis transversis. *Anthyllis* RIVIN. t. 18. flore flavo, albo, & coccineo. in pratis aridis, etiam alpinis.

399. CICER foliis serratis LINN. II. p. 1040. in valle *Tellina.*

400. COLUTEA foliis ovatis, emarginatis, floribus racemosis. *Colutea* RIVIN. t. 20. *Aquilejæ, Neocomi.*

401. ASTRAGALUS caule erecto, ramosissimo, foliis ellipticis, hirsutis, siliquis vesicariis. *Astragaloides elatior erecta, viciæ foliis, siliquis pendulis* AMMAN. *Ruthen.* p. 148. Alpes *Aquilejenses* & vicinæ *Valesiacæ.*

402. ASTRAGALUS caule erecto, ſtipulis maximis, foliis ovatis, novenis, ſiliquis veſicariis †. *Aſtragalus recticaulis hirſuta* I. B. II. p. 334. Alpes *Aquilejenſes*, *Valeſiacæ*, *Rhæticæ*.

403. ASTRAGALUS caule ramoſo, proſtrato, foliis lanceolatis, florum alis emarginatis †. Annon *Aſtragaloides alpina ſupina glabra*, *foliis acutioribus* TILL. *Hort. Piſan.* t. 14. f. 1. Alpes Valeſiacæ *Rupi* proximæ, etiam aquilejenſes.

404. ASTRAGALUS caule procumbente ramoſo, foliis ovatis, ſiliquis inflatis, pendulis, hirſutis. *Aſtragalus alpinus minimus* LINN. *Flor. Lapon.* t. 9. f. 1. Prata ſubalpina, ipſæque alpes.

405. ASTRAGALUS petiolis ramorum ſpineſcentibus. *Tragacantha* CLUS. *poſth.* p. 60. alpina & ſubalpina Valeſiæ inferioris & vicinæ Aquilejæ.

406. ASTRAGALUS ſpicis aphyllis, foliis lanceolatis hirſutis, ſiliquis erectis, inflatis, ſemibilocularibus t. 13. *Aſtragalus Pyrenaicus Barbæ Jovis folio*, *non ramoſus flore ochroleuco glomerato* SCHEUCHZER. *It. IV.* p. 330. alpina.

407. ASTRAGALUS ſcapis aphyllis, foliis ovato lanceolatis, glabris, ſiliquis inflatis, hirſutis, ovatis †. Summæ alpes Valeſiæ, nova, nondum ſatis certa civis.

408. ASTRAGALUS foliis ovato lanceolatis, ſericeis, ſiliquis erectis, inflatis, ſubhirſutis. *Onobrychis IV.* CLUS. *pann.* p. 755. 756. alpina.

409. ASTRAGALUS caule ramoſo, diffuſo, ſpicis erectis, ſiliquis inflatis, rotundis, unguiculatis. *Glaux* RIVIN. t. 108. in agris calidioribus.

410. ASTRAGALUS ſcapis aphyllis, foliis ovato lanceolatis, ſericeis, ſiliquis turgidis, hirſutis, erectis, ſtyliferis t. 14. *It. Helv. II.* 83. t. 2. alpina Juga noſtra & Valeſiaca. Etiam in vallem Valeſiæ inferioris deſcendit.

411. ASTRAGALUS caule erecto, ramoſo, ex alis ſpicifero, ſiliquis teretibus *Comm. Gotting.* Vol. 1. tab. 12. *Cicer montanum lanuginoſum erectum* C.B. *prodr.* p. 48. *Octoduri*, etiam in *Rhætia*.

412. ASTRAGALUS caule ſubrecto, ramoſo, foliis linearibus,

nearibus, fericeis, vexillis longiffimis. *Onobrychis purpureo flore* CLUS. *pann.* p. 751. 752. ad vias Valefiæ.

413. ASTRAGALUS caule proftrato, foliis ovatis, fcapis brevibus racemofis, filiquis fubtriquetris incurvis. *Aftragalus* RIVIN. t. 103. ad vias inque fylvis.

414. ASTRAGALUS caule procumbente, fcapis radicatis aphyllis, foliis ovatis, vexillo longiffimo, filiquis teretibus. *Polygala* CAMER. *epit.* p. 929.

415. ASTRAGALUS acaulos, floribus fummæ radici infidentibus, foliis ovatis, petiolis tomentofiffimis. *Aftragalus acaulos flore luteo* BUXBAUM. *Cent. III.* t. 38. f. 2. in valle *S. Nicolai* inter larices.

416. OROBUS caule fimpliciffimo, foliis fenis, ovatis, acutis LINN. Ἀςραγαλος DIOSCOR. COLUMN. *phytobafan.* p. 60. in fylvis vulgo.

417. OROBUS caule fimplici, foliis fenis, ellipticis, radice tuberofa. *Aftragalus fylvaticus* THAL. p. 7. ic. 1. in fylvis abunde.

418. OROBUS caule ramofo, foliis ovatis duodenis. *Orobus foliis Viciæ* RIVIN. t. 60. in dumetis agri *Aventicenfis*, *Aquilejæ*.

419. OROBUS caule ramofo, erecto, foliis ovato lanceolatis. *Orobus alpinus latifolius* C. B. *prodr.* p. 149. in fylvis *Aquilejenfibus*.

420. ERVUM RIVIN. t. 61. Bernæ feritur.

421. LENS RIVIN. t. 35. in vineis Valefiæ.

422. VICIA foliis linearibus, filiquis racemofis, difpermis, hirfutis. *Cracca minor* RIVIN. t. 53. in fegetibus.

423. VICIA foliis linearibus, filiquis gemellis glabris. *Cracca minor filiquis glabris* RIVIN. t. 13. in agris montofis.

424. VICIA foliis linearibus fericeis, racemis multifloris reflexis, ftipulis integerrimis. *Cracca* RIVIN. t. 49. in fegetibus & pratis humidis.

425. VICIA foliis ellipticis, floribus racemofis erectis, ftipulis argute dentatis. *Vicia Onobrychidis flore* C. B. *prodr.* p. 149. in fegetibus Valefiæ inferioris.

Orobus, Ervum, Lens, Vicia, Lathyrus — —

426. VICIA foliis ovatis, ſtipulis argute dentatis, ſiliquis racemoſis pendulis t. 12. *Viciæ pulchrum genus multifolium, Galega quibusdam* I. B. III. p. 309. in nemoribus, & ad vias ſubalpinas.

427. VICIA foliis ovatis, oblongis, ſtipulis ſerratis, ſiliquis racemoſis, pendulis. *Cracca ſylvatica* RIVIN. t. 50. Rarius circa Baſileam, Tigurum, Solodurum, in transalpinis.

428 VICIA foliis ovatis, maximis, ſiliquis racemoſis pendulis. *Cracca flore ochroleuco* RIVIN. t. 52. LOBELIUS in Helvetia naſci ſcripſit, nuper non repertam.

429. VICIA foliis ovatis oblongis, ſcapis brevibus quadrifloris. *Vicia ſepium perennis* I. B. II. p. 313. ad ſepes & in ſylvis.

430. VICIA foliis imis ovatis, ſuperioribus linearibus, ſcapis breviſſimis, bifloris. *Vicia anguſtifolia* RIVIN. t. 55. in ſegetibus.

431. LATHYRUS foliis ſenis, floribus racemoſis. *Lathyrus paluſtris flore Orobi nemorenſis verni* RUPP. ed II. p. 260. t. 1. in pratis udis circa lacus helveticos.

432. LATHYRUS caule alato, foliis quaternis & binis, lanceolatis, ſcapis multifloris. *Lathyrus ſylveſtris major anguſtifolius* I. B. II. p. 704. circa *les Poſſes*, ſuſpecta ſpecies.

433. LATHYRUS caule alato, foliis ovato lanceolatis, rigidis, ſcapis multifloris. *Lathyrus Narbonenſis* RIVIN. t. 40. circa *Neocomum*.

434. LATHYRUS caule alato, foliis geminis enſiformibus. *Lathyrus ſylvaticus* RIVIN. t. 39. Paſſim in dumetis.

435. LATHYRUS ſcapis multifloris, foliis ovatis, capreolis trifidis. *Lathyrus arvenſis* RIVIN. t. 42. Paſſim in ſegetibus planioribus.

436. LATHYRUS ſcapis multifloris, foliis lanceolatis, capreolis ſimplicibus. *Lathyrus pratenſis* RIVIN. t. 43. in pratis ſubudis.

437. LATHYRUS foliis geminis, ellipticis, floribus ſolitariis & geminis, ſiliquis hirſutis. *Lathyrus ſiliqua hirſuta* RIVIN. t. 41. Paſſim in ſegetibus.

438

438. LATHYRUS foliis geminis, gramineis, stipulis folii latitudine, petiolis unifloris, siliquis alatis. *Lathyrus siliqua latiori* RIVIN. t. 47. in agro Vaudensi.

439. LATHYRUS foliis lanceolatis, stipulis latissimis, scapis brevibus, unifloris, siliquis brevissime alatis. *Lathyrus flore rubro* I. B. II. p. 502. etiam in Vaudensi agro.

440. LATHYRUS foliis gramineis, petiolis unifloris setigeris, siliquis longis erectis. *Lathyrus folio tenuiori, floribus rubris* BUXBAUM. *Cent. III.* p. 29. t. 42. f. 2. circa *Branson* Valosiæ.

441. LATHYRUS pedunculis unifloris, foliis gramineis, stipulis minimis. *Nissolia vulgaris* LINDERN. *hort. Alf.* p. 73. ic. circa Basileam & in segetibus M. Juræ.

442. LATHYRUS aphyllos, stipulis sagittatis latissimis. *Aphaca* DODON. *certal.* p. 157. in segetibus.

I. I. IV. TETRAPETALÆ SILIQUOSÆ.

STAMINIBUS SENIS.

QUORUM DUO BREVIORA.

I. SILIQUOSÆ.

443. LEUCOJUM foliis glabris, lanceolatis, integerrimis. *Leucojum aureum* MATTHIOL. p. 877. In muris vetustis.

444. LEUCOJUM foliis acute dentatis, amplexicaulibus, siliquis nutantibus incanis *Flor. Dan.* t. 62. in rupibus Helvetiæ calidioris.

445. LEUCOJUM foliis oblongis dentatis, spica nutante †. an *Draba succulenta tertia* CLUS. *pann.* p. 463, 464. alpium editiorum.

446. LEUCOJUM foliis levissimis, rariter dentatis, imis petiolatis ovatis, caulinis amplexicaulibus †. *Turritis foliis caulem ambeuntibus polyceration* BOCCONE *mus. di piant.* p. 49. t. 71. in rupibus alpinis, potissimum aquilejensibus.

Leucojum, Hesperis, Arabis, Turritis,

447. LEUCOJUM foliis radicalibus ſubrotundis; ſcabris, dentatis, caulinis amplexicaulibus hirſutis. *Arabis bellidifolia* CRANZ. *faſc. I.* p. 44. n. 4. iisdem locis, rarior.

448. HESPERIS caule hirſuto, foliis ovato lanceolatis, ſerratis, petiolatis, ſubaſperis. *Heſperis ſylveſtris inodora* ad RUPP. t. 1. p. 78. in ruderoſis rarior.

449. HESPERIS foliis glabris, linearibus, lanceolatis, obiter dentatis t. 14 †. *Leucojum anguſtifolium alpinum flore ſulfureo* ALLIONE *ſpec.* f. 20. ad pedem rupium M. *Chaſſeral:* in M. *Creux du Vent au pertuis de la Biſe.*

450. HESPERIS foliis linearibus lanceolatis, obiter dentatis, ſiliquis erectis tetragonis. *Leucojum ſylveſtre* CLUS. P*ann.* p. 337. 338. ad vias Valeſiæ & Helvetiæ transalpinæ.

451. ARABIS caule ramoſo, folioſo, diffuſo, foliis amplexicaulibus dentatis, incanis. *Draba II.* CLUS. *Pann* p. 452. in rupibus humidis montanis & alpinis.

452. ARABIS foliis radicalibus petiolatis, ovatis, dentatis, caule ſubnudo, ramoſo. *Piloſella ſiliquata minor* THAL. ic. 1. locis aridis & in agris ſterilibus paſſim.

453. ARABIS multicaulis, foliis radicalibus, ſcabris, dentatis, dentibus ciliatis †. *Heſperis alpina minor; flore albo, ſiliquis longis.* RAJ. *ſyllog. plant. exter.* p. 296. in M. *Saleva.*

454. TURRITIS foliis glaberrimis, radicalibus petiolatis, rotundis, incurvis, caulinis amplexicaulibus, ſagittatis, obtuſis †. *Braſſica alpina perennis* RUPP. p. 75. in M. *Surchamp.*

455. TURRITIS foliis radicalibus dentatis, hiſpidis, caulinis integerrimis, amplexicaulibus, glabris. *Glastifolia cichoroides I.* B. II. p. 836. Non rara ad vias inque rupestribus.

456. TURRITIS foliis hiſpidis, caulinis amplexicaulibus LINN. p. 930. *Barbarea muralis* I. B. II. p. 869. in rupibus, etiam in agris.

457. ERUCA foliis glabris integerrimis ovatis. *Braſſica campeſtris I.* CLUS. *hiſt.* p. 127. *Mulhuſiæ.*

458.

458. ERUCA caule paniculato, foliis nervosis, ovato lanceolatis, integerrimis. *Arabis quibusdam di-cta planta* CAMER. *Epit.* p. 341. In Vallesia valli Augustæ contermina, ad sepes.

459. ERUCA caule hirto, foliis hirsutis, semipinnatis, pinnis subrotunde deritatis. *Leucojum terre-stre majus frigidarum regionum* COLUMN. p. 260. 262.

Et β *Eruca sylvestris minor bursæ pastoris folio italica* BARRELIER ic. 1016. Prior ad fossas agri *aventicensis :* altera ad ripas & vias *Aqui-lejæ & Valesiæ.*

460. ERUCA foliis pinnatis, pinnis acutissime serratis. *Eruca fruticosa Tanaceti folio indica* ZANON. *hist. plant.* t. 22. in *M. S. Bernhard.*

461. ERUCA foliis glabris pinnatis, pinnis linearibus difformibus. *Sinapi sylvestre* DODON. p. 707. *Basileæ*, *Genevæ.* In *Valesia* ad vias, inque muris.

462. ERUCA foliis scabris, semipinnatis, pinnis rectan-gulis, rariter dentatis. *Eruca cœrulea in areno-sis crescens.* C. B. *Prodr.* p. 40. Basileæ in gla-reosis. *Burgdorfi* in rupibus arenosis.

463. SINAPI foliis radicalibus pinnatis, hirsutis, inca-nis, cornu sua siliqua breviori. *Erysimum foliis subincanis siliquis brevissimis* HERMAN *Paradis. Batav.* p. 155. in agris versus *Alschweiler.*

464. SINAPI foliis tetragonis, hirsutis, floribus venosis. *Eruca sativa* DODON. p. 702. ad vias *Aquile-jenses & Valesiacas.*

465. SINAPI glabris, siliquis tetragonis. *Sinapi siliqua latiuscula, glabra, semine rufo*, s. *vulgare* I. B. II. p. 855. *Agauni* & passim in planitie.

466. SINAPI siliquis hispidis, rostro longissimo, LINN. p. 933. *Sinapi album siliqua hirsuta semine al-bo & rubro* I. B. II. p. 856. in maceriis & ru-derosis.

467. SINAPI siliquis multangulis, torosè turgidis, pro-prio rostro longioribus LINN. p. 933. *Irion.* FUCHS p. 256. in agris.

468. RAPHANUS siliquis teretibus articulatis, levibus, unilocularibus LINN. p. 935. *Lampsana apula Plinii & Dioscoridis* COLUMN. p. 261. in agris.

Eruca, Sinapi, Raphanus, Dentaria, Cardamine

469. DENTARIA foliis quinis digitatis. *Dentaria minor* CAMER. Epit. p. 708.
   ß. *Dentaria pentaphyllos* V. CLUS. *Pann.* p. 453. in ſylvis ſubalpinis & montanis.

470. DENTARIA foliis inferioribus pinnatis, ſupremis ſimplicibus, LINN p. 912. *Coralloides* CORD. p. 151. WAGNERUS habet, non certam civem.

471. CARDAMINE foliis pinnatis, imis obtuſe lobatis, caulinis acute dentatis, floribus apetalis. *Cardamine impatiens*, P. ALPIN. *Exot.* p. 331. in ſubalpibis frequens, etiam Rupe.

472. CARDAMINE caule foliiſque pinnatis, hirſutis, ſubrotundis. *Siſymbrium aquaticum alterum* CAMER. *Epit.* p. 270. in ſylvis circa *Farnsberg* &c.

472. ß. CARDAMINE caule glabro, foliis ſubhirſutis, imis ſubrotundis. *Cardamine IV.* DALECH. LUGD. p. 659. in glareis & pratis circa *Roche.* (*)

473. CARDAMINE foliis pinnatis, ſubrotundis, anguloſis. *Naſturtium aquaticum majus & amarum* C. B. *Prodr.* p. 45. Paſſim in aquoſis.

475. CARDAMINE foliis ternatis obtuſis, caule ſubnudo LINN. p. 913. *Cardamine alpina* CLUS. *pann.* p. 455. 456. in M. *Speluga.*
   ß. *Cardamine alpina foliis latis, teneris, longo pediculo inſidentibus* SCHEUCHZER. It. VI. p. 454. huc pertinet.

476. CARDAMINE foliis radicalibus petiolatis, ovatis, caulinis ovatis, aut pinnatis, obtuſis. *Barbarea montana integro folio* BOCCONE *Muſ. di piante* t. 88. Paſſim in altioribus & ſaxoſis alpium.
   ß. *Naſturtium alpinum minus Reſedæ folio.* C. B. *Prodr.* p. 45. Similibus locis.

477. ERYSIMUM foliis ſcabris, lanceolatis, integerrimis, LINN. p. 923. *Eryſimum tertium* TABERN. p. 449. Baſileæ, Biennæ, in agris & ad vias.

478.

(*) Hæc plantula, quam Cl. viri, ob neſcio quam cauſam, tetraſtemonem fecerunt, quatuor habet manifeſtiſſima & longa ſtamina, & duo breviora: petala parva, longe petiolata; priori certe proxima, durior paulum & erectior.

478. ERYSIMUM foliis pinnatis, pinnis rectangulis acutis, extrema triangulari maxima. siliquis adpressis. *Erysimum Irio* I. TABERN. p. 448. ad vias.

479. ERYSIMUM foliis pinnatis, prima extrema maxima, subrotunda. *Barbarea* I. B. II. p. 868. in fossis.

480. ERYSIMUM foliis cordatis. *Alliaria* FUCHS p. 104. ad vias & in sylvis meduis.

481. SISYMBRIUM foliis radicalibus ovatis, dentatis, caulinis pinnatis, pinnis linearibus, extrema maxima. an *Hesperis flore albo minimo, siliqua longa, folio profunde dentato. Hort. Elth.* f. 177. in editioribus alpium.

482. SISYMBRIUM foliis pinnatis, pinnis rubrotundis, spicis sessilibus. *Nasturtium aquaticum offic.* DODON. *Cereal* p. 246. in fossis & rivis lentioribus.

483. SISYMBRIUM siliquis sessilibus extrorsum recurvis. *Irio alter vulgaris* CAMER. *Epit.* p. 344. Olim Bernæ crescebat, nunc destructum: suspeta planta.

484. SISYMBRIUM pinnis & pinnulis pinnatis, laciniis linearibus subhirsutis. *Sophia Chirurgorum* LOBEL. ic. p. 738. in coemeteriis & ad vias.

485. SISYMBRIUM foliis pinnatis, pinnis dentatis dissitis. *Eruca palustris minor* TABERN. p. 447. Basileæ, Genevæ.

486. RADICULA foliis integris & pinnatifidis, petatis calyce longioribus. *Raphanus aquaticus alter* C. B. *Prodr.* p. 37.

β. Foliis inferioribus ovatis serratis, superioribus semipinnatis. *Rapistrum aquaticum* TABERN. p. 408. in pratis humidis & ad fossas.

487. RADICULA foliis pinnatis, pinnis dentatis, petalis calyce brevioribus †. *Radicula sylvestris* sive *palustris* I. B. II. p. 866. Passim in aquosis.

II. SILICULOSÆ.

488. ALYSSUM foliis imis subrotundis, caulinis pinnatis, filiformibus, amplexicaulibus. *Alysson foliis pinna-*

Eryſimum, Siſymbrium, Ridicula —
Alyſſum, Draba, Lunaria

pinnatis, *multiformibus*, *floribus racemoſis luteis* ALLIONI *ſpecim.* t. 7. p. 40. † in alpibus Griſeis, circa Baſileam.

489. ALYSSUM foliis ſagittatis, ſiliquis cordiformibus. *Camelina* ſ. *Myagrum* DODON. *Coreal.* p. 130.
β. Myagrum fœtidum C. B. *Prodr.* p. 51. Baſileæ, Lauſannæ, in Valleſia.

490. ALYSSUM foliis ſcabris, radicalibus petiolatis, ovatis, dentatis, caule ſubnudo flexuoſo. *Thlaſpi petræum myagroides* PON. *bald.* p. 185. in alpinis & ſubalpinis, etiam montanis.

491. ALYSSUM foliis radicalibus petiolatis, hirſutis, caulinis lanceolatis, leviſſimis †. *Octoduri* & in Vicinia.

492. ALYSSUM ſubfruticoſum foliis ellipticis ſcabris. *Jonthlaspi luteo flore incanum discoides umbellatum montanum* COLUMN. *Ecphraſ.* p. 280. 281. ad rupes ſabuloſas *Burgdorfi*: circa *Birſek*.

493. ALYSSUM caulibus fruticoſis diffuſis, foliis ſubrotundis, incanis † GERARD *Flor. Prov.* t. 17. f. 2. in M. *Stok* Valeſiæ ſuperioris.

494. ALYSSUM foliis ellipticis ſcabris, calycibus perſiſtentibus. *Alyſſum minimum* CLUS. *Pann.* p. 473. in arvis & macilentis.

495. ALYSSUM incanum, ſerpylli folio, fructu nudo. I. R. H. Circa *Branſon*.

496. DRABA cauliculis nudis, foliis ſubhirſutis, tridentatis. *Alſine minima* TABERN. p. 708. in aridis.

497. DRABA cauliculis ſubnudis, foliis ovatis tomentoſis. *Draba auſtriaca* CRANZ. *faſc.* 1. t. 194.

498. DRABA cauliculis nudis, foliis linearibus ciliatis. *Sedum alpinum* VI. CLUS. *pann.* p. 491. in ſubalpinis & ſubmontanis.

499. DRABA caule ramoſo, foliis cordatis, dentatis, amplexicaulibus LINN. p. 909. *Draba minima muralis diſcoides* COLUMN. p. 272. 279. Circa Baſileam ad ſepes.

500. LUNARIA perennis, ſiliquis ovato lanceolatis. *Viola lunaria latifolia odorata* CLUS. *hiſt.* p. 297. in rupibus Valeſiæ inferioris & Juræ &c.

501. BISCUTELLA ſilicula levi, foliis dentatis aſperis. *Leucojum alyſſoides umbellatum montanum* COLUMN. p. 283. 284. in alpinis & ſubalpinis.

502. CORONOPUS BLAKWELL t. 120. Genevæ, Baſileæ ad vias.

503. NASTURTIUM foliis radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis, ſubſinuatis LINN. p. 903. *Cochlearia* DODON. *pempt.* p. 594. in rupibus *du Grand Val;* in paludoſis haud longé a rupe.

504. NASTURTIUM foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Raphanus magna* DODON. p. 678. *Nidoviæ.*

505. NASTURTIUM foliis ovato lanceolatis, integris, ſerratis. *Lepidium* PLIN. 716. in alpibus *aquilejenſibus: Arbergæ ad Arolam.*

506. NASTURTIUM fruticoſum, foliis glaucis, linearibus, ſubhirſutis. *Thlaspi fruticoſum alterum* LOBEL. p. 218. in Valeſia inferiori SCHEUCHZER, nuper non viſum.

507. NASTURTIUM foliis imis pinnatis, inciſis, ſuperioribus linearibus, integerrimis. *Iberis* MATTHIOL. p. 293. in *Vaudenſi* agro ad vias.

508. NASTURTIUM apetalum, foliis pinnatis, radicalium pinnis ſemipinnatis, caulinis ſimplicibus. *Thlaspi anguſtifolium* FUCHS p. 307. ad vias Baſileæ, in agro *Vaudenſi*, *Rupe.*

509. NASTURTIUM foliis imis petiolatis ovatis, caulinis ſagittatis, dentatis. *Thlaspi latifolium* FUCHS p. 306.

 β. Foliis glabris. *Thlaspi I.* MATTH. p. 566. ad vias.

510. NASTURTIUM foliis imis ovatis, reliquis amplexicaulibus cordatis *Thlaspi alterum minus rotundum* COLUMN. p. 276. in arvis, vallis, ad vias.

511. NASTURTIUM ſiliquis orbiculatis, planis, foliis oblongis, dentatis, glabris. *Thlaspi cum ſiliquis latis* I. B. II. p. 923.

512. NASTURTIUM foliis pulpoſis, ellipticis, ſiliculis alatis emarginatis. *Lithonthlaspi parvum car-*

ne

Biscutella, Coronopus, Nasturtium, Lepidium
Iberis, Rapistrum, Isatis

neo rotundo folio Columm. *Ecphras.* p. 277. 279. in rupeſtribus circa *Ruchenette*

513. NASTURTIUM. *Alpinum capſula naſturti hortenſis* I. B. II. p. 918. Planta nuperis ignota

514. NASTURTIUM ſiliquis triangularibus. *Burſa paſtoris* Camer. *epit.* p. 340. ad vias.

515. NASTURTIUM foliis pinnatis, radicalibus ovato lanceolatis, caulinis linearibus. *Cardamine puſilla ſaxatilis montana* διςκοειδες Columm. p. 273. 277. in rupibus circa *Porte du Sex*, circa *Genevam.*

516. LEPIDIUM foliis pinnatis, pinnis ovatis æqualibus. *Lepidium Halleri* Cranz. *faſc.* 1. t. 1. f. 3. in alpinis ubique.

517. LEPIDIUM caule repente, foliis ovatis, amplexicaulibus. *Enum. ſtirp. helv.* Allione *ſpec.* p. 27. t. 4. in alpinis glareoſis frequens.

518. LEPIDIUM caule erecto, foliis radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus ſagittatis. *Thlaſpi Badenſe* Clus. *pann.* p. 275. 276. in montanis rupeſtribus.

519. LEPIDIUM caule erecto, foliis radicalibus petiolatis, caulinis ovatis, amplexicaulibus. *Thlaſpi pumilum* Clus. *pann.* p. 468. 469. in ſummis alpibus.

520. IBERIS foliis dilatatis, dentatis, floribus umbellatis. *Thlaſpidium folio iberidis* Rivin. *tetrap. irreg.* t. 112. in agris vaudenſibus.

521. IBERIS foliis pinnatis, pinnis ovatis acutis. *Naſturtium petræium* Tabern. p. 451. in ſabuloſis circa Genevam, Baſileam &c.

522. RAPISTRUM foliis amplexicaulibus auriculatis, acutis. *Pſeudo myagri alia ſpecies minor, vaſculis rotundioribus* Camerar. *Epit.* p. 902. n. 5. Paſſim circa *Bevieux*, in *Valeſia*, circa *Biennam*, *Moncharans* &c. in agris planioribus.

523. ISATIS foliis radicalibus petiolatis, ovatis, caulinis amplexicaulibus. *Iſatis ſylveſtris* Camerar. *Epit.* p. 410. in *Valeſia* ad vias.

524.

524. MYAGRUM loculo fecundo conico, ſterili biloculari. *Myagrum monoſpermum latifolium* C. B. *prodr.* p. 51 52. circa *Bühlbencken.*
525. MYAGRUM ſiliquæ articulo primo ſtricto, altero globoſo ſtriato. *Rapiſtrum monoſpermum* C. B. *prodr.* p. 37. circa *Aquilejam &c.*
526. BUNIAS ſiliqua tetragonia, quatuor alis emarginatis. *Sinapi echinatum* I. B. II. p. 856. in ſegetibus Valeſiæ, circa *Chexbres.*
527. TRAPA foliis natantibus, petiolis ventricoſis. *Tribulus aquaticus* CAMERAR. *epit.* p. 715. in lacu *Clavennenſi.*

I. II. V. MEIOSTEMONES.

I. TETRAPETALÆ DISTEMONES.

528. FRAXINUS apetala, foliis pinnatis ſerratis. *Fraxinus* MATTHIOL. p. 135. in collibus & ſylvis.

II. MONOPETALÆ DISTEMONES.

529. JASMINUM foliis oppoſitis lanceolatis. *Jaſminum album* TABERN. p. 886. in valle *Tellina & Aquilejenſibus.*
530. LIGUSTRUM MATTHIOL. p. 170. ad ſepes.
531. SYRINGA foliis ovato cordatis LINN. *Syringa flore cæruleo* CLUS. *hiſt.* p. 58. in ſylvis.
532. VERONICA foliis lineari lanceolatis, racemis ex alis paucifloris. *Veronica aquatica anguſtifolia* RIVIN. *monop. irreg.* t. 96. paſſim in foſſis.
533. VERONICA foliis lanceolatis, ſerratis, glabris, ex alis racemoſa. *Beccabunga minor* RIVIN. t. 100. in foſſis vulgo.
534. VERONICA foliis ovatis, ſerratis, glabris, ex alis racemoſa. *Beccabunga* RIVIN. t. 100. vulgatiſſima in foſſis.
535. VERONICA foliis hirſutis, nervoſis, ſeſſilibus, cordato lanceolatis, floribus racemoſis, longe petiolatis. *Veronica prætenſis omnium maxima* BUXBAUM. *Cent. I.* t. 24. in ſylvis circa Bernam &c.

Alyssum, Bunias, Trapa — Fraxinus — Jasminum, Ligustrum, Syringa, Veronica —

536. VERONICA foliis cordatis, subrotundis, hirsutis, nervosis, ex alis racemosa. *Veronica pratensis latifolia* RIVIN. t. 94. in pratis & ad vias.

537. VERONICA foliis cordatis obtusis, nervosis, serratis, racemis densissimis. *Veronica montana* RIVIN. t. 95. ad vias montanas.

538. VERONICA foliis imis ellipticis, dentatis, supremis lanceolatis, ex alis racemosa. *Veronica angustifolia minor* RIVIN. t. 95. circa Basileam.

539. VERONICA caule procumbente, foliis hirsutis, cordatis, retusis, racemis paucifloris. *Veronica procumbens* RIVIN. t. 93. in sylvis Bernæ & alibi.

540. VERONICA caule procumbente, foliis scabris, petiolatis, ovatis, ex alis racemosa. *Veronica* CAMERAR. *epit.* p. 461. vulgo in sylvis.

541. VERONICA caule nudo, foliis ovatis, serratis, racemo paucifloro. *Veronica alpina pumila caule aphyllo* BOCCONE *muf. di piant.* t. 1. & 9. in alpinis, etiam montibus altioribus.

542. VERONICA foliis ellipticis, serratis, conjugatis, floribus spicatis. *Veronica spicata minor* VAILLANT. t. 33. f. 4. passim in gramineis aridis & calidis.

β. spicis numerosis. *Veronica major angustifolia* CLUS. *pann.* p. 617. 619. circa *St. Tryphon.*

543. VERONICA caule simplici, paucifloro, foliis scabris, serratis, ovatis, spica pauciflora tab. 15. *Veronica alpina Bellidis folio hirsuto* C. B. *prodr.* p. 116. in alpibus inprimis Aquilejensibus.

544. VERONICA caule simplici, foliis ovatis, glabris, subserratis, spica pauciflora t. 15. *Teucrium Etscherianum* CLUS. *pann.* p. 616. in alpibus ubique.

545. VERONICA caulibus fruticosis, declinatis, foliis glabris ellipticis, dentatis, floribus in summitate confertis, petiolatis t. 16. *Veronica tertia* CLUS. *pann.* p. 620. 621. in alpinis & subalpinis.

β. flore cæruleo. *Veronica saxatilis* I.B.III. p. 284. in alpibus, editiori paulum loco, quam prior.

546. VERONICA caule recto, foliis ovatis, crenatis, glabris,

glabris, petiolis ex alis unifloris, breviſſimis. *Veronica erecta ſylveſtris* RIVIN. t. 93. ad vias & in pratis.

547. VERONICA caule ſubpiloſo, foliis ovatis, glabris, crenatis, pedunculis unifloris. *Veronica minima Clinopodii minoris folio, glabra Romana* VAILLANT. t. 23. f. 3. locus incertus.

548. VERONICA caule erecto, foliis ovatis, ſubhirſutis, dentatis, petiolis breviſſimis. *Alyſſon* COLUMN. *phytobaſ.* p. 27. 28. in pratis.

549. VERONICA caule procumbente, foliis petiolatis, ovatis, crenatis. *Veronica folio Chamædryos* RIVIN. t. 97. in hortis & agris.

550. VERONICA caule procumbente, foliis lobatis, petiolatis, pedunculis unifloris. *Veronica Hederæ folio* RIVIN. t. 97. in hortis & agris.

551. VERONICA foliis ovatis, tripartitis & quinquepartitis, petiolis unifloris. *Veronica folio Rutæ* RIVIN. t. 96. Baſileæ, Genevæ &c.

552. VERONICA foliis ovatis, tripartitis & quinquepartitis, petiolis unifloris breviſſimis. *Veronica montana* RIVIN. t. 96. in Valeſia inferiori.

III. MONOSTEMONES.

553. STELLARIA foliis petiolatis, ſubrotundis. *Callitriche Plinii* COLUMN. p. 315. 316. ubique in foſſis aqua plenis.

554. STELLARIA foliis imis linearibus, ſupremis ſubrotundis †. *Stellaria aquatica* LOBEL. p. 792. circa Bernam.

555. STELLARIA foliis omnibus linearibus. *Lenticula paluſtris, anguſtifolia, folio in apice biſecto* LOBEL. ic. 38. iisdem locis.

556. NAJAS fructu monoſpermo. *Fluvialis latifolia fructu minus obtuſo monoſpermo* MICHELI p. 11. t. 8. f. 2. Baſileæ.

-Stellaria, Najas - # Impatiens, Viola-

I. I. VI. ISOSTEMONES.

I. FLORE DIFFORMI POLYPETALO.

557. IMPATIENS caule geniculato, pedunculis ramosis, foliis petiolatis, ovatis, crenatis. *Balsamina altera, noli me tangere* COLUMN. *ecphras.* p. 150. in umbrosis sylvarum & urbium.

558. VIOLA acaulis, stolonifera, foliis cordatis LINN. p. 1324. *Viola* RIVIN. *pentap. irreg.* t. 117. ad sepes.

559. VIOLA acaulis, foliis cordatis hispidis LINN. p. 1724. *Viola martia hirsuta inodora* HIST. OXON. II. p. 415. t. 9. f. 1.

560. VIOLA acaulis, foliis reniformibus. Icon OEDER. t. 83. in alpinis humidis.

561. VIOLA acaulis, foliis multifidis obtusis. *Viola acaulis, foliis palmato multifidis & laciniatis* ALLIONE *Misc. Taur. III.* p. 181. t. 5. in summis alpibus *Rhæticis & Valesiacis.*

562. VIOLA caule procumbente ramoso, foliis petiolatis, cordatis. *Viola inodora major* RIVIN. t. 117. in sylvis & ad vias.

563. VIOLA caule debili, foliis petiolatis reniformibus. obtuse dentatis. *Viola flore luteo* RIVIN. t. 119. in petrosis montanis & alpinis.

564. VIOLA multicaulis, foliis ovatis, petiolatis, integerrimis. *Viola acaulis foliis uniformibus obtusis integerrimis* ALLIONE p. 14. t. 3. f. 7. in alpibus *Aquilejensibus* & obversis *Valesiacis.*

566. VIOLA caule erecto, paucifloro, foliis imis subrotundis, caulinis ellipticis, stipulis semipinnatis maximis t. 17. *Viola montana II. purpureo flore* CLUS. *pann.* p. 376. & *V. tricolor I.* EJ. p. 358. & *V. tricolor odoratissima* EJ. ib. in alpibus.

567. VIOLA caule lato, erecto, foliis ellipticis, crenatis, stipulis semipinnatis. *Viola arborescens* CAMER. *epit.* p. 911. in humidis montanis & subalpinis.

568. VIOLA caule angulοso, diffuso, foliis ovatis, dentatis, flore calyce duplo longiore. † *Viola tricolor* RIVIN. t. 120. in montanis & subalpinis pratis & arvis.

569. VIOLA caule diffuſo, ramoſo, foliis ovatis, dentatis, flore calyce paulo majori. *Jacea altera* CAMER. *epit.* p. 913.

570. VIOLA foliis cordato lanceolatis, ſerratis, ſtipulis lanceolatis, acute dentatis. *Viola pyrenaica Teucrii folio longius caudato* I. R. H. in paſcuis M. *Juræ* RAJUS.

II. DICARPÆ.

571. ASCLEPIAS ex alis racemoſa, caulibus ſimplicibus erectis, foliis ovato lanceolatis. *Vincetoxicum* DODON. *purg.* p. 21. in lapidoſis.

572. PERVINCA caulibus procumbentibus, foliis ovato lanceolatis, petiolis unifloris. *Clematis Daphnoides* BLAKWELL. t. 59. ad ſepes.

573. PERVINCA caulibus erectis, foliis ovato lanceolatis, ciliatis, petiolis unifloris. *Clematis Daphnoides major* DODON. p. 406. in lapidoſis circa *Yvorne*, *Grandchamp &c.*

III. CUCURBITACEÆ.

574. BRYONIA foliis palmatis, ſcabris LINN. p. 1438. *Bryonia alba* DODON. *purg.* p. 230. ad ſepes.

IV. SOLANACEÆ.

575. SOLANUM caule flexuoſo, fruteſcente, foliis cordatis & tripartitis. *Dulcamara* DODON. *purg.* p. 230. in aquoſis.

576. SOLANUM caule inermi, herbaceo, foliis dentato angulatis, umbellis nutantibus LINN. p. 266. *Solanum hortenſe* FUCHS p. 686. in hortis & ad vias.

577. PHYSALIS foliis conjugatis, cordatis, ſinuatis, caule ramoſo. *Solanum veſicarium* DODON. *purg.* p. 355. in umbroſis.

578. MANDRAGORA DODON. *purg.* p. 362. in M. *Generoſo.*

-Asclepias, Pervinca - Bryonia - Solanum, Physalis, Mandragora, Belladonna, Hyoscyamus, Verbascum, Stramonium -

579. BELLADONNA caule herbaceo, brachiato, foliis ovato lanceolatis, integerrimis. *Solanum lethale* DODON. *purg.* p. 360. in ſylvis cæduis.

580. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus, ſinuatis, floribus ſeſſilibus LINN. *Hyoscyamus* RIVIN. *monop. irreg.* t. 102. ad vias non frequentiſſimus.

581. VERBASCUM foliis decurrentibus, utrinque tomentoſis. *Verbaſcum* CAMER. *epit.* p. 878. ad vias.

582. VERBASCUM foliis ovatis, utrinque tomentoſis, imis petiolatis, ſtigmate bicolli. non ſatis certa ſpecies.

583. VERBASCUM ſpica ramoſa, foliis ovato lanceolatis, inferioribus petiolatis. *Verbaſcum luteum* TABERN. p. 565.

β. Verbaſcum flore albo, parvo I. B. III. p. 813. ad vias.

584. VERBASCUM foliis imis petiolatis, cordato lanceolatis, ſuperioribus ſeſſilibus, ovato lanceolatis. *Verbaſcum nigrum* TRAG. p. 217. ad vias.

585. VERBASCUM ſpica rariſſima, foliis glabris, ſerratis, cordato lanceolatis, imis ſemipinnatis, ſuperioribus amplexicaulibus. *Blattaria flore luteo* HORT. AICHSTETT. *æſtiv. ord.* 10. t. 4. f. 2. ad vias agri *Ebrodunenſis*, *Genevenſis*.

586. STRAMONIUM foliis angulofis, fructu erecto, muricato, calyce pentagono. *Solanum manicum Dioſcoridis* COLUMN. *phytobaſ.* p. 47. ad vias circa urbes.

V. ASPERIFOLIÆ.

587. CYNOGLOSSUM foliis ellipticis, lanceolatis, ſericeis, caule folioſo. *Cynogloſſum vulgare* MATTH.

588. CYNOGLOSSUM foliis aſperis, planis, ſeſſilibus, elliptico lanceolatis. *Cynogloſſum folio virente* I. B. III. p. 600. infrequenter in ſylvis ſubalpinis & montanis.

589. CYNOGLOSSUM glandulis faucium glabris. *Cynogloſſa minor montana ſerotina altera* COLUMN. *ecphraſ.* p. 179. 180. in muris calidis.

590. SCOR.

590. SCORPIURUS annuus radice exigua. *Auricula muris cœrulea* TABERN. p. 197. in pratis, ad vias, in agris.

591. SCORPIURUS radice longa, fibroſa, perenni. *Lycopſis montana cærulea* BARRELIER. ic. 404. in aquoſis & in dumetis.

592. SCORPIURUS foliis ovatis, ſpica pauciflora, calycibus tomentoſis †. *Lithoſpermum alpinum tomentoſum minimum* SCHEUCHZER. *It. II.* p. 137. in ſummis alpibus.

593. HELIOTROPIUM foliis ovatis petiolatis, ſpicis inferioribus ſimplicibus, ſupremis gemellis. *Heliotropium vulgare* BOCCONE *plant. ſicut.* t. 49. in agris planitiei.

594. HELIOTROPIUM foliis lingulatis, floribus tubuloſis. *Echioides flore albo* RIVIN. t. 9. in agris planitiei.

595. LITHOSPERMUM caule erecto, ramoſiſſimo, floribus calycem vix ſuperantibus. *Lithoſpermum arvenſe* TABERN. p. 850. in glareoſis & dumetis circa fluvios.

596. LITHOSPERMUM caule procumbente, radicato, ramis floralibus erectis. *Lithoſpermum minus* DODON. p. 85. in dumetis circa *Aquilejam*, *Baſileam.*

597. PULMONARIA foliis radicalibus cordatis, ſcabris LINN. *Pulmonaria altera* MATTHIOL. p. 840. in dumetis, adque ſepes.

598. PULMONARIA foliis radicalibus lanceolatis. *Pulmonaria rubro flore* CLUS. *pann.* p. 671. in ſylvis montanis.

599. BUGLOSSUM foliis linguiformibus aſperis, ſpicis ſupremis gemellis. *Bugloſſa altera* TRAG. p. 231 232 in planitie calida, *Rhætiæ*, *Valeſiæ.*

600. SYMPHYTUM foliis ovato lanceolatis, decurrentibus LINN. *Walwurz - Weiblein* BRUNFELS. I. p. 76. ubique in aquoſis inque ſylvis.

β. flore rubro. *Walwurz - Männlein* BRUNFELS. l. c. in planitie circa Baſileam &c.

601. SYMPHYTUM foliis lingulatis, hiſpidis. *Anchuſa echioides*, *Cerinthes flore montana* COLUMN.

 p. 182

Cynoglossum, Scorpiurus, Heliotropium, Lithospermum, Pulmonaria, Buglossum, Symphytum, Cerinthe, Echium, Lycopsis, Asperugo, Borrago

p. 182. 183. in Aquilejensi Deminio inque Valesia.

602. CERINTHE foliis amplexicaulibus ovatis, floris denticulis brevissimis, revolutis. *Cerinthe quorumdam* CLUS. *hisp.* p. 140. in montosis sylvis Aquilejensium &c.

603. ECHIUM alis spiciferis, foliis asperis, lingulatis, calycibus hirsutis. *Echium* RIVIN. t. 7. ad vias.

604. ECHIUM foliis hirtis, lingulatis, calycibus pungentibus, spicis laxis, paniculatis. *Echium flore albo* CAMER. *epit.* p. 758. in Valesia.

605. LYCOPSIS foliis asperrimis, undulatis, serratis, linguiformibus. *Echioides* RIVIN. t. 7. passim ad vias inque ruderosis.

606. ASPERUGO calycibus fructus compressis LINN. *Borrago minor sylvestris*, Καρποχηνοπους COLUMN. p. 181. 183. passim in herbosis viarum.

607. BORRAGO foliis asperis lanceolatis, palis florum duplicatis. *Borrago* DODON. p. 627. in hortis, ad vias, in maceriebus.

VI. VASCULIFERÆ.

608. PRIMULA foliis hirsutis, rugosis, dentatis, scapis unifloris. *Alisma sylvarum* COLUMN. *phytobas.* p. 19. in agro Vaudensi ad vias.

609. PRIMULA foliis rugosis dentatis, scapis multifloris, floribus exterioribus nutantibus. *Primula veris altera* CAMER. *epit.* p. 884. in pratis, sylvis.

610. PRIMULA foliis rugosis, dentatis, hirsutis, scapis multifloris, floribus omnibus nutantibus † *Alisma pratorum* COLUMN. *phytobas.* p. 11. in pratis apricis.

611. PLIMULA foliis glabris, ellipticis, rugosis, serratis, floribus umbellatis, tubo longissimo †. in summis alpibus Valesiæ mediæ.

612. PRIMULA umbellifera, foliis serratis, glabris, carnosis. *Alisma* COLUMN. *phytobas.* p. 17. in alpinis & montanis.

613. PRIMULA foliis subhirsutis, dentatis, scapo paucifloro.

ro. † *Auricula urſi II. rubro flore* Clus. *pann.* p. 341 346. in alpibus paſſim, inque Valeſia inferiori.

614. PRIMULA foliis cuneiformibus, nitidis, ſcapis unifloris Jacquin. obſ. p. 25. t. 14. *Auricula urſi VI.* Clus. *pann.* p. 350. Cherler ſupra M. *S. Gotthardi* indicat, nuper non viſam.

615. PRIMULA foliis ciliatis, ellipticis, carnoſis, integerrimis. *Auricula urſi IV.* Clus. *pann.* p. 359.

616. ARETIA foliis rugoſis, acutis, retroverſis, ſcapis breviſſimis, unifloris. *Sedum alpinum F. Gregorii Rhegienſis* Columbn. *ecphraſ. II.* p. 63. 65. in alpibus ſummis auſtralibus Valeſiæ mediæ & ſupremæ.

617. ARETIA foliis ſubhirſutis, ovatis, cauliculos tegentibus, floribus breviſſime petiolatis t. 11. in alpibus occidentalibus frequens.

618. ARETIA foliis ovatis repandis, ſcapis unifloris, t. 11. in alpibus Aquilejenſibus & *Penninis.*

619. ARETIA foliis craſſis, rugoſis, gramineis, ſcapis multifloris t. 17. † in alpibus Valeſiæ inferioris, Abbatiscellanorum &c.

620. ARETIA foliis ovatis, villoſis, ſcapis umbellatis. *Sedum alpinum alterum lacteo flore* Clus. *pann.* p. 489. 490. in alpibus vulgo.

621. ARETIA foliis ellipticis lanceolatis, glabris, ſcapis umbellatis. † *Androſace glabra obtuſo folio umbellifera* Allione *ſpec.* p. 22. t. 4. in alpibus paſſim.

622. ARETIA foliis gramineis, ſcapis paucifloris. *Sedum alpinum tertium lacteo flore* Clus. *pann.* p. 490. in Jura M. frequens.

623. ARETIA foliis glabris, ellipticis, rugoſis, ſubtus farinoſis, floribus umbellatis. *Primula veris rubro flore* Clus. *pann.* p. 340. ubique in aquoſis montanis & ſubalpinis.

624. ANDROSACE ſtipulis quinis ampliſſimis. *Androſace altera* Camer. *epit.* p. 639. circa *Avén* Valeſiæ.

625. ANAGALLIS caule procumbente, foliis ovato lanceolatis, petalis ſerratis, calycis ſegmentis ſubulatis. *Anagallis femina* Camer. *epit* p. 395. in agris planitiei.

Primula, Aretia, Androsace, Anagallis, Centunculus, Lysimachia, Hottonia, Menianthes, Soldanella, Cyclaminus,

627. CENTUNCULUS. *Anagallis paluſtris* VAILLANT. p. 12. t. 4. f. 2. ad ſummum lacum Lemanum: circa *Domum rubram Baſileæ.*

628. LYSIMACHIA caule decumbente, foliis ovato lanceolatis, petiolis alaribus unifloris. *Anagallis luteo flore* CLUS. *pann.* p. 492. 493. in ſylvis.

629. LYSIMACHIA caule proſtrato, foliis ſubrotundis, petiolis alaribus unifloris. *Nummularia* CAMER. *epit.* p. 755. vulgo in humidis.

630. LYSIMACHIA foliis ovato lanceolatis, ſpicis paniculatis. *Lyſimachia* MATTHIOL. p. 349. in aquoſis.

631. LYSIMACHIA racemis alaribus, denſiſſimis, folio brevioribus. *Lyſimachia lutea altera Lobelii*, CLUS. p. LIII. circa *Hegnau* agri Tigurini.

632. HOTTONIA florum verticillis ſpicatis. *Stratiotes vulgare* VAILLANT. *mem.* 1719. p. 20. paſſim in foſſis, circa tres lacus *Neocomenſem*, *Biennenſem*, *Moratenſem. Michelfeldæ.*

633. MENIANTHES foliis ternatis LINN. *Trifolium paluſtre* CORD. p. 96. vulgo in humidis foſſis, & inundatis.

634. SOLDANELLA minore folio CLUS. *pann.* p. 355. in alpibus ubique, in montibus rarius.

635. CYCLAMINUS flore cernuo, ſegmentis revolutis. *Cyclaminus* CAMER. *epit.* p. 357. in ſaxoſis ſubalpinis & Juranis.

β. *Cyclaminus parva radice* I. B. III. p. 553. in ſylvis haud longe *Curia Rhætorum.*

γ. *Cyclaminus μακρόρριζος* CAMER. *epit.* p. 358. inter *Fläſch* & *Luciſteig.*

636. GENTIANA foliis radicalibus petiolatis, ovatis, floribus paniculatis, rotatis, ſpicatis. *Gentiana XII.* CLUS. *pann.* p. 292. in aquoſis ſubalpinis, non ubique.

637. GENTIANA caule folioſo, foliis ovatis, nervoſis, floribus verticillatis, rotatis. *Gentiana* CAMER. *epit.* p. 415. in ſubalpinis & montanis ubique.

638. GENTIANA foliis ovato lanceolatis, nervoſis, floribus campaniformibus, faſciculatis, creberrime punctatis.

punctatis. *Gentiana major pallida punctis distincta* CLUS. *pann.* p. 280. in alpibus, non tamen perinde vulgaris.

639. GENTIANA foliis ovatis, lanceolatis, nervosis, floribus campaniformibus, fasciculatis, rariter punctatis. *Gentiana I. s. major purpureo flore* CLUS. *pann.* p. 277. 278. in alpinis non infrequens.

640. GENTIANA floribus campaniformibus, alis paucifloris, foliis ovato lanceolatis. *Gentiana Asclepiadis folio* GESNER. *pann.* p. 280. 281. passim in subalpinis.

641. GENTIANA alis floriferis, foliis linearibus. *Gentiana angustifolia* CLUS. *pann.* p. 284. in udis non rara.

642. GENTIANA caule unifloro, foliis lanceolatis, flore maximo, campaniformi. *Gentianella verna major* CLUS. *pann.* p. 284. 285. in montibus inque subalpinis.

643. GENTIANA foliis ovato lanceolatis, nervosis, vaginalibus, floribus verticillatis & umbellatis. *Cruciata* DODON. *purg.* p. 71. in pratis & sylvis Bernæ & alibi.

644. GENTIANA foliis ovato lanceolatis, caule unifloro. *Gentianella verna minor* CLUS. *pann.* p. 285. in udis submontanis & subalpinis.

645. GENTIANA foliis ovatis, caule unifloro. *Gentianella elegantissima Bavarica* CAMER. *hort.* ic. XV. alpina saxosa.

646. GENTIANA caule ramoso, calycibus alatis. *Gentianella cærulea cordata* COLUMN. p. 220. 221. in montanis & alpinis, etiam in udis planitiei.

647. GENTIANA caule ramoso, foliis ovato lanceolatis, floribus infundibuliformibus. *Gentiana XI.* CLUS. *pann.* p. 291. alpina.

648. GENTIANA caule dichotomo, floribus infundibuliformibus, strictis. *Centaurium minus* DODON. *purg.* p. 52. in sylvis & pratis.

649. GENTIANA foliis radicalibus ovatis, caulinis triangularibus perfoliatis, floribus octofidis. *Centaurium luteum* CAMERAR. *Epit.* p. 427. circa *Genevam*, *Viviscum*, *Michelfeldam*.

Gentiana, Cuscuta, Plantago

650. GENTIANA faucibus barbatis, calycis foliis quaternis, alterne majoribus. Οψανθη RENEAULME p. 71. in submontanis & subalpinis.

651. GENTIANA faucibus barbatis, calycis segmentis quinis æqualibus. *Gentianella purpurea minima* COLUMN. p. 221. 223. Basileæ, circa *Ferrières*.

652. GENTIANA floribus solitariis, longissime petiolatis, faucibus fimbriatis †. in M. *Aussés* & circa glacialia *Valsorey Valesiæ*.

653. GENTIANA flore quadrifido, oris ciliatis. *Gentianella cærulea autumnalis angustifolia* COLUMN. p. 221. 223. passim ad vias & in sylvarum oris.

654. CUSCUTA floribus sessilibus. β. minor. Illa in frigidis montanis, hæc in calidis.

655. PLANTAGO scapo unifloro. *Plantago floribus femineis sessilibus ad exortum scapi uniflori maris* IUSSIEU *mem.* 1742. p. 131. t. 7. ad lacus *Tigurinum*, *Biennensem*, *Thunensem* in arenosis.

656. PLANTAGO foliis lanceolatis, quinquenerviis, scapo nudo, spica ovata. *Plantago angustifolia minor* TABERN. p. 732.

β. *Plantago angustifolia alpina* I. B. III. p. 506. Illa ad vias, hæc in alpinis nigrior.

657. PLANTAGO foliis linearibus, planis, spica cylindrica. *Coronopus serpentina* I. B. III. p. 510. & *Coronopus serpentina omnium minima* EJ. p. 511. in montibus & pascuis subalpinis.

658. PLANTAGO foliis subhirsutis, semipinnatis, pinnis raris, lanceolatis. *Herba stella* DODON. p. 109 prope *S. Julien*.

659. PLANTAGO foliis subhirsutis, ellipticis, spica cylindrica densa. *Plantago media* CAMER. *epit.* p. 262. in pratis.

660. PLANTAGO foliis petiolatis, ovatis, glabris, spica cylindrica. *Plantago major* CAMERAR. *epit.* p. 261. ad vias.

661. PLANTAGO caulibus erectis, herbaceis, foliis linearibus, patulis, capitulis ovatis, hirsutis. *Psyllium, herba pulicaris I.* TABERN. p. 145. & *II.* EJUSD. Genevæ ad vias.

662.

662. PLANTAGO caule lignoſo, proſtrato, foliis linearibus erectis, capitulis ſubhiſutis. *Pſyllium majus ſupinum* I. B. III. p. 513. Genevæ.

663. CONVOLVULUS foliis ſagittatis, hamis emarginatis anguloſis, petiolis unifloris, ſtipulis cordatis maximis. *Smilax levis major* DODON. *purg.* p. 210. ad ſepes.

664. CONVOLVULUS foliis ſagittatis, lateſcentibus, petiolis unifloris, ſtipulis remotis, ſubulatis. *Smilax levis minor* EJ. *purg.* p. 213. in agris.

665. POLEMONIUM foliis pinnatis, floribus erectis, elliptico lanceolatis. *Valeriana græca* DODON. p. 252. paſſim in ſylvis, rarum tamen.

666. AZALEA caule procumbente, foliis ovatis, margine introverſo. *Anonymus foliis Thymi* CLUS. *pann.* p. 57. 58. 521. in alpibus, inprimis Aquilejenſibus.

667. AQUIFOLIUM MATTH. p. 161. ad ſepes & in ſylvis.

VII. CORONATÆ.

668. OPULUS. *Sambucus aquatica* CAMERAR. *epit.* p. 977. in ſepibus & ad vias.

669. VIBURNUM foliis ovato ſerratis, ſubtus tomentoſis. *Viburnum* CAMER. *epit.* p. 975. ad ſepes.

670. SAMBUCUS arborea floribus umbellatis. *Sambucus* CAMER. *epit.* p. 975. ad ſepes.

671. SAMBUCUS herbacea, floribus umbellatis. *Ebulus* CAMER. *epit.* p. 979. ad vias & in foſſis ſubhumidis.

672. SAMBUCUS arborea, floribus ſpicatis. *Sambucus montana* CAMER. *epit.* p. 976. in ſylvis.

673. CAPRIFOLIUM capitulis ovatis, imbricatis, terminalibus, foliis omnibus diſtinctis LINN. *Periclymenum* FUCHS p. 646. in ſylvis & ad ſepes, non ubique.

674. CAPRIFOLIUM foliis ovatis, bacca ſingulari, ovata, biflora. *Periclymenum rectum fructu cæruleo* CLUS. *pann.* p. 85. I. B. II. p. 108.

Convolvulus, Polemonium, Azalea, Aquifolium —
— Opulus, Viburnum, Sambucus, Caprifolium, Rapunculus,

675. CAPRIFOLIUM foliis ovato lanceolatis, ſubhirſutis, bacca ſingulari, bicolli, biflora. *Periclymenum rectum III.* CLUS. *hiſp.* p. 94. in montanis & ſubalpinis frequens.

676. CAPRIFOLIUM foliis ovato lanceolatis, glabris, baccis gemellis, calyce quinquefido. *Periclymenum rectum II.* CLUS. *hiſp.* p. 92. 93. in montoſis & ſubalpinis.

677. CAPRIFOLIUM foliis ovatis, acuminatis, ſubhirſutis, baccis gemellis. *Xyloſteon* RIVIN. *monop. irreg.* t. 120. ad ſepes.

678. RAPUNCULUS foliis linearibus ſubaſperis, ſpica planiuſcula, petalis liberis. *Scabioſa* DODON. p. 122. in viis apricis.

679. RAPUNCULUS foliis linearibus, bracteis ovato lanceolatis. *Rapunculus ſylveſtris umbellatus* CAMERAR. ad THAL. ic. VIII. a. d. alpinus.

680. RAPUNCULUS foliis ovatis, obtuſe dentatis, bracteis maximis, obtuſis. *Rapunculus alpinus parvus comoſus* I. B. II. p. 811. in M. *Pündtnerberg* forte non ſatis diverſus a 681.

681. RAPUNCULUS foliis imis cordatis, oblongis, caulinis ſeſſilibus acutis, bracteis ovato lanceolatis. *Rapuntium montanum rarius corniculatum* COLUMN. p. 223. 224. ſubalpina & montana.

682. RAPUNCULUS foliis imis longe petiolatis, caulinis linearibus, integris, bracteis linearibus, duabus imis longiſſimis †. *Rapunculus alpinus cæruleus, anguſto, raro, ſubinde dentato folio* FERDINANDI BASSI *Comment. Bonon.* T. IV. p. 289 t. 1. f. 2. in M. *Cenero & Speluga.*

683. RAPUNCULUS foliis radicalibus cordiformibus, acute inciſis, tubis longiſſimis hirſutis, emarginatis †. *Rapunculus ſpicatus flore purpuro violaceo* SCHEUCHZER. *It. VII.* p. 518. in pratis ſubalpinis, non tamen ubique.

684. RAPUNCULUS foliis radicalibus cordatis, tubis bicornibus revolutis. *Rapunculus corniculatus ſpica longiore* RIVIN. *monop. irreg.* t. 109.
   β. flore cæruleo DODON. p. 166. Prior ubique in ſylvis, alter in ſubalpinis circa *les Plans.*

685.

685. CAMPANULA caule simplici, aspero, foliis amplexicaulibus, floribus capitatis. *Raounculus sylvestris cæruleus umbellatus* THAL. ic. VIII. n. 2. in pratis.

686. CAMPANULA caule simplici, aspero, foliis lingulatis, asperis, floribus capitatis. *Rapunculus sylvestris cæruleus umbellatus minor* THAL. ic. VIII. n. 1. SCHEUCHHZERUS loco non definito.

687. CAMPANULA caule simplici, aspero, foliis linearibus, floribus laxe & longissime spicatis. *Trachelium altissimum foliis asperis, floribus parvis* I. B. II. p. 801. in Valesia inferiori.

688. CAMPANULA foliis lingulatis asperis, floribus hirsutis, densissime spicatis. *Trachelium thyrsoides* CLUS. *pannon.* p. 688. alpina, etiam montana.

689. CAMPANULA caule erecto ramosissimo, foliis ovato lanceolatis, subtus tomentosis, petiolis multifloris erectis. *Campanula s. Cervicaria Bononiensis, flore parvo* I. B. II. p. 806. in Valesia inferiori.

690. CAMPANULA foliis cordato lanceolatis, acute serratis, hirsutis, petiolis ex alis paucifloris, calycibus hispidis. *Rapum sylvestre alterum, Cervicaria major* DODON. *coron.* p. 31. 32. ad sepes orasque sylvarum.

691. CAMPANULA foliis ovato lanceolatis, serratis, petiolis unifloris, calycibus glabris. *Trachelium anglicum candidum majus* I. B. II. p. 807. in sylvis Juræ.

692. CAMPANULA foliis cordato lanceolatis, subhirsutis, petiolis unifloris. *Campanula repens flore minori cæruleo* I. B. p. 816. in sepibus.

693. CAMPANULA caule simplici, levi, foliis glabris, ovato lanceolatis, serratis, petiolis paucifloris. *Campanula alpina glabra flore dilutissime cæruleo* I. B. II. p. 806. in subalpinis & submontanis.

694. CAMPANULA caule simplici, foliis ligulatis, asperis, petiolis unifloris, floribus hirsutis. *Campanula barbata* JACQUIN. *obss.* 11. t. 37.

695. CAMPANULA foliis ellipticis hirsutis, petiolis

alaribus

Campanula, Pimpinella, Samolus –

alaribus unifloris, floribus glabris. *Campanula caule ſimplici, pedunculis unifloris, axillaribus diphyllis* JACQUIN. *obſſ.* 12. alpina.

696. CAMPANULA uniflora, foliis radicalibus ovatis, integerrimis ALLIONE *ſpec.* t. 5. f. 1. alpes occidentales editiores *Bernenſes & Valeſiacæ.*

697. CAMPANULA foliis radicalibus ovatis, caulinis linearibus, petiolis longiſſimis paucifloris. *Rapunculus nemoroſus II.* TABERN. p. 411. ad oras viarum.

698. CAMPANULA caule brachiato, foliis lanceolato linearibus glabris, petiolis paucifloris, nudis. *Campanula eſculentæ facie, ramis & floribus patulis* DILLEN. *hort. Elth.* t. 58. in alpinis.

699. CAMPANULA foliis ellipticis ſerratis, ſubhirſutis, caule aſpero, floribus paniculatis. *Erinus Nicandri* COLUMN. p. 225. vulgo ad ſepes.

700. CAMPANULA caule ſimplici, foliis ſubhirſutis, linearibus, petiolis unifloris. † *Campanula linifolia, rara, cærulea* I. B. II. p. 797. ſubalpina & ſubmontana.

701. CAMPANULA foliis ſerratis, radicalibus cordatis, caulinis lanceolatis. † *Rapunculus ſylveſtris minor* TABERNÆM. p. 409. in muris adque vias.

702. CAMPANULA foliis ſerratis, radicalibus cordatis, caulinis linearibus. *Campanula alpina rotundifolia minor* C. B. *prodr.* p. 34. in rupibus alpinis & montanis.

703. CAMPANULA caule procumbente, fructibus priſmaticis, floribus ſolitariis, rotatis, longiſſime petiolatis. *Campanula arvenſis minima* DODON. *coron.* p. 38. in ſegetibus Bernæ frequens.

704. CAMPANULA caule erecto, fructibus priſmaticis, floribus rotatis, ſeſſilibus, congeſtis. *Pentagonium, viola pentagonia* TABERN. p. 316. ſimilibus locis.

705. PIMPINELLA tetraſtemon, ſpica brevi. *Sanguiſorba major* FUCHS p. 785. in pratis udis.

706. PIMPINELLA polyſtemon. *Sanguiſorba minor,* TABERN. p. 1034. in adclivibus & ſiccis.

707. SAMOLUS. *Anagallis aquatica tertia* LOBEL. ad foſſas prope *Roche.*

VIII. STEL.

VIII. STELLATÆ.

708. RUBIA foliis ſenis ellipticis, aſperis. *Wildmadder* PETIVER. *plant. Brit.* t. 30. in Valeſia, prope *Yvorne*, circa *Orbe*, *Antagne* &c.

709. GALIUM foliis quaternis, hirſutis, petiolis octifloris. *Cruciata* DODON. p. 107. ad vias & in ſepibus.

710. GALIUM foliis octonis, linearibus, peranguſtis, racemis multifloris ſpicatis. *Gallium* DODON. *purg.* p. 103. ad vias ſiccas.

711. GALIUM foliis octonis, ellipticis, caule anguloſo. *Mollugo vulgaris herbariorum* LOBEL. p. 802. ad vias & in pratis.

712. GALIUM foliis octonis, ellipticis, caule terete. *Mollugo* DODON. *purg.* p. 161. in ſylvis.

713. GALIUM caule ſubaſpero, foliis ſenis, elliptico lanceolatis, ariſtatis †. *Gallium alpinum floribus albis, veluti in umbellam diſpoſitis* SCHEUCHZER. *herb. ſicc.* alpina.

714. GALIUM caule erecto, foliis octonis, ſubtus canaliculatis, petiolis multifloris umbellatis. *Gallium montanum altiſſimum, foliis anguſtis, albicantibus* RUPP. p. 5. circa Baſileam, Genevam.

715. GALIUM caule anguloſo, foliis ſenis, ſubaſperis, ariſtatis. † *Rubeola ſaxatilis alpina* BOCCONE t. 101. ad vias, etiam in alpinis.

716. GALIUM foliis octonis, ſupremis lanceolatis, floribus in ſumma planta faſciculatis. *Gallium ſaxatile glauco folio* BOCCONE t. 116. circa Genevam.

717. GALIUM caule procumbente, ramoſiſſimo, foliis quinis, ſubrotundis, ariſtatis, petiolis ramoſis †. *Gallium album ſupinum multicaule* DILLEN. Baſileæ, in M. *Murtſchen*, &c.

718. GALIUM foliis ſenis, ellipticis, petiolis breviſſimis unifloris †. *Gallium ſaxatile ſupinum molliore folio* IUSSIEU *mem. de l'Acad.* 1714. t. 15. alpina.

719. GALIUM caule radicato, diffuſo, foliis quaternis ovatis, obtuſis. *Gallium paluſtre album* C.B. in foſſis abunde.

~~Rubia, Galium, Asperula~~

720. GALIUM foliis quaternis, glabris, ovato lancaolatis racemis breviſſimis, reflexis æqualibus.
GALIUM floribus polygamis, racemis lateralibus binatis, nudis, foliis quaternis lanceolatis glabris SCOPOLI p. 344. (*). in transalpinis.

721. GALIUM caule erecto, ramoſiſſimo, foliis linearibus, peranguſtis, petiolis confertis, ramoſis. *Gallium nigro purpureum, montanum tenuifolium* COLUMN. *ecphraſ. I.* p. 398. Transalpina.

722. GALIUM caule erecto, foliis quaternis, lanceolatis, glabris, trinerviis, ſeminibus hiſpidis LINN. p. 156. *Rubia pratenſis levis acuto folio* C. B. *prodr.* p. 145. in pratis udis.

723. GALIUM caule terete, foliis ſenis, linearibus, ſerratis, petiolis unifloris, ſeminibus hiſpidis. *Aparine. purg.* DODON p. 98- 99. ad ſepes.

724. GALIUM foliis ſerratis, petiolis divaricatis, ſeminibus rugoſis. *Aparine vulgaris ſemine minori* VAILLANT. t. 4. f. 3. in agris paſſim, in montanis & circa *Roche.*

725. GALIUM foliis ſerratis, petiolis trifloris, recurvis *Aparine ſemine levi* VAILLANT. t. 4. f. 3. circa *Roche*, *Montcharans.*

726. GALIUM panicula ramoſiſſima, foliis aſperis, ſerratis, ſeminibus hirſutis. *Aparine minor paluſtris Pariſienſis* VAILLANT. circa *S. Roc.*

727. GALIUM foliis quaternis, petiolis longiſſimis, brachiatis, ſeminibus hirſutis. *Rubia quadrifolia ſemine duplici hiſpido* I. B. III. p. 718. in ſylvis abiegnis.

728. ASPERULA caule erecto. foliis octonis, petiolis ramoſis erectis, ſeminibus hirſutis. *Hepatica ſtellata* TABERN. p. 816. in ſylvis.

729.

(*) Flores, quibus carebam, habet ſpecimen a Cl. SCOPOLI miſſum. Petioli florigeri binati, foliis multo breviores, decemflori. Flores flavi mares, & fertiles. Semen glabrum, quo maturefcente petiolus deorſum reflectitur.
Ejice in Hiſtoria ſtirpium ſynonymum LINNÆI & corrige floris colorem.

729. ASPERULA caule flaccido, foliis linearibus quaternis, umbellulis petiolatis. *Gallium album* TABERNÆMONT. p. 151. in ſylvis circa *Moncharans.*

730. ASPERULA caule firmo, ramoſo, foliis linearibus quaternis, ſupremis conjugatis. *Gallium album minus* TABERN. p. 151. ad ſepes.

731. ASPERULA foliis quaternis, lanceolato linearibus, caule erecto, floribus, ſæpe trifidis LINN. p. 151. *Rubia cynanchica ſaxatilis* C. B. *prodr.* p. 146. non ſatis certa ſpecies Baſileæ.

732. ASPERULA foliis ovato lanceolatis, quaternis, petiolis unifloris erectis, bracteis ciliatis *Rubia levis Taurinenſium* LOBEL. ic. p. 800. ſubalpinæ ſylvæ.

733. ASPERULA foliis octonis, obtuſis, floribus ſeſſilibus congeſtis, bracteis ciliatis. *Aſperula cærulea* DODON. *pempt.* p. 355. in agris planitiei.

734. SHERARDIA foliis ſenis, lanceolatis, floribus ſeſſilibus umbellatis. *Rubeola arvenſis repens cærulea* C. B. *prodr.* p. 145. in agris.

IX. UMBELLIFERÆ.

735. ERYNGIUM foliis ſemipinnatis, pinnis pinnatis, pinnulis lobatis ſpinoſis. *Eryngium* CAMER. *epit.* p. 447. ad lacum Lemanum. Baſileæ.

736. ERYNGIUM foliis radicalibus petiolatis, cordatis, involucro pinnato, ciliato. *Eryngium alpinum cæruleum capitulo Dipſaci* MANGET. *dict. pharm. I.* p. 866. in alpibus potiſſimum aquilejenſibus, *aux Nombrieux.*

737. SANICULA foliis radicalibus trilobatis, lateralibus lobis tripartitis, umbellis globoſis. *Sanicula* RIVIN. *monop. irreg.* t. 30. in nemoribus.

737* SANICULA involucris maximis quinquefoliis, ſeminibus tuberculoſis. *Elleborine alpina Saniculæ & Ellebori nigri facie* LOBEL. *adverſ.* p. 298. icon p. 664. *Helleborine* TABERNÆMONT. p. 84. *Aſtrantia floribus maſculis pedunculatis, femininis ſeſſilibus, ſeminum angulis obtuſis glabris*

 SCOPOLI

Sherardia – Eryngium, Sanicula, Caucalis, Daucus

SCOPOLI p. 337. in valle *Auguſta*, haud longe a monte *Pennino* (*).

738. CAUCALIS foliis aſperis, pinnatis, pinnis ſerratis, involucris ovato lanceolatis. *Echinophora major platyphyllos* COLUNN. *ecphraſ.* p. 97. 98. in agris Valeſiæ inferioris.

739. CAUCALIS foliis triplicato pinnatis, involucris ligulatis, univerſali unifolio. *Echinophora* RIVIN. t. 24. in agris planitiei.

740. CAUCALIS umbellis planis, petalis extremis & involucris maximis. *Echinophora flore magno*, RIVIN. t. 25. in agris planitiei.

741. CAUCALIS foliis duplicato pinnatis, nervo multoties latioribus. *Caucalis* RIVIN. t. 31. ad ſepes, in ſylvis cæduis.

742. CAUCALIS foliis duplicato pinnatis, pinnulis longe confluentibus. † *Caucalis procumbens* RIVIN t. 33. in agris planitiei.

743. CAUCALIS vaginis lanuginoſis, foliis triplicato pinnatis, ſeminibus roſtratis. *Caucalis folio Chærophylli* RIVIN. t. 34. ad ſepes & muros in calidioribus.

744. DAUCUS (**) involucris cavis, communibus pinnatis,

(*) Plantæ rariſſimæ ſpecimen miſit Cel. SCOPOLI. Folia radicalia longe petiolata, glabra, nitida, ſerrata, denticulis ciliatis. Medius lobus minor, obiter tripartitus: laterales majores, bipartiti; lobuli interiores trifidi, exteriores bifidi, non profunde. Caules aphylli, pedales. Umbellæ involucrum maximum, profundiſſime quinquefidum, ſexfidum; ſegmentis ovatis, circumſerratis, dentibus ciliatis. Capitulum ſeſſile, decuplo unico involucri folio minus: flores luteoli, tubæ prælongæ. Addo ex SCOPOLIO, flores maſculos pedunculatos eſſe, feminas ſeſſiles, petala citius amittere. Fructum ſubrotundum eſſe, ſeminibus pentagonis tuberculoſis, angulis obtuſis.

(**) Hi duo numeri in Hiſtoria ſunt 746. & 745.

natis, peculiaribus lineari lanceolatis. *Staphylinus* RIVIN. t. 27. in pratis udis & ad vias.

745. vide n. 751*. (*)

746. LIBANOTIS foliis hirſutis, triplicato pinnatis, lobulis profundiſſime bipartitis. *Daucus Creticus* CAMER. *epit.* p. 536.

747. CEREFOLIUM foliis glabris, triplicato pinnatis, lobulis obtuſis. *Cerefolium* RIVIN. t. 42. in maceriebus.

748. CEREFOLIUM foliis triplicato pinnatis, acute dentatis, glabris, nervis hirſutis. *Cerefolium ſylveſtre* RIVIN. t. 43. in pomariis.

749. CEREFOLIUM foliis hirſutis, petalis cordatis, ſeminibus obſcure ſtriatis ad RUPP. t. 5. Circa Bernam & in montoſis pratis.

750. MYRRHIS foliis hirſutis, laciniis obtuſis, caule geniculato. *Myrrhis* RIVIN. t. 40. ad ſepes planitiei.

751. MYRRHIS radice prælonga, foliis triplicato pinnatis, acutis, ſeminibus cylindricis. *Myrrhis paluſtris* RIVIN. t. 50. ad rivos.

752. MYRRHIS radice bulboſa, caule inferne hirto, ſuperne levi, foliis triplicato pinnatis, acute inciſis. *Myrrhis fœtens* RIVIN. t. 49. ad ſepes *Mülhuſiæ*, *Baſileæ*, *&c.*

753. MYRRHIS foliis triplicato pinnatis, mollibus, ſeminibus ſulcatis, maximis. *Odorata* RIVIN. t. 56. in ſubalpinis & alpinis.

754. MYRRHIS ſeminis cornu longiſſimo. *Scandix* RIVIN. t. 37. in ſegetibus planitiei.

755. OENANTHE foliis radicalibus rotunde lobatis, planis, caulinis fiſtuloſis. *Oenanthe* RIVIN. t. 65. in foſſis aquoſis.

756. OENANTHE foliis planis, imis ſubrotunde lobatis, caulinis trilobatis, linearibus. circa *Roche.*

757. PHELLANDRIUM foliis refractis. *Phellandrium* RIVIN. t. 64.

757* LIGUSTICUM foliis triplicato pinnatis, pinnulis primis

(*) Melius ad Liguſticum refertur ob calycem proprium, & ſeminis figuram.

Libanotis, Cerefolium, Myrrhis, Oenanthe, Phellandrium, Ligusticum, Podagraria, foeniculum, Meum, Seseli, Coriandrum, Aethusa, Cicuta

primis decussatis, seminibus hirsutis. *Apium petræum l. montanum album* I. B. III. p. 105. *Libanotis* RIVIN. t. 96. ad rupes alpinas & montanas.

758. LIGUSTICUM foliis duplicato pinnatis, pinnulis acute dentatis, longe lanceolatis. *Seseli Peloponnense* CAMER. *epit.* p. 514. ad rupes circa *Formazz.*

759. PODAGRARIA RIVIN. t. 46. ad sepes.

760. FOENICULUM RIVIN. t. 60. in vineis & ad vias.

761. MEUM RIVIN. t. 62. in nonnullis Juræ pascuis.

762. SESELI foliis linearibus, triplicato pinnatis, caule vaginoso. *Pimpinella tenuifolia* RIVIN. in aquilejensi Dominio.

763. SESELI foliis duplicato pinnatis, pinnulis semipinnatis, lobulis lanceolatis. *Muttellina* CAMER. *epit* p. 8. in pascuis alpinis, etiam montanis.

764. CORIANDRUM fructibus globosis LINN. *Coriandrum* CAMER. *epit.* p. 523. circa *Tramlingen.*

765. ÆTHUSA LINN. *Cynapium* RIVIN. t. 75. in sepibus.

766. CICUTA RIVIN. t. 74. ad vias & in cœmeteriis.

767. BUPLEURUM caule brachiato, ramosissimo, foliis ovato lanceolatis, amplexicaulibus. *Perfoliata* RIVIN. t. 45. in segetibus planitiei.

768. BUPLEURUM foliis imis petiolatis, ovatis, superioribus amplexicaulibus, ovato lanceolatis. *Perfoliata montana* CAMER. *hort.* ic. 38. in M. *Legerberg*, *Creux du vent* &c.

769. BUPLEURUM foliis amplexicaulibus, ovato lanceolatis, aristatis. † *Perfoliata alpina latifolia minor* C. B. *prodr.* p. 129. in alpibus.

770. BUPLEURUM foliis radicalibus gramineis, caulinis ovato lanceolatis, amplexicaulibus, calycibus umbellarum quinquefoliis. *Pianta alpina di Corsica* BOCCONE *muf. di piant.* t. 107. alpina.

771. BUPLEURUM foliis gramineis, involucro peculiari octies emarginato †. *Agrostana* HILL. V. t. 119. alpina.

772. BUPLEURUM caule brachiato, involucris utrisque pentaphyllis, aristatis, petiolos excedentibus. *Perfoliatum angustifolium montanum* COLUMN. p. 247.

p. 247. non certa civis, dicitur in Valesia provenire.

773. BUPLEURUM . . . *Sedum petræum Bupleuri folio* PONA *Bald. Ital.* p. 246. J. GESNER in alpibus Abbatiscellanorum.

β. *Bupleurum alpinum angustifolium minus* I. R. H. *Perfoliata alp. angustifolia minor* C. B. *prodr.* p. 129. alpina, utraque non satis nota.

774. BUPLEURUM caule ramosissimo, umbellis alaribus, paucifloris, involucris pentaphyllis lanceolatis, petiolo longioribus. *Bupleurum tertium minimum* COLUMN. p. 85. 247. circa Basileam nuper non repertum.

775. BUPLEURUM caule ramosissimo, umbellis petiolatis, involucris pentaphyllis, petiolo brevioribus. *Bupleurum angustifolium* C. B. circa *Sedunum* nasci dicitur, nuper non visum.

776. BUPLEURUM foliis radicalibus petiolatis, elliptico lanceolatis, caulinis falcatis, caule flexuoso, *Bupleurum* RIVIN. t. 24. passim ad vias & in collibus.

777. SIUM foliis pinnatis, argute dentatis, umbellis erectis. *Sium* RIVIN. t. 77. in fossis aquosis planitiei.

778. SIUM foliis radicalibus ovatis, pinnulis dentatis, caulinis appendiculatis, umbellis alaribus. *Sium minus* RIVIN. t. 18. in fossis ubique.

779. SIUM foliis pinnatis, umbellis cernuis LINN. *Sium terrestre umbellis rarioribus* MORISON. III. p. 283. T. IX. t. 5. f. 7. in pratis vallis *Erguel*, ex non bono specimine.

780. SIUM foliis radicalibus capillaribus multifidis, caulinis pinnatis, ultima pinna trilobata. *Sium minimum, foliis imis ferulaceis* MORISON. l. c. t. 9. f. 5. ultra *Noville* in fossa semel lectum.

781. SIUM foliis duplicato pinnatis, pinnulis acute serratis, trifidis & simplicibus. *Cicuta aquatica* WEPFER in libello proprio. In aquosis planitiei, circa *Noville*, *Fridlingen* &c.

782. SIUM foliis firmis, serratis, pinnatis, nervo folioso latescente. *Eryngium quartum* DODON. p. 732. Basileæ ad vias.

Bupleurum, Sium, Bulbocastanum, Apium
Tragoselinum, Carum, Astrantia, Laserpitium

783. BULBOCASTANUM I. B. III. p. 30. in segetibus montanis & subalpinis.

784. APIUM foliis pinnatis, pinnis trilobatis. *Apium palustre* CAMER. *epit.* p. 527. ad fossas.

785. TRAGOSELINUM foliis pinnatis, pinnis lanceolatis serratis, extremis trilobatis. *Pimpinella* RIVIN. t. 79. vulgo ad vias inque sylvis.

786. TRAGOSELINUM foliis pinnatis, pinnis ovatis. *Pimpinella saxifraga minor* CAMER. *epit.* p. 775. passim ad vias, inque vallis.

787. TRAGOSELINUM foliis duplicato pinnatis, pinnulis profundissime lobatis. *Pimpinella media* RIVIN. t. 81. in aridis.

788. TRAGOSELINUM caule crasso, fulcato, divaricato, foliis multifidis capillaribus. *Seseli Massiliense fœniculi folio, quod Dioscoridis censrtur* C. B. *Bas.* p. 49. in calidioribus ad vias, in aquilejensibus &c.

789. CARUM RIVIN. t. 54. in pratis.

790. ASTRANTIA foliis quinquelobis, trifidis LINN. *Astrantia* RIVIN. t. 69. in montanis & subalpinis.

791. ASTRANTIA foliis septenis, digitatis, serratis LINN. *Helleborus minimus alpinus Astrantiæ folio* BOCCONE *plant. sicul.* t. 5. f. 3. alpes, etiam valles alpinæ.

792. LASERPITIUM foliis cordatis, inciso serratis LINN. *Laserpitium* RIVIN. t. 21. in pratis subalpinis & montosis lapidosis.

793. LASERPITIUM foliis imis rotunde lobatis, vaginalibus linearibus, trifidis. *Ligusticum Rauwolfii Aquilegiæ folio* I. B. III. p. 148. in M. *Generoso.*

794. LASERPITIUM foliis duplicato pinnatis, pinnulis integerrimis lanceolatis, simplicibus & ternatis. *Siler montanum* DODON. *purg.* p. 484. in montanis & alpinis ad Rupes &c.

795. LASERPITIUM foliis triplicato pinnatis, lobulis lanceolatis t. 19 † *Panax asclepium semine folioso* C. B. in alpinis editis.

796. LASERPITIUM foliis triplicato pinnatis, pinnulis lanceolatis, involucris semitrifidis †. in alpibus aquilejensibus & vicinis Valesiacis.

797.

797. PEUCEDANUM foliis triplicato pinnatis, pinnulis nervo distinctis, lanceolatis, imparibus trilobatis. *Seseli pratense* RIVIN. t. 57. in pratis udis.

798 SELINUM foliis quadruplicato pinnatis, nervis canaliculatis. *Daucus alsaticus* C. B. *prodr.* p. 77. circa *Mülhusiam*.

799. SELINUM sublactescens leve, foliis quadruplicato pinnatis, linearibus. *Thysselinum angustifolium* RIVIN. t. 13. in palustribus frequens ad lacus & fluvios.

800. SELINUM lactescens, caule aspero, foliis triplicato pinnatis. *Thysselinum* RIVIN. ad lacum *Vervai* &c.

801. Est LIGUSTICUM 757*.

802. SELINUM foliis triplicato pinnatis, pinnulis latiusculis, simplicibus & trifidis t. 20. *Carvifolia* VAILLANT. t. 5. f. 2. passim circa *Bernam*, *Ebrodunum*, *Michelfeldam* in udis.

803. SELINUM foliis triplicato pinnatis, refractis. *Oreoselinum* RIVIN. t. 8. in subalpinis & montanis.

804. SELINUM foliis duplicato pinnatis, pinnis semibilobatis, circumserratis. *Cervaria* RIVIN. t. 12. in montanis & subalpinis.

805. IMPERATORIA RIVIN. t. 7. alpina.

806. ANGELICA foliis duplicato pinnatis, ovatis, serratis. *Angelica palustris* RIVIN. t. 17. in sylvis & aquosis.

807. ANGELICA foliis duplicato pinnatis, ovato lanceolatis serratis. *Angelica* RIVIN. t. 17. inter *Pocco d'Adda* & *Morbegno*.

808. PASTINACA foliis pinnatis. *Pastinaca* RIVIN. t. 6. ad vias, in ruderosis.

809. SPHONDYLIUM foliis hirsutis, pinnatis, pinnis quinquefidis. *Sphondylium* RIVIN. t. 4. in pratis.

810. SPHONDYLIUM foliis subrotundis, glabris, obtuse semitrilobatis. *Sphondylium alpinum glabrum* C. B. *prodr.* p. 83. Hinc inde in Juræ adclivibus.

811. TORDYLIUM foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, seminis limbo levi. *Caucalis major semine minus*

 nus

Peucedanum, Selinum, Imperatoria, Angelica, Pastinaca, Sphondylium, Tordylium, Hydrocotyle — Circæa, Cornus, Ribes

nus pulchro hirſuto I. B. III. p. 85. nuper non repertum.

812. HYDROCOTYLE foliis rotundis, emarginatis, petiolis centralibus, umbellis faſtigiatis. *Cotyledon paluſtris* DODON. *pempt.* p. 133. circa lacus Helvetiæ in pratis humidis.

X. CORONATÆ.

FLORE POLYPETALO.

813. CIRCÆA foliis ſubcordatis, ſubſerratis. *Herba D. Stephani* TABERN. p. 730. ad ſepes & in umbroſis.

814. CIRCÆA foliis cordatis, acute dentatis. *Circæa minima* COLUMN. *ecphraſ. II.* p. 80. in montanis & ſubalpinis ſylvis.

815. CORNUS arborea umbellis involucrum æquantibus LINN. p. 171. *Cornus mas* BLAKWELL. t. 121. ad rupes aquilejenſes.

816. CORNUS arborea umbellis nudis. *Cornus femina* LOBEL, II. p. 169. ad ſepes.

817. RIBES inerme, floribus planis, ſtipulis florum longitudine. *Ribes alpinum dulce* I. B. II. p. 98. in ſubalpinis & montanis.

818. RIBES inerme foliis planiuſculis, ſtipulis minimis. *Ribes flore rubente* I. B. II. p. 98. in ſylvis ſupra *Roche*.

819. RIBES inerme, olidum, calyce oblongo, petalis ovatis. *Ribes nigra* TABERN. p. 1083. in aquoſis planitiei.

820. RIBES ramis aculeatis, foliis rotunde lobatis. *Groſſularia* BLAKWELL. t. 277. ad ſepes.

XI. POLYPETALÆ PERICARPIÆ.

821. RHAMNUS inermis, foliis ovato lanceolatis, integris, floribus quinquefidis androgynis. *Frangula* CAMERAR. *epit.* p. 978. in udis.

822. RHAMNUS ſpinoſus, foliis ovato lanceolatis, ſerratis, glabris, floribus androgynis, baccis tetra-

trapyrenis. *Spina infectoria altera* CLUS. *pann.* p. 106. 107. inter *Chur* & *Ems.*

823. RHAMNUS inermis, foliis ovatis crenulatis t. 40. *Comm. Gott. II.* t. 16. *Frangula altera polycarpos* C. B. *prodr.* p. 160. in montanis & subalpinis.

824. RHAMNUS foliis spinosis, ovato lanceolatis, serratis. *Spina infectoria* CAMER. *Epit.* p. 82. ad sepes inque aquosis.

catharticus

825. VITIS foliis semitrilobatis, hirsutis, dentatis. *Vitis vinifera sylvestris s. Labrusca* I. B. II. p. 96. ad sepes planitiei.

826. HEDERA foliis sterilibus tribolatis, fructiferis ovato lanceolatis. *Hedera* MATTHIOL. p. 626. TRAG. p. 802. ad rupes et arbores.

827. RHUS racemis plumosis, foliis ovatis *Coccygria* CLUS. *pann.* p. 98. in saxosis ad Rhodanum supra *Leuk.*

828. BERBERIS floribus racemosis, foliis ciliatis. *Oxyacantha Galeni* TABERN. p. 1035. ad sepes & in dumetis.

829. EUONYMUS foliis ovato lanceolatis, serratis, ramis tetragonis. *Evonymus* CAMER. *Epit.* p. 102.

830. EUONYMUS pedunculis lateralibus patulis, foliis subrotundis, fructibus alatis SCOPOLI p. 315. *Euonymus latifolius* CLUS. *pann.* p. 94. 95. *Chiavennæ.*

831. STAPHYLEEA foliis pinnatis LINN. *Staphylodendron* CAMER. *Epit.* p. 171. Rarius ad sepes planitiei.

832. PARNASSIA. *Hepatica alba* CORD. p. 153. in aquosis

833. RORELLA foliis ellipticis, caule nudo paucifloro. *Salsirora s. sponsa solis* THAL. ic. IX. n. 2. in udis palustribus torfaceis.

834. RORELLA foliis petiolatis subrotundis, caule nudo paucifloro. *Salsirora s. ros solis* THAL. l. c. n. 1. similibus locis.

835. STATICE scapo simplici capitato, foliis linearibus LINN. *Gramen polyanthemon majus* DODON. *prompt.* p. 564. in alpibus Griseis, inque valle *Praetoria.*

Linnus, Vitis, Hedera, Rhus, Berberis, Euonymus, Staphylea, Parnassia, Rorella, Statice, Linum, Telephium, Corr. Potamogeton

836. LINUM ſylveſtre MATTH. p. 416. Paſſim ad vias.
837. LINUM foliis linearibus lanceolatis, ariſtatis, calycibus ovato lanceolatis, ſemimembranaceis. *Linum montanum foliis tenuibus erectis, flore amplo* ZANON. p. 177. 147. in montanis & alpinis.
838. LINUM foliis linearibus, calycibus longe ariſtatis. *Linum ſylveſtre anguſtifolium, flore albo IIII.* CLUS. *pann* p. 303. 304. ad vias calidiores.
339. LINUM foliis conjugatis, ovatis, calycibus ariſtatis, patulis, lanceolatis. *Linum catharticum* BLAKWELL t. 368. ad vias inque pratis.
340. LINUM tetrapetalon, caule ramoſiſſimo dichotomo BLAIR. p. 180. *Chamælinum vulgare* VAILLANT. t. 4. f. 6. Mulhauſiæ in ſabuloſis.
841. TELEPHIUM foliis alternis LINN. *Telephium legitimum Imperati* CLUS. V. LXVII. in Valeſia inferiori ad vias.
842. CORRIGIOLA LINN. Icon OEDERI t. 354. *Baſileæ, Mulhuſiæ, Vivisci* ad torrentium ripas.
843 POTAMOGETON foliis firmis, petiolatis, ovatis, natantibus LINN. *Potamogeton* FUCHS p. 651. In ſtagnis & fluviis tranquillis.
844. POTAMOGETON rotundifolium alterum LOESEL. p. 206. ic. 65. Bernæ HAGENBACHIUS, nuper ignotum.
845. POTAMOGETON foliis tenuibus, cordatis, amplexicaulibus, LINN. p. 182. *Potamogeton tertia* DODON. p. 582. in ſtagnis & lacubus.
846. POTAMOGETON foliis tenuibus, ellipticis, nervis convergentibus. *Potamogeton altera* DODON. l. c. in lacubus & foſſis latioribus.
847. POTAMOGETON foliis tenuibus, longiſſime lanceolatis. *Fontinalis major lucens.* I. B. III. p. 777. in lacubus, fluviis & foſſis.
848. POTAMOGETON foliis lanceolatis, alternis, umbellatis, ſerratis LINN. *Tribulus aquaticus minor* CLUS. *pann.* p. 715. in rivulis.
849. POTAMOGETON caule dichotomo, foliis conjugatis, ellipticis, conplicatis, imbricatis. *Tribulus aquaticus minor* CLUS. *pann.* p. 714. iisdem locis.

850.

850. POTAMOGETON foliis gramineis, petiolis erectis, vaginis laxis numerosissimis. *Potamogeton gramineum latifolium foliis & ramificationibus densissime stipatis* RAI. Syn. III. t. 4. f. 3.
851. POTAMOGETON caulibus compressis, foliis gramineis, lanceolatis, spicis paucifloris OEDER ic. 203. LOESEL 66. in paludosis torfaceis.
852. POTAMOGETON caulibus teretibus, foliis peranguftis, spicis paucifloris minimis ic. OEDER t. 186. LOESEL 67. in *Gürbenmoos*, *Reusa fl.*
853. POTAMOGETON caule terete, foliis linearibus planis, spica multiflora, senescente interrupta. *Potamogeton pusillum* BOCCONE *plant. sicul.* p. 42. t. 20. f. 5. Passim in fossis.

XII. CALYCIFLORÆ.

854. SALICARIA foliis lanceolatis, subhirsutis, floribus spicatis. *Lysimachia altera* CAMER. *Epit.* p. 687. ad fossas.
855. SALICARIA foliis linearibus, floribus in aliis sessilibus, ad RUPP. t. 6. *Hyssopifolia aquatica* I. B. III. p. 792. Basileæ, Mülhusiæ.
856. PEPLIS petalis senis, plerumque apetala. *Glaucoides palustre portulacæ folio, purpureo flore.* MICHEL. t. 13. Basileæ rarior.

I. I. VIII. DIPLOSTEMONES.

I. CARYOPHYLLEÆ.

857. ELATINE foliis verticillatis LINN. *Alsinastrum Gallii folio* VALLANT. p. 6. t. 1. f. 6. Mülhusiæ.
858. ELATINE foliis conjugatis. *Alsinastrum serpilli folium flore albo tetrapetalo* VAILLANT. t. 2. f. 2. & *flore roseo tripetalo* f. 1. Mülhusiæ.
859. CHERLERIA t. 21. SEGULER. *suppl.* t. 4. f. 3. Alpina.
860. ALSINE octostemon foliis linearibus connatis. *Alsine muscosa quibusdam* I. B. III. p. 365. in nudis rupibus montanis & subalpinis.

Salicaria, Lepsis — — Elatine, Cherleria, Alsine

861. ALSINE tetraſtemon, foliis lanceolatis connatis. *Alſine puſilla graminea flore tetrapetalo* SEGUIER II. t. 5. f. 3. in arcis hortorum & teſtis.

862. ALSINE foliis linearibus connatis, pediculis longiſſimis unifloris. Icon OEDERI t. 12. in ſaxoſis alpium. *Lugani.*

863. ALSINE foliis linearibus, obtuſis, calycibus viſcidis. †. Alpina.

864. ALSINE caule flaccido, dichotomo, foliis linearibus acutis. † in loco die *Clus* vallis *Gaſtern.*

865. ALSINE foliis lineari lanceolatis, hirſutis, calyce petalis æquali. Inter ſtipulas, in vallis.

866. ALSINE foliis linearibus glabris, petalis calyce brevioribus. *Alſine tenui folia* I. B. III. p. 364. in muris.

867. ALSINE foliis linearibus, petalis calyce longioribus. *Alſine ſaxatilis & multiflora capillaceo folio* VAILLANT t. 2. f. 3. in ſaxoſis montanis & ſubalpinis.

868. Alſine foliis ſulcatis, recurvis, ladicalibus linearibus, congeſtis, caulinis lanceolatis †. Alpinum editiorum.

869. ALSINE foliis linearibus, anguſtiſſimis, calycibus tubuloſis, villoſis. *Alſine alpina junceo folio.* C. B. *prodr.* p. 118. in montanis altioribus & Alpibus.

870. ALSINE foliis filiformibus, pungentibus, calycibus ariſtatis t. 17. In glareoſis aquilejenſium & Valeſiæ.

871. ALSINE foliis ſuperioribus faſciculatis, imis conjugatis. *Polygonum foliis gramineis alterum* LOBEL ic. 64. in torfaceis.

872. ALSINE foliis linearibus, ſtipulis ovato lanceolatis argenteis. *Spergula purpurea* I. B. III. p. 722. In glareoſis & agris arenoſis.

873. ALSINE foliis verticillatis, ſeminibus rotundis. *Spergula* DODON. *Cereal* p. 179. Paſſim in agris.

874. ALSINE foliis ſulcatis, argute lanceolatis, petiolis unifloris. *Alſine uniflora & grandiflora, foliis acuminatis glabris, petalis integris* ALLIONE *ſpec.* t. 10. in montibus Neocomenſium.

875.

875. ALSINE foliis ovato lanceolatis, subhirsutis, petalis calyce brevioribus. *Alsine minor* TABERN. p. 708. In muris & locis aridis.

876. ALSINE foliis ovato lanceolatis, ciliatis, petalis calyce majoribus t. 17. *Alsine serpylli folio multicaulis & multiflora* SEGUIER I. p. 421. t. 5. f. 2. Alpina.

877. ALSINE caule recto prostrato, foliis ovatis †. Alpium editiorum.

878. ALSINE foliis ovato lanceolatis trinerviis. *Alsine plantaginis folio* I. B. III. p. 763. ad pedem arborum.

879. ALSINE floribus umbellatis, petiolis serratis. *Holosteum caryophyllæum arvense* TABERN. p. 233. in aridis planitiei.

880. ALSINE foliis petiolatis, ovato lanceolatis, petalis bipartitis. *Alsine* TABERN. p. 706. ad vias, sepes & in hortis.

881. ALSINE foliis lanceolatis, petalis bipartitis. *Anagallis aquatica quarta* LOBEL p. 479. Locis udis.

882. ALSINE foliis lanceolatis, lineatis, petiolis ramosis. *Gramen floridum minus* TABERN. p. 233. in stipulis & fossis.

883. ALSINE caule nodoso, ramoso, foliis lanceolatis, lineatis, petiolis longissimis. *Alsine cariophylloides glabra, florum pediculis longissimis* SEGUIER p. 174 in transalpinis.

884. ALSINE foliis gramineis ciliatis. *Gramen alterum* CAMER. p. 743. in dumetis.

885. ALSINE foliis ovato cordatis, imis petiolatis, tubis quinis. *Alsine major* CAMER. *epit.* p. 851. in fossis.

886. MYOSOTIS foliis petiolatis, cordatis, tubis ternis. *Alsine montana hederacea maxima* COLUMNER. *ecphras.* I. p. 289. 290. in sylvis subalpinis.

887. MYOSOTIS foliis tomentosis ovatis. *Herba facie auriculæ mulitris* MARTENS. *Spitzberg* †. G. n. 8. in summis alpibus.

888. MYOSOTIS foliis ovato lanceolatis, subhirsutis, petalis calyce duplo longioribus. *Alsines myosotis*

sotis facie Lychnis alpina flore amplo niveo repens RAI. SYN. III. t. 15. f. 2. alpina etiam montana.

889. MYOSOTIS foliis linearibus lanceolatis, petalis calyce duplo longioribus. *Alsine myosotis arvensis polygoni folio* VAILLANT. p. 141. t. 30. f. 5. ad vias planitiei.

890. MYOSOTIS foliis lanceolatis glabris, petiolis refractis. †. summarum alpium.

891. MYOSOTIS foliis linearibus tomentosis. *Ocymoides Lychnites* COLUMN. post *phytobas.* p. 20. in muris calidiorum.

892. MYOSOTIS foliis linearibus glabris. *Caryophyllus holosteus alpinus gramineus* C. B. *prodr.* p. 104. Alpina.

893. MYOSOTIS foliis ovato lanceolatis, petalis calycis longitudine. *Myosotis arvensis hirsuta parvo flore albo* VAILLANT. p. 142. t. 30. f. 2. ad vias.

894. MYOSOTIS caule simplici, foliis ovatis hirsutis, tubis ternis. *Myosotis arvensis hirsuta minor* VAILL. t. 30. f. 2. ad vias aridas.

895. MYOSOTIS hirsuta & viscosa VAILLANT. t. 30. f. 1. similibus locis.

896. TUNICA ramis unifloris & bifloris, petalis levibus, stipulis calycinis brevissimis. *Caryophylli flores sylvestres* CAMER. *epit.* p. 351. ad rupestria lacuum supercilia.

897. TUNICA foliis glaucis, patentibus, floribus serratis, faucibus lanuginosis. *Caryophyllus sylvestris V.* CLUS. *pann.* p. 320. 321. in rupibus sabulosis.

898. TUNICA petalis minutissime laciniatis. *Caryophyllus sylvestris VI.* CLUS. *pann.* p. 323. ad vias perque nemora.

899. TUNICA fasciculis trifloris ramos terminantibus, stipulis aristatis maximis. *Caryophyllus arvensis, calyculo florum numeroso*, LOESEL ic. 7. ad vias planitiei.

900. TUNICA floribus umbellatis, squamis calycinis hirsutis, mucronatis, tubum æquantibus. *Caryophyllus barbatus* SEGVIER t. 7. passim ad vias, inprimis planitiei.

901. TUNICA capitulo ovali, compacto, calyce universali quadrifolio. *Caryophyllus sylvestris prolifer* SEGUIER. t. 7. ad vias aridas calidiorum.

902. TUNICA calycibus pelviformibus. *Betonica coronaria* f. *Tunica minima* I. B. III. p. 337. in glareis ad lacus calidiores.

903. SAPONARIA foliis filiformibus, caule diffuso, brachiato. *Spergula folio Knawel flore purpurascente minor Eph. Nat. Cur. Cent. VI.* p. 273. t. 4. inter stipulas.

904. SAPONARIA foliis gramineis, congestis, floribus umbellatis, petalis ovatis. *Lychnis floribus umbellatis, ochroleucis, petalis ovatis, filamentis nigris* ALLIONE *spec.* p. 29. t. 5. f. 2. in M. *Ternanche*, Valesiæ finitimo.

905. SAPONARIA radice lignosa, maxima, foliis pulposis, petalis emarginatis. *Caryophyllus alpinus Linariæ foliis, floribus variegatis* BOCCONE p. 23. t. 5. in subalpinis, etiam in alluvionibus fluviorum.

906. SAPONARIA foliis pulposis, linearibus, caule umbellato, erecto, petalis ovatis ad RUPP. t. 111. f. 2. SCHEUCHZERUS in alpibus Rhæticis.

907. SAPONARIA calycibus pyramidatis, quinquangularibus, foliis ovatis, connatis. *Thamæcnemon* CORDI p. 104. in segetibus planitiei.

908. SAPONARIA foliis ovato lanceolatis, trinerviis, floribus tubulosis umbellatis. *Saponaria* DODON. *coron.* p. 78. ad vias.

909. SAPONARIA caulibus decumbentibus, nodosis, foliis ovato lanceolatis, calycibus tubulosis hirsutis. *Ocymoides repens Polygoni folio* LOBEL. p. 341. ad vias & rupes arenosas.

910. VISCAGO foliis ovato lanceolatis, tomentosis, caulibus unifloris. *Lychnis pumila saxatilis alpina, flore carneo, folio crasso, molli, tomentoso* ALLIONE. in summis alpibus *Valesiacis*, M. *Sylvio*, *Pennino*.

911. VISCAGO foliis ovato lanceolatis, hirsutis, caule brachiato, calycibus venosis. *Ocymoides noctiflorum* C. B. *Basil.* ic. 34. Basileæ in segetibus.

Saponaria, Viscago, Lychnis

912. VISCAGO baccifera petalis ferratis. *Alfine repens* DODON. p. 403. Genevæ.
913. VISCAGO caule brachiato, nodofo, calycibus inflatis, venofis. *Herba articularis* TABERNÆM. p. 298. ad vias in alpes ufque.
914. VISCAGO foliis ellipticis, calycibus lineatis, vifcidis, petalis ovatis. *Vifcago hirta gallica, flore parvo carneo, petalis integris* DILLEN. *hort. Elth.* t. 299. in transalpinis.
915. VISCAGO foliis lanceolatis, hirfutis, floribus paniculatis nutantibus. *Lychnis fylveftris albo flore* CLUS. *pann.* p. 328. ad vias, rupes.
916. VISCAGO foliis glabris, ovato lanceolatis, floribus umbellatis. *Armerius flos tertius* DODON. *coron.* p. 73. in Valefia inferiori, circa *Roche.*
917. VISCAGO foliis lanceolatis, caulibus brachiatis, calycibus infundibuliformibus, floribus laxe umbellatis, erectis. *Auricula muris alpina glabra* I. B. III. p. 360. alpina, etiam montana.
918. VISCAGO foliis teneris recurvis, petalis quadrifidis. *Alfine alpina glabra folio reflexo* PLUKNET. p. 23. t. 15. f. 5. in alpibus aquilejenfibus.
919. VISCAGO foliis gramineis, caule breviffimo, unifloro. *Caryophyllus pumilus alpinus VII.* CLUS. *pann.* p. 329. alpina.
920. VISCAGO floribus verticillatis, fpicatis, fexu diftinctis, petalis linearibus. *Sefamoides magnum Salmanticenfe* CLUS. p. 295. in aquilejenfi dominio, Valefia &c.
921. LYCHNIS petalis quadrifidis. *Caryophyllus pratenfis* TABERN. p. 291. in pratis.
922. LYCHNIS foliis linearibus, lanceolatis, floribus umbellatis capitatis t. 17. alpium editiorum.
923. LYCHNIS floribus fexu diftinctis. *Ocymoides flore purpureo* CAMER. *epit.* f. 739. &

   β. *Ocymoides album multis* I. B. III. p. 292. ad vias & rivos.
924. LYCHNIS tomentofa, umbellis paucifloris, petalis cordatis. *Lychnis umbellifera montana Helvetica* ZANON. *nov.* t. 110. in alpibus Valefiacis & Infubricis.

925.

925. LYCHNIS tomentosa, calycibus costatis, floribus longe petiolatis. *Lychnis* CAMER. *epit.* p. 568. in Valesia inferiori.

926. LYCHNIS calycibus longissime caudatis. *Nigellastrum* DODON. *coron.* p. 49. in agris.

927. LYCHNIS foliis lanceolatis, floribus verticillatis, spicatis. *Lychnis sylvestris I.* CLUS. *pann.* p. 328 329. in Valesia inferiori ad vias.

928. OXYS scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamose articulata LINN. *Trifolium acetosum* DODON. *cereal.* p. 214. ad sepes arborumque radicees.

929. OXYS caule ramoso, diffuso, petiolis alaribus paucifloris, umbellatis LINN. *Oxys flore luteo* DODON. *purg.* p. 414. transalpina.

930. GERANIUM pedunculis unifloris, foliis septilobis, petalis bifidis. *Geranium IIII. hæmatodes* CLUS. *pann.* p. 429. 421. ad rupes.

931. GERANIUM caule erecto, foliis rugosis, hirsutis, multilobis, lobis trifidis, lobulis semipinnatis, floribus umbellatis. *Geranium IIII.* MATTHIOL. p. 857. in montosis rarius.

932. GERANIUM caule erecto, foliis rugosis septilobis, lobis acute serratis, petalis emarginatis. *Geranium II. Batrachioides alterum* CLUS. *pann.* p. 417 418. ad rivorum ripas.

933. GERANIUM caule diffuso, foliis rugosis semiquinquelobis, lobulis trifidis, floribus sparsis, petalis integerrimis. *Geranium batrachioides palustre flore sanguineo* DILLEN. *hort. Elth.* p. 160. t. 174. in sepibus humidis.

934. GERANIUM foliis rugosis hirsutis, semiseptilobis, lobis dentatis, petalis serratis, acuminatis. *Geranium I.* CLUS. *pannon.* p. 415. 416. Bernæ, & in montanis pratis.

935. GERANIUM foliis semiseptilobis, rugosis, dentatis, petalis planissimis, circumserratis, indivisis †. in *Aquilejensibus* & versus *Chillon.*

936. GERANIUM foliis septilobatis, rugosis, acute dentatis, petalis venosis, emarginatis. *Geranium incanum versicolor s. striatum* HIST. OXON. II. p. 516. t. 10. f. 24. in valle *S. Nicolai Valesiæ.*

Cxys, Geranium, Tribulus, Tamariscus

937. GERANIUM caule erecto, foliis quinquelobis, lobis trifidis, acutis. *Geranium majus, foliis imis longis, adusque pediculum divisis* VAILL. t. 15. f. 2. in agris.

938. GERANIUM caule procumbente, foliis quinquepartitis, lobis trilobis, lobulis trifidis. *Geranium columbinum dissectis foliis, pediculis florum longissimis* VAILLANT. t. 15. f. 4. in agris.

939. GERANIUM foliis mollissimis, hirsutis, reniformibus, semiquinquefidis, lobis semitripartitis obtusis. *Pes columbinus* DODON. p. 60. ad vias.

940. GERANIUM foliis hirsutis, semiseptilobis, lobis semitrilobis obtusis. *Geranium Robertianum, pes columbinus* TABERN. p. 56. ad vias.

941. GERANIUM viscidum, caule decumbente, foliis semiquinquelobis, lobis tridentatis & quinquelobatis. In calidis scopulis, adque vias.

942. GERANIUM foliis subrotundis, semiquinquelobis, lobis obtusis, calycibus transversim rugosis. *Geranium saxatile ὑγροσκοπελον* THAL. ic. 5. Rarissimum, circa Genevam nasci dicitur.

943. GERANIUM foliis duplicato pinnatis, pinnis ultimis confluentibus, calycibus striatis, hirsutis. *Geranium Robertianum* DODON. p. 62. ad sepes.

944. GERANIUM caule procumbente, petiolis multifloris, foliis duplicato pinnatis, pinnis acute incisis. *Geranium supinum* DODON. p. 63. *Geranium minus* TABERN. p. 57. ad vias.

945. GERANIUM petiolis multifloris, caule diffuso, foliis ovatis pinnatifidis. *Geranium montanum* RIVIN. *pentap. irreg.* t. 110. circa Basileam, Genevam, Biennam.

946. GERANIUM petiolis multifloris, foliis pinnatis, pinnis latescentibus, dentatis, alterne maximis. *Geranium Cicutæ folio, acu longissima* C.B. *prodr.* p. 138. in Valesia C. B. nuper non reperta.

947. TRIBULUS foliis æqualibus duodenis, conjugatis, fructu quadricorni. *Tribulus terrestris* DODON. *cereal.* p. 223. in valle *Augusta*.

948. TAMARISCUS spicis foliosis. *Myrica pannonica* CLUS. *pann.* p. 26. 27. 28. ad fluviorum ripas.

II. SUCCULENTÆ.

949. SEDUM rosulis glabris, ciliatis, petalis quatuordecim conglutinatis, lanceolatis, hirsutis CAMERAR. *epit.* p. 854. in tectis & rupibus.
950. SEDUM rosulis hirsutis, ciliatis, petalis subulato lanceolatis duodenis, *Sedum majus vulgari simile* I. B. III. p. 688. in alpibus trans M. *Sylvium.*
951. SEDUM foliis semipatulis hirsutis, petalis novenis subhirsutis. *Cotyledon altera II. taurica* CLUS. *pann.* p. 481. 482. alpina.
952. SEDUM rosulis araneosis, calvescentibus, petalis connatis, nervosis. *Sempervivum rubrum montanum γναφαλῶδες* COLUMN. *ecphr.* p. 290. 291. alpina & subalpina.
953. SEDUM sexu distinctum, foliis serratis, umbellis densissimis. *Radix Rhodia mas* CAMERAR. *epit.* 769. in alpinis editis australibus.
954. SEDUM foliis confertis, serratis, umbellis densis terminalibus †. *Telephium album* FUCHS. p. 800. Bernæ ad sepes.
955. SEDUM foliis ovatis, dentatis, conjugatis, umbellis alaribus. *Telephium I. Hispanicum* CLUS. *hisp.* p. 331. in aquilejensibus ad rupes.
956. SEDUM caule procumbente, foliis ovatis integerrimis. *Telephium minus sempervirens* LOBEL. p. 340. in alpibus aquilejensibus.
957. SEDUM foliis subrotundis, caule ramoso, floribus in alis sessilibus. *Sempervivum tertium Dioscoridis* COLUMN. *phytobas.* p. 40. in sepibus circa *Gex*, nuper non visum.
958. SEDUM caulibus paniculatis, foliis ovatis, planiusculis. *Cepæa* MATTH. p. 933 circa *Genevam*, *Mendris*, *Chiavennam &c.* ad vias.
959. SEDUM caule glabro, foliis teretibus, umbellis ramosis, floribus petiolatis. *Sedum minus I.* CLUS. p. LIX. & *II.* Ej. in muris & ad rupes.
960. SEDUM caule hirsuto, ramis simplicibus, floribus in alis sessilibus. *Sedum arvense flore rubente,* C. B. *prodr.* p. 132. Basileæ.

Sedum, Portulaca,

961. SEDUM foliis conicis, obtusis, glaucis, reticulatis, caule ramoso viscido. *Sedum minus VII.* CLUS. p. LX. in agro Vaudensi ad muros, etiam in alpibus.

962. SEDUM hirsutum & viscidum, foliis linearibus, obtusis, planiusculis. *Sedum palustre II.* CLUS. *pann.* p. 486. 487. ad rupes humectas inque pratis udis montanis.

963. SEDUM caule folioso, erecto, umbellato, humillimo, foliis teretibus. *Sedum saxatile atrorubentibus floribus* SCHEUCHZER. *It. I.* t. 6. f. 34. alpina saxa.

964. SEDUM caule ramoso, prostrato, foliis teretibus remotis, floribus longe sessilibus. Icon OEDERI t. 39. in alpibus editis rarius.

965. SEDUM foliis teretibus, ternatis, caulibus simplicibus trifidis. *Aizoon minimum* CORD. p. 78. ad vias aquilejenses.

966. SEDUM foliis conicis, confertis, caulibus ramosis, supremis trifidis. *Sedum minimum* TABERN. p. 844. ubique in muris & sterilibus.

967. SEDUM foliis semiteretibus, acutis, aristatis, caule supremo multifido, umbellato. *Sedum minus V* CLUS. p. LX. ad rupes.

968. PORTULACA foliis dilatatis, levibus, sessilibus, confertis. *Portulaca sylvestris minor s. spontanea* I. B. III. p. 678. in glareis ad fluviorum ripas.

969. SAXIFRAGA foliis lanceolatis, ciliatis, compactis, caule unifloro. *Sedum alpinum IIII.* COLUMN. *ecphras. II.* p. 66. 67. alpinum.

970. SAXIFRAGA foliis duris, ciliatis, caule ramoso, paucifloro. *Saxifraga Sedi foliis crenatis asperis* SCHEUCHZER. *It. II.* p. 140. t. 20. f. 3. alpina.

971. SAXIFRAGA foliis ellipticis, ciliatis, caule simplici, folioso, paucifloro. *Sedum alpinum I.* CLUS. *pann.* p. 484. 485. montanæ & alpinæ viæ roridæ.

β. *floribus aurantiis maculosis* alpinæ glareæ.

972. SAXIFRAGA foliis ellipticis, caule unifloro t. 11. *Saxifraga angustifolia autumnalis, flore luteo guttato* BREYNE *Cent.* c. 48. ic. 38. torfacea Juræ.

973.

973. SAXIFRAGA foliis rhomboideis, acute ferratis, caule nudo ramofo. *Sanicula montana minor* Clus. *pann.* p. 441. ad rivulos alpinos.

974. SAXIFRAGA foliis petiolatis, obtufis, caule fragili, nudo, ramofo. *Cotyledon altera* Matthiol. p. 1123. in rupibus alpinis & fubalpinis.

975. SAXIFRAGA foliis reniformibus, acute ferratis, hirfutis, petiolatis, caule ramofo. *Sanicula montana I.* Clus. *pann.* p. 410. alpium & Juræ.

976. SAXIFRAGA foliis radicalibus reniformibus, obtufe dentatis, caulinis palmatis. *Saxifraga* Docon. p. 315. 316. ad vias arenofas.

977. SAXIFRAGA foliorum ora cartilaginea, caule triplicato ramofo, petalis immaculatis. *Sedum ferratum, flore albo, multiflorum* Dodart. *mem.* p. 131. in fummis alpibus, & earum vallibus faxofis.

978. SAXIFRAGA foliorum ora cartilaginea ferrata, petiolis paucifloris, petalis punctatis. *Aizoon ferratum* Cord. p. 92. alpina & montana faxofa.

979. SAXIFRAGA foliorum ora cartilaginea, rariffime dentata, petalis maculofis t. 16. *Geum alpinum majus vifcofum, foliis oblongo rotundis, atrorubentibus & croceis floribus* Scheuchzer. *It. II.* p. 124. in quibusdam rupibus fubalpinis.

980. SAXIFRAGA caule repente, foliis quadrifariam imbricatis, cartilagineis, ciliatis. *Saxifraga alpina, flore cæruleo* Scheuchzer. *It. II.* p. 140. t. 20. f. 3. alpina faxofa frigida.

981. SAXIFRAGA foliis imbricatis, ovatis, caulibus reptantibus bifloris †. alpes Valefiacæ & aquilejenfes editiores.

982. SAXIFRAGA foliis craffis, duris, recurvis, fubtus fulcatis, bafi ciliatis. *Sedum alpinum minimum flore cinereo, floribus candidis* Scheuchzer. *It. II.* p. 141. t. 21. f. 2. alpina faxofa editiora.

983. SAXIFRAGA foliis compactis, plicatis, pungentibus, caule vifcido, paucifloro. *Saxifraga alpina, foliis glaucis acutis, monanthos, caule foliofo* Seguier. *fupplem.* p. 201. t. 5. f. 2. in alpibus editiffimis Rhætiæ & Valefiæ.

Saxifraga, Sedum — Agrimonia, Pentapteris, Oenothera

984. SAXIFRAGA foliis hirſutis, ellipticis & tridentatis, caule paucifloro *It. Helv. II.* p. 292. t. 2. *Sedi alpini III. Fr. Gregorii varietas foliis inciſis* COLUMN. *ecphraſ. II.* p. 66. 67. alpina.

985. SAXIFRAGA foliis mollibus, ſubhirſutis, ellipticis, caule paucifloro †. in alpinis ſaxis riguis aquilejenſibus & Valeſiacis.

986. SAXIFRAGA foliis petiolatis, trilobatis, caule erecto, ramoſo & folioſo. *Paronychia III.* TABERN. p. 805. in muris, tectis & rupibus.

987. SAXIFRAGA caule folioſo, multifloro, foliis palmatis, hirſutis †. *Saxifraga foliis palmatis, caule denſo, folioſo, florigero* ALLIONE p. 12. t. 3. alpes editæ aquilejenſes & Valeſiacæ.

988. SAXIFRAGA foliis integris & trifidis, caule ſubnudo paucifloro SCHEUCHZ. *It.II. Tridactylites alpina* I. B. III. alpina.

989. SAXIFRAGA foliis petiolatis trifidis, caule ſubnudo viſcoſo. *Sedum alpinum VII.* CLUS.*pann.* p. 491. alpina & hercynica.

?990 SEDUM caule folioſo, ramoſo, foliis palmatis, glaberrimis. *Saxifraga tridactylites pyrenaica latifolia* I. R. H. inter plantas SCHEUCHZERORUM. locus natalis ignoratur.

III. EPICARPIÆ.

991. AGRIMONIA foliis pinnatis, pinnis alterne minimis. *Eupatorium* MATTHIOL. p. 101. ad vias.

992. PENTAPTERIS floribus alaribus. *Myriophyllum aquaticum minus* VAILLANT. *Mem. de l'Acad.* 1719. p. 27. t. 2. f. 3. paſſim in foſſis aqua plenis.

993. PENTAPTERIS ſpica nuda. *Myriophyllum aquaticum majus* VAILLANT. in lacubus & foſſis majoribus.

994. OENOTHERA foliis ovato lanceolatis, planis, caule hirſuto. *Hyoſcyamus Virginianus I.* ALPIN. *exot.* p. 325. 326. in ſylvis & ad vias.

995. EPILOBIUM foliis ſemiamplexicaulibus, lanceolatis, hirſutis. *Lyſimachia purpurea* FUCHS.p.491.

β. flore

β. flore parvo. *Lysimachia siliquosa parvo flore* C.B. *prodr.* p. 116. ad fossas.

996. EPILOBIUM foliis ovato lanceolatis, glabris, dentatis. *Pseudolysimachium purpureum primum* DODON. p. 85. ad vias & fossas.

997. EPILOBIUM foliis lanceolatis glabris dentatis TABERN. p. 854. in aquosis.

998. EPILOBIUM foliis glabris, ellipticis, integerrimis. *Lysimachia siliquosa minor* TABERN. p. 856. in fossis & paludosis, forte non satis diversum.

999. EPILOBIUM foliis glabris, ovatis. *Chamænerium alpinum Alsines foliis* SCHEUCHZER. *It. II.* p. 132 *It. IV.* p. 332.

1000 EPILOBIUM flore difformi, foliis lanceolatis, transversim nervosis. *Chamænerium* DE BRY *florib.* t. 42.

1001 EPILOBIUM flore difformi, foliis linearibus †. *Pseudolysimachium purpureum minus* DODON. p. 5 ad torrentium glareas.

IV. PETALORUM NUMERO IN EADEM PLANTA VARIO.

1002 HYPOPITYS spica florida nutante. *Hypopitys* RIVIN. *tetrap. irreg.* in sylvis abiegnis.

1003 RUTA foliis duplicato pinnatis, lobulis ovatis. *Ruta sylvestris* DU HAMEL II. ic. 61. saxosa Valesiæ inferioris.

1004 RUTA foliis duplicato pinnatis, linearibus, lanceolatis. *Ruta sylvestris* CAMER. *epit.* p. 495. M. *Pilatus.*

1005 MOSCHATELLINA. *Moschatella* CORD. p. 172. b. ad sepes.

V. BACCIFERÆ.

1006 PARIS. *Herba Paris* MATTHIOL. p. 1193. umbrosa.

1007 PHYTOLACCA floribus petiolatis decemfidis. *Blitum americanum* MUNTING. ic. 112. in transalpinis.

Epilobium — Hypopitys, Ruta, Moschatellina — Paris, Phytolacca — Pyrola, Erica, Rhododendron, Andromeda, Arbutus

VI. CORNICULATÆ.

1008 PYROLA racemo unilaterali LINN. *Pyrola II. tenerior* CLUS. *pann.* p. 505. 506. in ſylvis.

1009 PYROLA foliis ſubrotundis, tubis rectis. *Pyrola minor* RIVIN. *pentap. irreg.* t. 134. in ſylvis.

1010 PYROLA foliis ſubrotundis, tubis recurvis. *Pyrola folio rotundo* RIVIN. t. 135. perinde.

1011 PYROLA ſcapo unifloro LINN. *Pyrola flore ſingulari* RIVIN. t. 137. ſubalpina aquilejenſia.

1012 ERICA foliis imis ſimplicibus adpreſſis, floralibus calcaratis. *Erica prima* MATTHIOL. p. 152. ad oras ſylvarum.

β. foliis omnibus calcaratis. *Erica tertia Cortuſi* I. B. I. P. II. p. 358. in ſylvis alpinis.

1013 ERICA foliis patentibus, quaternis, acutis, caducis, flore calyce longiori, antheris eminentibus. *Erica IIII.* CLUS. *pann.* p. 33. 34.

β. planta junior. *Erica III.* CLUS. *pann.* p. 33. 34. ſubalpina.

1014 ERICA ramis erectis, tomentoſis, foliis perangustis, acutis, confertis, flores ſuperantibus. *Erica I.* CLUS. *pann.* p. 21. tranſalpina.

1015 RHODODENDRON foliis ellipticis, glabris, ſubtus rubiginoſis. *Rhododendron foliis glabris, ſubtus leproſis, mollis, infundibuliformibus.* JACQUIN. obſ. t. 16. alpina, etiam montium editiorum.

1016 RHODODENDRON foliis ovatis, ciliatis, ſubtus punctatis. *Ledum alpinum* CLUS. *pann.* p. 73. 74. alpina.

1017 ANDROMEDA foliis alternis lineari lanceolatis LINN. *Flor. Lap.* t. 1. f. 2. torfacea.

1018 ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis duris integerrimis. *Uva urſi* CLUS. *hiſp.* p. 79. paſſim in montanis & alpinis.

1019 ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis rugoſis ſerratis. *Vitis idæa prima* CLUS. *pann.* p. 77. 78. ſubalpina.

1020 VACCINIUM foliis venoſis, ovato lanceolatis ſerratis,

ratis, caule angulofo. *Myrtillus* CAMER. *epit.* p. 135. fylvæ abiegnæ.

1021 VACCINIUM foliis integerrimis, ovatis, venofis. *Vitis Idæa II.* CLUS. *pann.* p. 77. 79 torfacea.

1022 VACCINIUM foliis perennantibus, ovatis, fubtus punctatis, oris contractis. *Vitis Idæa rubra* CAMER. *epit.* p. 316. fylvæ abiegnæ.

1023 VACCINIUM caule proftrato, foliis ovato lanceolatis, acutis, flore quadripartito. *Oxycoccus* CORD. *hift. II.* p. 1466. torfacea.

VII. FLORIBUS TUBULOSIS.

1024 THYMELÆA fpica cylindrica, fuperne foliofa. *Chamelæa Germanica* DODON. *purg.* p. 130. in fylvis.

1025 THYMELÆA foliis perennantibus, ellipticis, floribus ex alis nutantibus. *Laureola* DODON. *purg.* p. 172. in aquilejenfibus &c. per dumeta.

1026 THYMELÆA foliis ellipticis, calvefcentibus, floribus aggregatis, feffilibus, hirfutis. *Chamæleæ hirfutæ nomine data* I. B. I. P. I. p. 569. in M. *Saleva, aux Rochers de Moron &c.*

1027 THYMELÆA foliis glabris, linearibus, ariftatis, floribus feffilibus umbellatis. *Cneorum* CLUS. *pann.* p. 54. 55. in alpinis non frequens, etiam in montanis.

1028 STELLERA foliis linearibus, floribus quadrifidis LINN. *Linaria altera botryoides montana* COLUMN. *ecphraf.* p. 81. 82. ftipulæ calidiorum.

VIII. FLORE DIFFORMI MONOPETALO.

1029 ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis LINN. *Ariftolochia multiflora* RIVIN. *monop.* t. 16. in icrius.

1029* ARISTOLOCHIA foliis cordatis crenulatis, fubtus reticulatis, petiolatis, floribus folitariis LINN. *Piftolochia* DODON. *purg.* p. 19. in M. *Zere* Vallis Tellinæ.

Vaccinium, Thymelæa, Stellera, — Aristolochia — Fraxinella, Hippocastanum — Acer

IX. POLYPETALO.

1029** FRAXINELLA RIVIN. *pentap. irreg.* t. 132. in Valesia, circa Scaphusiam.

1029*** HIPPOCASTANUM. *Castanea folio multifida* CLUS. *hist.* p. 7. in ambulacris.

X. STAMINIBUS DICOLOBIS OCTONIS.

1029**** ACER foliis quinquelobis, dentibus acutis, intervallis lunatis, racemis erectis. *Acer platanodes* MUNTING. f. 11. in sylvis & ambulacris.

1029***** ACER foliis quinquelobis, acute serratis, racemis pendulis. *Platanus* TRAG. p. 1029. b. in montanis.

1029****** ACER foliis semitrilobis obtusis, lobis lateralibus emarginatis. *Acer* TABERNÆM. p. 973. in sepibus.

I. I. IIX. POLYSTEMONES.

I. ASCYROIDEÆ.

1030 TILIA foliis cordato lanceolatis, spongiolis ad nervorum angulos sessilibus. *Tilia vulgaris platyphyllos* I. B. I. P. II. p. 133.
β. *Tilia sylvestris* TRAG. p. 1111. in sylvis rarius-cule & compitis.

1031 CISTUS fruticosus, foliis petiolatis, ovatis, rugosis, serratis. *Cistus femina* CLUS. *hisp.* p. 140. 141. ad transalpinos lacus.

1032 CISTUS foliis duris, linearibus, confertis, petiolis unifloris, calycibus glabris. *Chamæcistus I. angustifolius* CLUS. *pann.* p. 59. in lapidosis apricis planitiei.

1033 CISTUS foliis conjugatis, ellipticis, hirsutis, integerrimis, petiolis unifloris subhirsutis. *Helianthemum germanicum* TABERN. p. 1062. ad vias.

1034

1034 CISTUS caulibus duris, procumbentibus, foliis conjugatis, ellipticis, fubhirfutis, petiolis confertis unifloris, calycibus tomentofis. *Chamæcistus ferpylli folio nigricante & flore aureo odorato* I. B. II. p. 47. alpina, etiam montana editiora.

1035 CISTUS caulibus duris, procumbentibus, foliis ellipticis, hirfutis, inferne cum calycibus tomentofis. *Helianthemum alpinum folio Pilofellæ minoris Fuchfii* I. B. II. p. 18. montana.

1036 CISTUS foliis craffis, tomentofis, ellipticis, linea exaratis. *Helianthemum montanum, polii folio incano, flore candido Hort. Elth.* t. 145. circa *Sedunum* legi: & inter plantas *Pilati* M. eft.

1037 HYPERICUM caule terete, alato, ramofiffimo, foliis ovatis perforatis. *Hypericum* DODON. p. 76. in arvis, ad vias.

1038 HYPERICUM caule quadrangulo, foliis ovatis, perforatis, punctatis. *Androfæmum* CAMER. *epit.* p. 677. in foffis.

1039 HYPERICUM caule proftrato, foliis ovatis, calycibus ferratis punctatis. *Hypericum minus*, DODON. p. 76. inter ftipulas.

1040 HYPERICUM foliis quaternis, linearibus, calyce ferrato, dentibus glanduligeris. *Coris* CAMER. *epit.* p. 678. in M. *Wiggis* Glaronenf.

1041 HYPERICUM foliis amplexicaulibus, cordatis, calycibus ovatis, ferratis, glanduligeris. *Hypericum pulchrum* TRAG. p. 74. Bafileæ, Mülhufiæ, in *Creux du vent.*

1042 HYPERICUM foliis ovatis, ora punctata, calycibus lanceolatis, ferratis, glanduligeris. *Androfæmum Campoclarenfium* COLUMN. *ecphraf.* p. 73. 74. in dumetis.

1043 HYPERICUM foliis ovatis, hirfutis, calycibus lanceolatis, ferratis, glanduligeris. *Androfæmum alterum hirfutum* COLUMN. p. 74. 75. ad vias, fepes, fylvas.

II. MO-

— — Tilia, Cistus, Hypericum — Tithymalus

II. NECTARIFERÆ.

1044 TITHYMALUS foliis ellipticis, ſtipulis umbellaribus, quaternis, petalis bicornibus ſucciferis. *Lathyris* DODON. *purg.* p. 162. Helvetia calidior & transalpina.

1045 TITHYMALUS foliis ellipticis, hirſutis, ſtipulis umbellaribus obſcuris, floralibus connatis, petalis lunatis. *Tithymalus lunato flore* COLUMN. *ecphraſ. II.* p. 56. 57. in ſylvis & dumetis.

1046 TITHYMALUS foliis linearibus, petalis emarginatis. *Eſula minor* DODON. *purg.* p. 159. circa *Haltingen.* non ſatis certa planta.

1047 TITHYMALUS foliis linearibus, ſtipulis numeroſis, floribus cordiformibus, petalis lunatis. *Tithymalus Cypariſſias* CAMER. *epit.* p. 964. ad vias.

1048 TITHYMALUS foliis linearibus, ſtipulis lanceolatis ariſtatis. *Eſula exigua* TRAG. p. 296. inter ſtipulas.

1049 TITHYMALUS foliis rotundis, ſtipulis floralibus cordatis obtuſis, petalis argute corniculatis. *Peplos* DODON. *purg.* p. 162. in agris & hortis.

1050 TITHYMALUS foliis petiolatis, ſubrotundis, ſerratis, ſtipulis rotundis ſerratis. *Tithymalus helioſcopius* CAMER. *epit.* p. 963. ſimilibus locis.

1051 TITHYMALUS foliis ellipticis ſerratis, ſtipulis umbellaribus quinis, floralibus cordatis, fructu aſperrimo. *Eſula ſoliſequa* RIVIN. *tetrap. irreg.* t. 117. in ſylvoſis, & pratis montanis.

1052 TITHYMALUS foliis ellipticis ſerratis, ſtipulis umbellaribus quinis, floralibus obtuſe quadrangulis, fructibus undique exaſperatis. *Tithymalus verrucoſus* I. B. III. p. 673. Baſileæ, circa *Chillon &c.*

1053 TITHYMALUS foliis lançeolatis, ſerratis, ſtipulis floralibus cordatis, fructibus aſperis, lineis levibus diviſis. *Tithymalus platyphyllus* I. B. III. p. 670. ad vias.

1054 TITHYMALUS foliis ellipticis, ramis umbellam ſupe-

ſuperantibus, capſulis exaſperatis. *Eſula paluſtris* RIVIN. t. 116. in pratis udis.

1055 TITHYMALUS floribus linearibus, ariſtatis, imbricatis, ſtipulis umbellaribus ovato lanceolatis, floralibus cordatis. *Tithymalus paralius* DODON. *purg.* p. 144. in aquilejenſium glareis, ad vias Valeſiæ, *Michelfeldæ.*

1056 RESEDA hexapetala, foliis pinnatis, undulatis, calyce ſexfido. *Reſeda Plinii Neotericorum &c.* LOBEL. ic. p. 722. ad vias planitiei.

1057 RESEDA foliis radicalibus integris, caulinis integris & ſemitrilobis, calycibus ſexfidis, florem ſuperantibus. *Phyteuma Monſpelienſium* LOBEL. p. 718. circa *Dardagny* haud longe Geneva,

1058 RESEDA foliis ellipticis, obtuſe lanceolatis, undulatis, calycibus quadrifidis. *Antirrhinum* TRAG. p. 362. ad vias & in ruderoſis.

III. RHOEADEÆ.

1059 CHELIDONIUM lobis foliorum ſubrotundis. *Chelidonium majus* FUCHS. p. 865. ad muros, & maceriis.

1060 GLAUCIUM foliis radicalibus ſemipinnatis, caulinis amplexicaulibus. *Papaver corniculatum*, DODON. *purg.* p. 336. ad glareoſa litora lacus Neocomenſis.

1061 PAPAVER foliis hiſpidis, pinnatis, pinnis lobatis, capſulis ellipticis, hiſpidis. *Argemone capitulo breviore* LOBEL. ic. p. 276. in agris Argoviæ, Baſileæ.

1062 PAPAVER caule nudo, unifloro, foliis pinnatis, pinnis integris & diviſis, capitulis ſubrotundis hiſpidis. *Papaver alpinum Coriandri folio* SEGUIER p. 416. t. 4. f. 4. in monte *Pierre plate*, *Pilato.*

1063 PAPAVER foliis hiſpidis pinnatis, pinnis lobatis, fructu ovato levi. *Papaver erraticum capitulo longiſſimo glabro* I. B. & ad RUPP. p. 79. in agris planitiei.

1064 PAPAVER foliis ſemipinnatis, hiſpidis, fructu ovato

Reseda - Chelidonium, Glaucium, Papaver
Nymphaea, Hydrocharis — Malva, Althaea, Abutilon.

ovato glabro. *Papaver erraticum* DODON. *purg.* p. 333. in agris.

1065 PAPAVER calycibus capitibusque glabris, foliis amplexicaulibus incisis LINN. *Papaver sativum III.* DODON. *purg.* p. 329. in agris & ad maceries.

1066 NYMPHÆA calyce pentaphyllo, petalis majori, fructu conico. *Nymphaea lutea* MATTHIOL. p. 893. in fossis & stagnis.

1067 NYMPHÆA calyce quadrifolio, petalis minori, fructu sphærico. *Nymphaea alba* MATTHIOL. p. 893. in fossis & stagnis lentisque fluviis vulgatior.

1068 HYDROCHARIS LINN. *Ranæ morsus* DODON. *cereal.* p. 228. in fossis circa magnos lacus.

IV. COLUMNIFERÆ.

1069 MALVA caule erecto, foliis lobatis; lobis serratis, quinis & septenis. *Malva vulgaris flore majori, foliis sinuatis* I. B. II. p. 949. ad vias.

1070 MALVA caule repente, foliis cordato orbicularibus, obsolete quinquelobis LINN. *Malva sylvestris pumila* DODON. p. 653. ad vias.

1071 MALVA caule erecto, foliis scabris, trilobatis, lobis lateralibus bipartitis, medio tripartito & quinquepartito. *Alcea* MATTH. p. 927. ad vias.

1072 MALVA foliis radicalibus reniformibus incisis, caulinis quinquepartitis pinnatis, pinnis dentatis. *Malva montana* s. *Alcea rotundifolia laciniata* COLUMN. *ecphras.* p. 147. 148. Bernæ ad vias.

1073 ALTHÆA foliis radicalibus reniformibus, caulinis palmatis, trilobis & quinquelobis, calycibus hispidis. *Alcea villosa* I. B. II. p. 1067. in aquilejensibus & Vaudensibus montanis.

1074 ALTHÆA tomentosa, herbacea, caule erecto, foliis cordato lanceolatis obsolete trifidis. *Althæa* CAMER. *epit.* p. 667. circa fluvios & lacus.

1075 ABUTILON foliis tomentosis, cordatis, petiolatis, siliquis bicornibus. *Abutilon Avicennæ* H. *Aichst. æst.* 6. t. 16. f. 1. in montibus inter *Bergamum* & vallem *Tellinam*.

V. FRUCTU MOLLI.

I. FLORE CIRCUMDATO.

1076 ACTÆA foliis circumserratis, duplicato pinnatis, pinnula extrema trilobata. *Christophoriana* DODON. *purg.* f. 237. in umbrosis & sylvis.

1077 CAPPARIS pedunculis solitariis unifloris, stipulis spinosis, foliis annuis, capsulis ovatis LINN. *Capparis* BLAKWELL. t. 417. Transalpini muri.

1078 AMYGDALUS foliis glabris, ovato lanceolatis, serratis, imis dentibus & petiolis glandulosis. *Amygdalus amara* DU HAMEL I. p. 38. in Valesia inferiori.

1079 PRUNUS foliis serratis, hirsutis, ovato lanceolatis, floribus longe petiolatis. *Prunus* DU HAMEL II. p. 146. passim ad sepes.

1080 PRUNUS spinosa, foliis glabris, serratis, ovato lanceolatis, floribus breviter petiolatis. *Prunus spinosa* MATTHIOL. p. 206. passim secundum vias.

1081 PRUNUS pedunculis geminis, foliis ovatis, subtus villosis, convolutis, ramis spinascentibus LINN. p. 681. circa *Kilchberg*, *Courtelary*, passim.

1082 CERASUS foliis ovato lanceolatis, serratis, inferne subhirsutis, mucrone producto. *Cerasus sylvestris fructu rubro & nigro* I. B. I. P. I. p. 200. in sylvis.

1083 CERASUS foliis glabris, serratis, ovato lanceolatis, mucrone producto. *Cerasa rubra* BLAKWELL. t. 449. in colle super *Portvalay*, a *Champé*,

1084 CERASUS foliis subrotundis serratis, pedunculis multifloris. *Machaleb* CAMER. *epit.* p. 91. ad rupes submontanas & subalpinas.

?1085 CHAMÆCERASUS M. *Generosi* GESNER. *hort.* ignota nuperis.

1086 PADUS foliis ovato lanceolatis serratis. *Cerasus racemosa nigra* TABERNÆM. p. 988. passim ad sepes.

– Actæa, Capparis, Amygdalus, Prunus, Cerasus, Chamæcerasus, Padus
– Mespilus, Pirus, Punica, Opuntia

VI. II. FRUCTU MOLLI CORONATO.

1087 MESPILUS ſpinoſa, foliis glabris, ſerratis, retuſis, trifidis. *Acuta Spina* MATTHIOL. *p.* 163. ad ſepes.

1088 MESPILUS foliis ſerratis ſeptilobis, lobis primis divergentibus. *Sorbus torminalis* MATTHIOL. p. 267. paſſim ad ſepes.

1089 MESPILUS foliis ovatis ſerratis, ſubtus tomentoſis. *Aria* CRANZ. faſc. 11. t. 2. f. 2. in dumetis montanis & ſubalpinis.

1090. MESPILUS foliis ovatis ſerratis glabris. *Colonteaſter forte Geſneri* CLUS. *pann.* p. 83. 84. in alpinis & montanis editiſſimis.

1091 MESPILUS foliis pinnatis, utrinque glabris. *Sorbus aucuparia* CRANZ. *faſc. II.* p. 49. t. 2. f. 4. in ſylvis vulgo.

1092 MESPILUS foliis pinnatis, ſubtus villoſis. *Sorbus ſylveſtris domeſticæ ſimilis* C. B. paſſim ſativa, circa Baſileam.

1093 MESPILUS inermis, foliis ovatis integerrimis, ſubtus tomentoſis. *Chamæmeſpilus* GESNER *hort.* p. 214. 215.

1094 MESPILUS foliis elliptico lanceolatis, ſerratis, calycibus longiſſimis perſiſtentibus. *Meſpilus* DODON. p. 801. in dumetis rarior.

1095 PIRUS foliis ovatis ſerratis, ſubtus tomentoſis, calveſcentibus. *Vitis Idæa tertia* CLUS. *pann.* p. 81. 82. in adclivibus montanis & ſubalpinis.

1096 PIRUS foliis ovato lanceolatis, ſerratis, glabris. *Pirus ſylveſtris* DODON. p. 799. ad oras ſylvarum.

1097 PIRUS foliis ovatis acuminatis, ſubtus hirſutis, petiolis floriferis breviſſimis. *Malus ſylveſtris* DODON. p. 790. Similibus locis.

1098 PUNICA ſpinoſa, foliis nitentibus, ellipticis, integerrimis, floribus ſeſſilibus. *Malus punica* CAMER. *Epit.* p. 131. 132. in Valeſia ad rupes.

1099 OPUNTIA foliis ovatis, compreſſis, ſpinis ſetaceis. *Opuntia vulgo herbariorum* I. B. I. p. 154. ad rupes Valeſiæ.

1100

1100 PHILADELPHUS foliis ſubdentatis. *Syringa flore albo* Clus. hiſp. p. 125. paſſim in ſylvis calidioris Helvetiæ.

1101 ROSA ſpinis aduncis, foliis ſeptenis, calycibus tomentoſis, ſegmentis pinnatis & ſemipinnatis, tubis breviſſimis. *Roſa canina vulgo dicta* Dodon *Cereal.* p. 182. Vulgo ad ſepes.

1102 ROSA ſpinis recurvis, foliis glabris, ſeptenis, calycibus tomentoſis, ſegmentis ſubpinnatis, tubis longis barbatis †. *Roſa ſylveſtris aſperior candida* Fuchs p. 656. ad ſepes.

1103 ROSA ſpinis aduncis, foliis ſubtus rubiginoſis. *Roſa ſylveſtris odorata* Dodon. *coron.* p. 100. in dumetis & ſolitudinibus.

1104 ROSA humilis, ſpinis ſubrectis, foliis quinis, rotundis, ſerratis, calycis foliis ſimplicibus, pinnatis & ſemipinnatis. Χαμαιρροδον Clus. *pann.* p. 113. Circa Genevam.

1105 ROSA ſpinis rectis, foliis quinis tomentoſis, pinnis rotundis, ſpinoſis. *Roſa pomo ſpinoſo folio & caule hirſuto* I. B. II. p. 38. Montana.

1106 ROSA ſpinis rectis, foliis confertis, novenis, glabris, pinnis & petiolis ſubſpinoſis. *Roſa campeſtris odora* Clus. *pann.* p. 111. 112. 114. Circa Roche & paſſim in ſubmontanis.

VII. GYMNOPOLYSPERMÆ.

I. CALYCIFLORÆ.

1108 RUBUS caule ſpinoſo, ſubrecto, foliis quinatis & ternatis, ſubtus tomentoſis, fructibus hirſutis. *Rubus Idæus vulgaris* Clus. hiſt. p. 117. in ſylvis & collibus.

1109 RUBUS caule ſpinoſo, ſerpente, foliis quinatis & ternatis, ſubtus tomentoſis, baccis levibus. *Rubus* Camerar. *Epit.* p. 751. In ſylvis renaſcentibus & ad ſepes.

1110 RUBUS caule aculeato proſtrato, foliis ternatis. *Rubus minor* Dodon. p. 748. in agris humidis & ad vias.

Chirchiplus, Rosa, Rubus, Fragaria, Geum

1111 RUBUS caule herbaceo, foliis glabris, ternatis, acinis pauciffimis. *Rubus faxatilis alpinus* CLUS *pann.* p. 115. 116. alpina & montana.

1112 FRAGARIA foliis ternatis, flagellis reptans. *Fragaria fylveftris vel montana* CAMER. *epit.* p. 765. ad vias & colles.

β. absque flagellis DU CHESNE p. 204. Biennæ.

1113 FRAGARIA caule proftrato, foliis ternatis retufis, fericeis. *Fragaria fterilis ampliffimo folio petalis cordatis* VAILLANT. t. 11. f. 1. Paffim ad vias.

1114 FRAGARIA foliis ternatis, fericeis, caule declinato, petalis calycem fuperantibus t. 21. *Fragaria Helvetica nana* PARKINSON p. 119. Alpes potiffimum aquilejenfes.

1115 FRAGARIA foliis ternatis, hirfutis, caulinis tripartitis, ftipulis ovato lanceolatis. Icon OEDERI t. 171. Alpes editiores.

1116 FRAGARIA foliis ternatis, retufis, tridentatis, flore calyci æquali, pentaftemone. *Sibbaldia* LINN. Ic. OEDERI t. 32. alpium editiorum, potiffimum aquilejenfium & *Penninarum*.

1117 FRAGARIA tetrapetala, foliis caulinis feffilibus, quinatis. *Tormentilla* CAMER. *Epit.* p. 685. in pratis humectis & fylvis.

1118 FRAGARIA foliis quinatis, ferratis, petiolis unifloris, caule reptante. *Quinquefolium* MATTH. p. 1018. ad vias vulgo.

1119 FRAGARIA caule decumbente, foliis quinatis, ferratis, fubhirfutis. *Pentaphyllum f. quinquefolium minus* TABERN. p. 123. ad vias.

1120 FRAGARIA caule fuberecto, foliis quinis & feptenis, ferratis obtufis. *Fragaria opaca* LINN. *Cent.* 1. n. 35. *Fouly.*

1121 FRAGARIA caule erecto, foliis quinis & feptenis, acute ferratis. *Quinquefolium montanum rectum hirfutum luteum* GARIDEL t. 83. in M. *Follatel* Vallefiæ.

1122 FRAGARIA caule reclinato, foliis quinis ferratis, ora fericea t. 21. *Quinquefolium aureo flore III.* CLUS. *pann.* p. 426. 427. alpina & montana.

1123

1123 FRAGARIA foliis ovatis, acute ferratis, oris fericeis, pappo difci longiffimo. *Quinquefolium II.* CLUS. *pann.* p. 423. 425. in rupibus aquilejenfibus, & Valefiæ inferioris.

1124 FRAGARIA caule erecto, foliis quinatis, apice ferratis, fubtus tomentofis. *Pentaphyllum minus* CAMER. *epit.* p. 760. in muris & fterilibus viarum.

1125 FRAGARIA foliis fubtus tomentofis, pinnatis, pinnis primis pinnatis, ultimis fimplicibus. *Pentaphylloides repens foliis pinnatis* BUXBAUM cent. I p. 49. Glacialia montis *Stok* Valefiæ.

1126 FRAGARIA caule repente, foliis pinnatis ferratis, tomentofis, petiolis longis unifloris. *Potentilla* CAMER. *Epit.* p. 718. ad vias.

1127 FRAGARIA foliis pinnatis, pinnis feptenis, fubrotundis, ferratis. *Quinquefolium V.* CLUS. *pann.* p. 331. Paffim Genevæ & in Valefia, infrequens.

1128 FRAGARIA foliis pinnatis, petalis lingulatis minimis. *Pentaphyllum paluſtre* CORD. p. 95. b. in torfaceis.

1129 GEUM foliis pinnatis, pinnis acutis, extrema maxima, trilobata, floribus conniventibus, nutantibus. *Caryophyllata alpina nutante flore* CLUS *pann.* p. 433. 434. ad rivos & in pratis humidis.

1130 GEUM foliis pinnatis, pinna ultima trilobata, floribus patulis, tubis aduncis. *Caryophyllata* DODON. *pempt.* p. 137. ad vias.

1121 GEUM foliis pinnatis, extrema maxima, rotunde cordata. *Caryophyllata montana* CAMER. *Epit.* p. 327. alpina.

1132 GEUM foliis pinnatis, trilobatis, incifis, flagellis foliofis. *Cariophyllata alpina minima II. Spec.* PON. *It. bald Ital.* p. 205. alpes editiores, aquilejenfes &c.

1133 DRYAS floribus octopetalis, foliis ovatis, fubtus albiffimis. *Chamædrys III.* CLUS *pann.* p. 30. 611. alpina & montana.

1134 FILIPENDULA dioica, foliis duplicato pinnatis, pinnis quinquefoliis, trifoliis & fimplicibus.

 Bar-

Barba capræ CAMER. *hort.* ic. IX. in dumetis subudis.

1135 FILIPENDULA pinnis acute ſerratis, minimis intermiſtis, extrema trilobata maxima. *Ulmaria* CLUS. *pann.* p. 700. in pratis ſubudis.

1136 FILIPENDULA foliis pinnatis, minimis intermiſtis, extrema trilobata. *Filipendula* BLAKWELL t. 767. in Valeſia inferiori, circa Baſileam & in pratis ſubudis.

VIII. GYMNOPOLYSPERMÆ.

II. PETALIS EX RECEPTACULO NATIS.

1137 THALICTRUM foliis adſcendentibus linearibus, panicula erecta. *Thalictrum anguſtiſſimo folio* C. B. *prodr.* p. 146. Circa Michelfelden, & *Jllkirch*, raro, ad agrorum margines.

1138 THALICTRUM foliis erectis, lobulis acute trilobis, ſpica adſcendente. *Thalictrum magnum* DODON. *purg.* p. 434. In aquoſis pratis.

1139 THALICTRUM foliis patulis, imis obtuſe trilobis, ſupremis acutis, panicula diffuſa, floribus nutantibus. *Thalictrum parvum* DODON. *purg.* p. 435. ad rupes ſubalpinas & montanas.

1140 THALICTRUM foliis patulis pubeſcentibus, trilobatis, floribus nutantibus, petalis ſubhirſutis. *Thalictrum minimum fœtidiſſimum* C. B. *prodr.* p. 147. in alpibus aquilejenſibus & Valeſiacis.

1141 THALICTRUM foliis triplicato pinnatis, patulis, obtuſe trilobatis, ſtipulis ovatis, paniculis umbellatis. *Thalictrum flore albo* H. AICHSTETT. *Vern. ord.* 1. t. 11. in dumetis.

1142 CLEMATIS caule ſcandente, foliis pinnatis, ovato lanceolatis. *Vitalba* DODON. *purg.* p. 242. ad ſepes.

1143 CLEMATIS caule ſcandente, foliis pinnatis trilobatis. *Flammula* DODON. *purg.* p. 343. I. B. in Rhætia ad ſepes legit, nuper non viſam.

1144 CLEMATIS caule erecto, foliis pinnatis, ovato lanceolatis. *Flammula* MATTH. CLUS. p. 296. 297. in Valeſia inferiori & trans alpes.

1145 ATRAGENE foliis ternatis, foliolis ternatis, foliolis trifoliis acutis. *Clematis cruciata alpina* Pon. *Ital.* p. 175. in M. *Speluga.*

1146 ANEMONE tubis caudatis, involucris unifoliis multifidis, foliis linearibus hirſutis, duplicato pinnatis, pinnis tripartitis & quinquepartitis. *Pulſatilla* Camer. *Epit.* p, 392. in collibus apricis & aridis.

1147 ANEMONE tubis caudatis, involucris multifidis, foliis pinnatis, pinnis latis, lobatis t. 21. *Pulſatilla apii vernalis folio flore minore* C. B. Helwing ic. 10. & 9. alpina ſaxoſa, inprimis *Aquilejenſia.*

1148 ANEMONE tubis caudatis, involucris multifidis, foliis hirſutis, pinnatis, pinnis acute lobatis. †. in Vallis D. *Nicolai* alpibus.

1149 ANEMONE foliis triplicato pinnatis, acute circumſerratis, caulinis ternatis, tubis caudatis. *Anemone ſylveſtris II.* Clus. *pann.* p. 382. 383. montana & alpina.

β. flore flavo. Aquilejenſia, & *Penninus* M.

1150 ANEMONE ſeminibus lanatis, foliis digitatis, hirſutis, floribus pentapetalis. *Anemone ſylveſtris* I. Clus. *pann.* p. 381. 382. *Mülbuſiæ.*

1151 ANEMONE ſeminibus lanatis, foliis caulinis ternatis, triplicato trifidis, lobulis lanceolatis, acute trifidis bifidisve †. *Anemone alpina alba minor* C. B. *prodr.* p. 94. alpes *Aquilejenſes* & *Penninæ.*

1152 ANEMONE ſeminibus lanatis, foliis radicalibus trilobatis & multifidis, caulinis ovato lanceolatis. *Anemone* Dodon. *purg.* p. 296. Prope *Roche*, *Moutru.*

1153 ANEMONE biflora, ſeminibus nudis, foliis caulinis, quinquepartitis, lobis tripartitis inciſis. *Nemoroſus Ranunculus luteus* Lobl ic. p. 694. in pratis & nemoribus planitiei.

1154 ANEMONE ſeminibus nudis, caule unifloro, foliis caulinis, quinquepartitis, lobis tripartitis inciſis. *Anemone V.* Dodon. *purg.* p. 300. ad ſepes & in dumetis.

Atragene, Anemone, Hepatica, Adonis, Myosurus, Ficaria

1155 ANEMONE seminibus nudis, rotundis, planis, foliis septifidis imbricatis, floribus umbellatis. *Ranunculus alpinus Narcissi flore* CLUS. *pann.* p. 366 367. alpina & montana.

1156 HEPATICA foliis trilobatis integerrimis. *Trifolium aureum* DODON. *Cereal.* p. 216. in sylvis.

1157 ADONIS radice perenni, flore dodecapetalo. *Buphthalmum* DODON. *Coron.* p. 248. in Valesia inferiori circa *Fouly*, *Gonthey*.

1158 ADONIS radice annua, flore octopetalo. *Anemone flore pallido* CAM. *Epit.* p. 648. & β. *Adonis flore flammeo* H. AICHSTETT *æst. ord.* 8. t. 11. f. 3. in Valesia, Basileæ, Mülhusiæ.

1159 MYOSURUS VAILLANT *Mem. de l'Acad.* 1719. p. 33. Basileæ, Mülhusiæ.

1160 FICARIA BRUNFELS. ad sepes.

1161 RANUNCULUS fluitans, petiolis unifloris, foliis capillaceis, longissimis, laciniis parallelis. *Ranunculo f. Polyanthemo aquatico albo affine, millefolium maratriphyllum fluitans* I. B. III. p. 782. ad Wiesam &c.

1162 RANUNCULUS fluitans, petiolis unifloris, foliis capillaribus, laciniis divergentibus. *Ranunculus trichophyllus aquaticus medio luteus* COLUMBR. *ecphras.* p. 315. 316. in omnibus fossis & rivis non rapidis.

1163 RANUNCULUS fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, supernis reniformibus, orbiculatis, palmatis. *Ranunculus aquaticus hepaticæ facie* LOBEL II. p. 35. in rivis ad oras vadosas.

1164 RANUNCULUS caule ramoso, multifloro, foliis venosis, quinquelobis, lobis rhomboideis, acutis, acute serratis. *Ranunculus montanus VI.* CLUS. *pann.* p. 369 370. alpinus & montanus.

1165 RANUNCULUS caule unifloro, foliis imbricatis pinnatis, pinnis lobatis, lobis obtuse palmatis. *Ranunculus præcox rutæ folio* CLUS. *hist.* p. 32. altissimæ alpes Rhætiæ, Valesiæ.

1166

1166 RANUNCULUS foliis pulposis, repetito trilobatis, calycibus villosis. *Ranunculus caule bifloro, calyce hirsuto* LINN. *Lapon.* t. 3. f. 1. alpina, potissimum aquilejensia.

1167 RANUNCULUS uniflorus, foliis levibus, semitrilobis, rotunde serratis, caulinis lingulatis. *Ranunculi montani Spec.* 1. CLUS *pann.* p. 363. 364. alpinus & montanus.

1168 RANUNCULUS uniflorus, foliis glabris, reniformibus, semiquinquelobis. *Ranunculus minimus alpinus luteus* I. B. III. p. 861. alpinus etiam montanus.

1169 RANUNCULUS foliis hirsutis, semitrilobatis, lobis lateralibus bipartitis, foliis caulinis semitrilobis. *Ranunculus hortensis II.* DODON. *purg.* p. 275. in pratis & ad vias.

1170 RANUNCULUS radice subrotunda, foliis semitrilobis, serratis, hirsutis, receptaculo lanuginoso†. *Ranunculus Breyninus* CRANZ. *fasc. II.* p. 91. t. 4. f. 2. alpinus.

1171 RANUNCULUS ramosus, multiflorus, foliis semiseptilobis, lobis tridentatis acutis. *Ranunculus sylvestris II.* DODON. *purg.* p. 279. in sylvis.

1172 RANUNCULUS foliosus, ramosus, erectus, foliis semitrilobatis, hirsutis, vaginis sericeis. *Ranunculus nemorosus, hirsutus, folio caryophyllatæ* LOESEL. p. 220. ic. 71. in sylvis.

1173 RANUNCULUS caule reptante, radicato, foliis semitrilobatis, lobis petiolatis. *Ranunculus hortensis I.* DODON. *purg.* p. 274. in pratis & agris.

1174 RANUNCULUS radice subrotunda, foliis hirsutis, semiseptilobis, lobis petiolatis. *Ranunculus tuberosus* DODON. *purg.* p. 290. in herbosis.

1175 RANUNCULUS foliis levibus, semitrilobatis, rotunde serratis, fructu ovato. *Ranunculus sylvestris I.* DODON. *purg.* p. 278. in viis udis.

1176 RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis tripartitis, lobis longe petiolatis, bipartitis & tripartitis, acute incisis. *Ranunculus sylvestris III.* DODON. *purg.* p. 230. in agris.

Ranunculus, Damasonium, Sagitta
— Butomus, Paeonia

1177 RANUNCULUS foliis radicalibus integris & semitrilobatis, rotunde crenatis, caulinis multipartitis, linearibus, integerrimis. *Ranunculus dulcis s. pratensis* TRAG. p. 97. ad sepes & in sylvis.

1178 RANUNCULUS foliis duris, venosis, reniformibus, rotunde crenatis, convexitate retusa, acute serrata. *Thora major* CAMER. *Epit.* p. 826. in alpinis *aquilejensibus* & *M. Thuiri.*

1179 RANUNCULUS radicibus fasciculatis, imo caule reticulato, foliis cordiformibus. *Ranunculus dulcis foliis latis rapistri perfoliatis floribus albis* MENZEL *pugill.* t. 8. f. 6. in alpibus aquilejensibus.

1180 RANUNCULUS radicibus fasciculatis, imo caule reticulato, foliis gramineis †. *Ranunculus pumilus gramineis foliis* I. B. III. p. 866 in alpibus editioribus Rhæticis & Valesiacis.

1181 RANUNCULUS erectus, ramosus, foliis ensiformibus, subserratis. *Ranunculus lanceatus major* TABERN. p. 48. ad aquas.

1182 RANUNCULUS caule declinato, foliis elliptico lanceolatis, subserratis. *Flammula Ranunculus* DODON. *purg* p. 292. in udis abunde.

1183 RANUNCULUS caule reptante, foliis linearibus, fasciculatis. *Ranunculus foliis linearibus caule repente* LINN. *flor. Lapon.* p. 236. t. 3. f. 5. in litioribus lapidosis lacuum, suspecta species.

1184 DAMASONIUM foliis ellipticis, lanceolatis, capitulo rotunde triquetro. *Plantago aquatica* CAMER. *epit.* p. 264. in fossis.

1185 SAGITTA foliis acuminatis. *Sagitta* CAMER. *epit.* p. 814. in nonnullis fossis *Nidoviæ*, *Mülbusiæ*, *Ebroduni* &c.

IX. MULTISILIQUÆ.

1186 BUTOMUS LINN. *Juncus floridus* CAMER. *epit.* p. 781. *Ebroduni*, *Michelfeldæ.*

1187 PAEONIA radice glandulosa, foliis duplicato pinnatis, pinnis ellipticis & trilobis. *Pæonia femina* MATTHIOL. p. 915. in pratis *M. Generosi.*

1188

1188 CALTHA LINN. *paluſtris* LOBEL p. 594. ad rivulos & foſſas.

1189 TROLLIUS LINN. *Ranunculus VI.* CAMER. *epit.* p. 385. Subalpinus & montanus.

1190 ISOPYRUM. *Aquilegia montana flore parvo thalictri folio* C. B. *prodr.* p. 75. in helvetiorum alpibus, inde non repertum.

1191 HELLEBORUS flore folio inſidente. *Aconitum luteum minus* DODON. *purg.* p. 352. in pratis pagi *Bex.*

1192 HELLEBORUS foliis multipartitis, ſerratis, caule paucifloro. *Helleborum nigrum alterum* CAMER. *Epit.* p. 941. in montanis hinc inde & in transalpinis.

1193 HELLEBORUS ramoſus, multiflorus, foliis multipartitis ſerratis, ſtipulis ovato lanceolatis, coloratis *Veratrum nigrum* DODON. *purg.* p. 191. Vulgo ad vias ſubmontanas.

1194 NIGELLA flore nudo, ſiliquarum cornubus longiſſimis. *Melanthium ſylveſtre alterum* MATTHIOL. p. 797. in ſegetibus planitiei.

1195 AQUILEGIA foliis trilobatis, lobis petiolatis tripartitis, ſubrotundis, obtuſe dentatis. *Iſopyrum* COLUMER *Phytobaſ.* Vulgo in pratis ſubmontanis & ſylvis.

1196 AQUILEGIA foliis trilobatis, lobis tripartitis linearibus, caule paucifloro. *Aquilegia montana magno flore* C. B. *prodr.* p. 75. Alpina Aquilejenſia.

1197 ACONITUM caule ſimplici, ſpica denſa, petiolis unifloris, caſſidis mucrone brevi. *Napellus* CAMER. *epit.* p. 836. ad vias montanas & alpinas.

1198 ACONITUM caule ramoſo, paniculato, petiolis multifloris, caſſidis mucrone longo. *Aconitum lycoctonum Judenbergenſe* CLUS. *pann.* p. 410. 412. in vallibus ſubalpinis aquilejenſium.

1199 ACONITUM foliis hirſutis, ſemitrilobis, lobis duplicato trifidis. *Napellus flore luteo* RIVIN. t. 127. In dumetis ſubmontanis & ſubalpinis.

Caltha, Trollius, Isopyrum, Helleborus, Nigella, Aquilegia, Aconitum, Delphinium — Veratrum, Anthericum — Asphodelus (Phal.)

1201 DELPHINIUM trisiliquum, foliis semiquinque lobis, acute serratis, petiolis interioribus quaternis, barbatis *Aconitum Lycoctonum I.* CLUS. *pann.* p. 403. 404. alpes aquilejenses.

1202 DELPHINIUM unisiliquum, caule recto spicato. *Delphinium sativum* RIVIN. t. 123. ad maceries.

1203 DELPHINIUM unisiliquum, caule brachiato diffuso, floribus sparsis. *Consolida regalis arvensis* TABERN. p. 62. in agris Valesiæ & planitiei.

IX. LILIACEÆ.

I. TRISILIQUÆ.

1204 VERATRUM spica paniculata, floribus sexu distinctis. *Veratrum album* DODON. *purg.* p. 214. Prata subalpina & montana.

1205 ANTHERICUM filamentis glabris. *Phalangium alpinum palustre Iridis folio* SEGULER II. t. 2. f. 14. in pratis udis etiam circa Bernam.

II. FRUCTU TRILOCULARI.

I. INTRA FLOREM.

I. PETALIS PATULIS.

1206 ASPHODELUS caule folioso, foliis angulatis, striatis, stipulis maximis. *Asphodelus luteus* DODON. *Coron.* p. 142. 143. in M. *Fräla* vallis Tellinæ.

1207 PHALANGIUM radicibus teretibus, foliis radicalibus carinatis, ensiformibus, petiolis unifloris. *Liliago* CORD. II. c. 106. p. 190. b. Frequens in rupibus adclivibus.

1208 PHALANGIUM radicibus teretibus, foliis gramineis, caule ramoso, laxe paniculato *Phalangium ramosum* LOBEL. p. 47. in sterilibus clivis.

1209 PHALANGIUM foliis craſſulis, ſcapo unifloro. *Bulbocodcium alpinum juncifolium flore unico, intus albo, extus ſordide rubente* RAY *Syn. III.* p. 374. t. 17. f. 2. alpes editiores.

1210 PHALANGIUM longiſſime ſpicatum, filamentis latis, lanceolatis. *Ornithogalum* σαχυωδες RINEAULME p. 90. 93. in dumetis planitiei circa *Chambon* aquilejenſium, Genevæ &c.

1211 PHALANGIUM radice bulboſa, foliis latiſſimis obtuſis, ſpica pauciflora, ſtipulis minimis. *Hyacinthus* FUCHS. DODON. *coron.* p. 181. aquilejæ, Baſileæ.

1212 PHALANGIUM radice bulboſa, foliis latiſſimis obtuſis, ſpica multiflora, ſtipulis longitudine petioli †. *Parvulus Hyacinthus ſtellaris vernus* LOBEL *Adverſ. II.* p. 486. Circa Bernam.

1213 PHALANGIUM radice bulboſa, ſtipulis maximis, hirſutis, floribus umbellatis, petiolis unifloris. *Ornithogalum* πυρροχιτων RENEAULME. p. 90. 91. in pratis planitiei, ut in alpes aſcendat.

1214 PHALANGIUM radice bulboſa, ſtipulis maximis hirſutis, floribus umbellatis, petiolis multifloris. *Ornithogalum pannonicum minus luteo flore* CLUS *pann.* p. 190. 391. Baſileæ.

1215 ORNITHOGALUM ſtipulis maximis, petiolis lateralibus longiſſimis. *Ornithogalum* ἡλιοχαρμος RINEAULME p. 87. 88. in aquilejenſibus abunde & Baſileæ.

1216 ORNITHOGALUM floribus ſpicatis, ſeneſcentibus pendulis, filamentis ſtaminum alternis majoribus, bicornibus. *Ornithogalum neapolitanum* CLUS *append. alt.* Circa Bernam, Genevam.

VIII. III. FLORIBUS ADGREGATIS.

1217 ALLIUM radice ambeunte tunicata, foliis gramineis, ſpica ſphærica, ſtaminibus alterne trifidis. *Porrum* CAMER. *epit.* p. 321. in vineis.

1218 ALLIUM radice ſobolifera, foliis gramineis, ſpica ſphærica, ſtaminibus alterne trifidis. *Scorodo-*

praſum

Chalangium, Ornithogalum — Allium

praſum latifolium ſpontaneum italicum, floribus veteres ſuave purpureis odoratis MICHELI t. 24. in Baſileæ inet.

1219 ALLIUM radice multiplici, foliis gramineis, ſpica ſphærica, ſtaminibus alterne trifidis. *Allium ſ. Moly montanum V.* CLUS. *pann.* p. 216. 218. in Helvetia rarius, Genevæ indicatur & Baſileæ.

1220 ALLIUM radice gemella, foliis fiſtuloſis, capite ſphærico, ſtaminibus alterne trifidis. *Allium ſ. Moly juncifolium, capite ſphærico, flore purpureo* C. B. II. p. 563. in rupibus apricis.

1221 ALLIUM radice multiplici, foliis fiſtuloſis, capite ſphærico, bulbifero, ſtaminibus alterne trifidis. *Allium ſylveſtre tenuifolium* LOBEL. p. 156. in agris planitiei.

1222 ALLIUM foliis ciliatis, umbella bulbifera, ſtaminibus alterne trifidis, ad RUPP. t. 2. *Allium ſ. Moly montanum latifolium* CLUS. *pann.* p. 212. 213. Circa Baſileam non frequens.

1223 ALLIUM bulbo ſimplici, foliis fiſtuloſis, ſpatha bicorni, umbella bulbifera *de allio* n. 26. cum icone. *Allium ſ. Moly montanum IIII.* CLUS. *pann.* p. 213. 215. *Badæ*, *Michelfeldæ* &c.

1224 ALLIUM bulbo ſobolifero, foliis ſucculentis, ſpatha bicorni, umbella bulbifera *de allio* n. 27. cum icone. Frequens in dumetis calidiorum regionum, inque muris.

1225 ALLIUM radice duplici, foliis ſucculentis, ſpatha bicorni, umbellæ radiis pendulis, *de allio* n. 25. cum ic. *Allium montanum bicorne, floribus triquetris purpureis pediculis longis & reflexis* SEGUIER II. p. 70. Circa *Neuenſtatt*, *Pfeferz*, & in ſylva *Sauſeulaz* ſupra Bex.

1226 ALLIUM radice multiplici, foliis radicalibus teretibus, ſcapi longitudine, floribus umbellatis cylindricis. *Allium montanum ſphærocephalon purpureum* SCHEUCHZER. it. I. p. 24. t. 3. f. 2. alpina etiam M. *Dolaz*.

1227 ALLIUM radice ſeneſcente lignoſa, transverſa, foliis radicalibus gramineis, floribus umbellatis, *α*, minus, petræum. *Allii forte genus ſcorodopraſon*

prason alterum I. B. II. p. 564. *Allium petræum umbelliferum* I. B. II. p. 564.

β. Pratense majus. *Allium umbelliferum pratense* I. B. p. 564. Prius Seduni, Badæ, alterum in pratis udis aquilejensium.

1228 ALLIUM foliis radicalibus petiolatis, ovato lanceolatis, floribus umbellatis. *Allium ursinum* CAMER. *epit.* p. 330. in sepibus.

1229 ALLIUM radice oblonga, reticulo obducta, foliis ovato lanceolatis, umbella sphærica. *Allium alpinum* I. B. II. p. 566. alpina, etiam montana.

IV. FLORE CAMPANIFORMI.

1230 HEMEROCALLIS floribus spicatis secundis *Phalangium allobrogicum majus* CLUS. *append. alt.* Prata alpina.

1230 * HEMEROCALLIS foliis ensiformibus, scapo paucifloro, petiolis lineatis. *Lilio asphodelus phœniceus* LOBEL. ic. p. 93. Inter *les Posses & Fenallet.*

1231 LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis, intus glabris LINN. *Lilium candidum* DODON. *coron.* p. 121. 122. *Am Schloßberge zu Neuenstatt.*

1232 LILIUM caule folioso, foliis sulcatis, floribus campanulatis, extus floccosis. *Hemerocallis* CAMER. *epit.* p. 616. in Rhætia & descensu M. *Cheville.*

1233 LILIUM foliis verticillatis, floribus pendulis revolutis. *Martagon* CAMER. *epit.* p. 617. In sylvis submontanis.

1234 ERYTHRONIUM LINN. *Dens Caninus* DODON. *purg.* p. 789. Prope Genevam.

1235 FRITILLARIA caule paucifloro, foliis caulinis gramineis alternis. *Fritillaria dilutior* CLUS. *pann.* p. 170. Circa *Goudeba.*

1236 TULIPA flore subnutante, foliis lanceolatis LINN. In pratis.

V. BACCIFERÆ.

1237 UVULARIA foliis amplexicaulibus. *Polygonatum latifolium ramosum* CLUS. *pann.* p. 266. 267. in sub.

Hemerocallis, Lilium, Erythronium, Fritillaria, Tulipa — Uvularia, Ruscus, Asparagus, Unifolium, Polygonatum — Hyacinthus —

ſubalpinis aquilejenſibus, Valeſiacis, etiam in montanis.

1238 RUSCUS foliis ovato lanceolatis, pungentibus, petiolis breviſſimis vaginoſis. *Bruſcus vel Ruſcus* BLAKWELL t. 155. in rupibus aquilejenſibus, trans alpes.

1239 ASPARAGUS foliis filiformibus ſtipulatis. *Aſparagus* CAMER. p. 138. in Valeſia inf.

1240 UNIFOLIUM DODON. *Coron.* p. 138. in ſylvis abiegnis.

1241 POLYGONATUM ſcapo diphyllo, floribus ſpicatis, nutantibus, campaniformibus. *Lilium convallium* CAMER. *epit.* p. 618. in dumetis & nemoribus.

1242 POLYGONATUM caule ſimplici, anguloſo, cernuo, foliis ovato lanceolatis, rigidis, alis unifloris. *Polygonatum flore odoro* CLUS. *pann.* p. 263. 264. in rupibus apricis ſubalpinis & ſubmontanis.

1243 POLYGONATUM caule ſimplici cernuo, foliis ovato lanceolatis, petiolis multifloris. *Polygonatum* DODON. *purg.* p. 77. in ſepibus & dumetis.

1244 POLYGONATUM caule ſimplici erecto, foliis ellipticis & verticillatis. Icon OEDERI t. 56. in ſubalpinis & montanis.

VI. FLORE TUBULOSO.

1245 HYACINTHUS foliis carinatis, ſpica ovata, floribus globoſis. *Hyacinthus recentiorum primus.* DODON. *coron.* p. 176. in vineis.

1246 HYACINTHUS foliis gramineis, ſpica ovata, floribus globoſis, fecundis. *Hyacinthus botryoides vernus minor latifolius cæruleus inodorus* I. B. II. p. 582. Bernæ ſuperius in prato *Rappenthal.*

1247 HYACINTUS ſpica longiſſima, floribus ſupremis ſterilibus erectis, inferioribus fecundis patulis. *Hyacinthus recentiorum tertius* DODON. *coron,* p. 178. in pratis & agris aquilejenſibus.

1248 HYACINTHUS floribus tubuloſis, baſi globoſis, apice ſexpartito revoluto. *Hyacinthus non ſcriptus* DODON. *coron.* p. 172. Rarior circa Roche, Moutru.

VII. I. FLORE FRUCTUI INNATO.

I. HEXASTEMONES.

1249 AGAVE ſcapo arboreo ramoſo. *Aloë americana* Trew. lib. propr. ad pagum *Gandri* haud longe *Lugano.*

1250 NARCISSUS uniflorus, foliis enſiformibus, ſcypho breviſſimo. *Narciſſus medio purpureus* Dodon. *coron.* p. 189. Subalpina vallis *Geſſenai* deorſum pene ad *Blonai & Villeneuve.*

1251 NARCISSUS foliis junceis carinatis, ſcapo unifloro, ſcypho ſexies emarginato. *Narciſſus junci foliis I. amplo calyce* Clus. p. 158. *à la Gardelle* prope Genevam.

1252 NARCISSUS foliis enſiformibus, ſcapo unifloro, ſcypho undulato, ſerrato, petalis æquali. *Narciſſus luteus ſylveſtris* Dodon. *coron.* p. 198. Bernæ in pratis.

1253 GALANTHUS uniflorus, petalis ſubæqualibus. *Leucojum bulboſum hexaphyllon* Dodon. *coron.* p. 202. in pratis & ſepibus umbroſis.

1254 GALANTHUS uniflorus petalis alternis cordatis, brevioribus. *Leucojum bulboſum triphyllon* Dodon. *coron.* p. 200. in pratis Bernæ, Aquilejæ.

1255 COLCHICUM flore folia longe præcedente, petalis ovatis. *Colchicum* Dodon. *purg.* p. 371. in pratis.

1256 COLCHICUM foliis florem adtingentibus, petalis linearibus. *Colchicum montanum* Clus. *hiſp.* p. 266. circa *Roche* in pratis.

II. TRISTEMONES.

1257 CROCUS tuba breviſſime trifida. *Crocus vernus latifolius albus, verſicolore flore* Clus. *hiſt.* p. 214. in ſubalpinis & montanis.

1257* CROCUS tuba trifida. *Crocus vernus latifolius flavo vario colore I.* Clus. p. 205. in Abbatiscellanis & Glaronenſibus alpibus.

—Agave, Narcissus, Galanthus, Colchicum—Crocus
Iris—Gladiolus—

1258 IRIS foliis enſiformibus diſtichis, petalis reflexis, barbatis, tubalium arcu obtuſo. *Iris ſylveſtris major* CAMER. *epit.* p. 2. in muris & rupibus vinetorum.

1259 IRIS foliis linearibus, caule ſubnudo, petalis reflexis imberbibus, venoſis, tubalium arcu acuminato. *Iris anguſtifolia media* ſ. *varia* CLUS. *pann.* p. 252. circa Tigurum.

1260 IRIS caule inflexo, foliis enſiformibus, petalis erectis minimis, reflexis imberbibus. *Acorum falſum* CAMER. *epit.* p. 6. in foſſis aquoſis.

IX. FLORE DIFFORMI.

1261 GLADIOLUS foliis enſiformibus, floribus diſtantibus. *Gladiolus* DODON. *coron.* p. 162. in M. *Zurichberg* agris.

I. I. X. SATYRIA.

1262 ORCHIS bulbo unico, ſubrotundo, labello cruciformi t. 22. *Monorchis* MICHELI p. 30. t. 26. in ſubalpinis & montanis pratis, urbisque vallo.

1263 ORCHIS radicibus ſubrotundis, labello ovato, utrinque denticulo notato t. 22. *Chamæorchis alpina gramineo folio* C. B. *prodr.* p. 29. alpium editarum.

1264 ORCHIS radicibus ſubrotundis, ſpica longa, flore inermi, labello peranguſto, quadrifido t. 23. *Orchis anthropophora oreades* COLUMN. *ecphraſ.* p. 318. 320. in apricis pratis calidiorum.

1265 ORCHIS radicibus ſubrotundis, labello ſericeo biſulco, brachiolis brevibus ſubulatis t. 24. *Orchis ſerapias tertia* DODON. *coron.* p. 222. prata aprica. Muſciflora.

1266 ORCHIS radicibus ſubrotundis, labello holoſericeo emarginato, appendiculato t. 24. *Orchis referens fucum* RIVIN. *hexap. irreg.* t. 13. in Helvetiæ pratis frequens.

1267 ORCHIS radicibus ſubrotundis, petalis galeæ conglutinatis, longiſſime roſtratis, labello trilobato,

bato, ovato lanceolato. *Orchis macrophylla* COLUMN. *ecphras.* p. 321. 322. prope *Dubino* vallis Tellinæ.

1268 ORCHIS radicibus subrotundis, labello longissimo, tripartito, plicato t. 25. *Orchis barbata fœtida* RIVIN. t. 18. passim in agro aventico. Scaphusii.

1269 ORCHIS radicibus palmatis, galea conivente, labello trisulco, calcare brevissimo t. 26. *Orchis palmata flore galericulato dilute viridi* LOBEL. p. 182. ic. 59. in subalpinis & montanis.

1270 ORCHIS radicibus confertis, teretibus, calcare brevissimo, labello trifido t. 26. *Pseudorchis alpina flore herbaceo* MICHELI t. 26. alpina & montana.

1271 ORCHIS radicibus palmatis, spica densissima, flore resupinato, calcare brevissimo t. 27. *Palma Christi minor* CAMER. *epit.* p. 627. alpina & montana.

1272 ORCHIS radicibus subrotundis, spica densissima, petalis exterioribus aristatis t. 27. *Orchis rotundus Dalech.* LUGD. p. 1556. alpina, subalpina & montana.

1273 ORCHIS radicibus subrotundis, labello quadrifido, calcare brevissimo t. 28. *Orchis Pannonica IV.* CLUS. *pann.* p. 236. 238. prata.

1274 ORCHIS radicibus palmatis, labello obtuse trifido, concolore, calcare germine breviori t. 29. *Orchis palmata angustifolia minor odoratissima* C. B. *prodr.* alpina, etiam Basileæ nascitur.

1275 ORCHIS radicibus subrotundis, spica brevissima, labello breviter quadrifido, circumserrato, punctato t. 30. ad RUPP. t. 6. *Orchis militaris* RIVIN. t. 15. Basileæ, nuper non lecta.

1276 ORCHIS radicibus subrotundis, spica longa, labello quadrifido, brachiolis angustis, crusculis latis, serratis t. 31. *Orchis militaris major* RIVIN. t. 16. circa Bernam, Tigurum &c. ad oras sylvarum.

1277 ORCHIS radicibus subrotundis, spica conica, labello quadrifido, brachiolis & pectore perangu-

ſtis t. 28. *Orchis maſcula* Rivin. t. 15. Bernæ vulgatiſſima.

1278 ORCHIS radicibus palmatis, caule ſolido, labello trifido, ſerrato, medio ſegmento acuminato t. 32. *Palmata maculata & non maculata* Rivin. t. 8. in pratis clivorum.

1279 ORCHIS radicibus palmatis, caule fiſtuloſo, bracteis maximis, labello trifido, ſerrato, medio ſegmento obtuſo t. 32. in pratis udis.

1280 ORCHIS radicibus palmatis, bracteis coloratis, labello circumſerrato, trilobato, lobo medio emarginato. *Orchis palmata lutea labio floris maculato* Seguier. *ſuppl.* p. 248. t. 8. f. 5. in M. *Joux verte*, adque alpes Griſeas.

1281 ORCHIS radicibus ſubrotundis, petalis galeæ lineatis, labello trifido, integerrimo t. 30. † *Orchis præcox alba barba luteola* Rupp. *à la Joux verte*, & paſſim in ſubalpinis.

1282 ORCHIS radicibus ſubrotundis, galeæ petalis lineatis, labello trifido, crenato, medio ſegmento emarginato t. 33. *Orchis morio femina, calcare extuberante & bifariam diviſo* Seguier. p. 126. t. 15. f. 8. in brevi gramine.

1283 ORCHIS radicibus ſubrotundis, petalis lateralibus reflexis, labello trifido, ſegmento medio longiori, bifido t. 33. *Orchis folio Gladioli flore magno roſeo* Rivin. t. 21. vulgo in pratis & ad vias.

1284 ORCHIS radicibus ſubrotundis, galea conivente, labello trifido reflexo t. 34. *Orchis flore parvo viridi purpureo* Rivin. t. 20. in Valeſia inf. & cis *Echarpigny*.

1285 ORCHIS radicibus oblongis, labello lineari t. 35. *Satyrium flore albo* Rivin. t. 12. ad ſylvularum oras.

1286 ORCHIS radicibus ſubrotundis, ſpica denſa, calcare longiſſimo, labello bicorni, æqualiter tripartito t. 35. *Orchis flore conglomerato* Rivin. t. 14. ſubalpina & montana.

1287 ORCHIS radicibus palmatis, calcare longiſſimo, labello unicolore, obtuſe trifido t. 29. *Palmata anguſti-*

angustifolia non maculata Rivin. t. 11. frequens in pratis & sylvis.

1288 EPIPACTIS aphylla, calcare longo, labello ovato lanceolato t. 36. *Limodorum Austriacum* Clus. *pannon.* p. 241. in aquilejensibus & submontanis.

1289 EPIPACTIS caule aphyllo, flore supinato, labello ovato lanceolato, calcare ovato turgido. *Epipogum* Gmelin. *flor.* t. 2. f. 2. p. 12. in sylva *Sauffeullaz*, aquilejensium.

1290 EPIPACTIS aphylla, flore inermi, labello bicorni t. 37. *Nidus* Rivin. t. 3. in sylvis opacis, foliis stratis putrescentibus.

1291 EPIPACTIS foliis binis ovatis, labello bifido t. 37. *Bifolium* Rivin. t. 7. in pomariis & nemoribus.

1292 EPIPACTIS foliis binis, cordatis, labello bifido, postice bidentato t. 22. f. 4. *Ophrys foliis cordatis* Linn. Gagnebin *Act. Helv.* T. II. p. 70. in subalpinis aquilejensibus, & montanis udis & umbrosis.

1293 EPIPACTIS folio unico, amplexicauli, spica prolixa multiflora t. 36. *Ophrys monophyllos bulbosa* Loesel. p. 180. ic. 17. in adscensu M. *Fronalp.*

1294 EPIPACTIS bulbis cylindricis, spica spirali, labello crenulato t. 38. *Orchiastrum autumnale pratense, spirale, album, odoratum* Micheli t. 30. in udis pratis Bernæ, Aquilejæ &c.

1295 EPIPACTIS foliis petiolatis, ovato lanceolatis, floribus tetrapetalis hirsutis t. 22. *Orchioides* Trew. *Comm. Lit. Nor.* 1736. p. 409. t. 6. f. 2. in pinetis siccis.

1296 EPIPACTIS foliis ensiformibus, caulinis, floribus pendulis, labello obtuso, oris plicatis t. 39. *Helleborine* Rivin. t. 3. in pratis udis.

1297 EPIPACTIS foliis amplexicaulibus, ovato lanceolatis, labello lanceolato t. 40. *Helleborines recentiorum genus II.* Clus. *pann.* p. 275. & *III.* p. 276. in sylvis abunde.

1298 EPIPACTIS caule paucifloro, lineis obtusi labelli levibus t. 41. *Helleborine alba barba luteola* Rivin.

Rivin t. 4. & *β. Helleborine flore albo* Ej. t. 5. in sylvis non rara.

1299 EPIPACTIS caule paucifloro, lineis acuti l belli undulatis t. 42. *Damasonium flore roseo* Rivin. t. 6. in sylvis.

1300 CALCEOLUS radicibus fibrosis, foliis ovato lanceolatis t. 43. *Pseudodamasonium* Clus. *pann.* p. 271. in sylvis circa Bernam, in valle *Ormond* &c.

1301 CORALLORHIZA t. 44. *Orchis suecorum radice coralloide flore albo* Rudbek *Elys. II.* p. 234. f. 16. in sylvis abiegnis umbrosis Aquilejensium, Neocomensium &c.

I. I. XI. SPATHACEÆ.

1302 ARUM foliis sagittatis, spatha recta, clava cylindrica. *Arum* Dodon. *purg.* p. 27. in sepibus & dumetis.

I. II. APETALÆ.

I. GRAMINIBUS ADFINES.

I. TRIGLUMES.

1303 SPARGANIUM caule foliisque erectis. *Sparganium* Camer. *epit.* p. 732. & *β. Sparganium non ramosum* Tabern. p. 247. in fossis.

1304 SPARGANIUM foliis planis, mollibus, decumbentibus. *Sparganium minimum* Raj. *syn. III.* p. 437. in lacubus & fossis rarius.

1305 TYPHA clava unica. *Typha* Camerar. *epit.* p. 607. in inundatis.

1306 TYPHA clava mascula a femina distincta. *Typha palustris media* I. B. II. p. 540. & *Typha minor* I. B. &c. in Rhodani in lacum influxu, in fl. *Arve.*

II. SEX.

II. SEXGLUMES.

1307 ACORUS. *Acorum* CAMER. *epit.* p. 5. passim in stagnis.

1308 TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublinearibus *Gramen junceum spicatum* TABERN. p. 224. in udis gramineis.

1309 VALISNERIA LINN. *Valisneria &c.* MICHELI p. 12. & *Valisnerioides* ib. suspecta civis.

1310 SCHEUCHZERIA LINN. *flor. Lapon.* t. 10. f. 1. in submontanis paludibus, nuper non reperta.

1311 JUNCUS caule nudo, foliis teretibus striatis, panicula laterali sparsa. *Juncus* DODON. *cereal.* p. 265. ad vias in udis.

1312 JUNCUS caule nudo, foliis teretibus mollibus, panicula conglomerata. *Juncus* CAMERAR. *epit.* p. 780. similibus locis.

1313 JUNCUS caule nudo, foliis teretibus mollibus, panicula laterali pauciflora. *Juncus panicula sparsa minor* C. B. *theatr.* p. 183. alpina.

1314 JUNCUS caule bifolio, foliis teretibus, floribus terminantibus ternis. *Juncus exiguus montanus mucrone carens* C. B. *theatr.* p. 183. alpinus.

1315 JUNCUS acumine reflexo trifidus C. B. *theatr.* p. 185. alpinus.

1316 JUNCUS caule unifolio, petiolis bifloris, floribus umbellatis. *Juncoides alpinum foliis junci glomeratis atrofuscis* SCHEUCHZER. *Agrostogr.* p. 327 t. 2. f. 3. alpina edita.

1317 JUNCUS rigidus, panicula spicata, floribus cartilagineis. *Gramen junceum folio & spica junci* C. B. *theatr.* p. 78. in paludibus M. *Gotthard.*

1318 JUNCUS foliis carinatis, panicula sparsa, fructu globoso. *Juncus parvus cum pericarpiis rotundis* I. B. II. p. 522. passim in udis.

1319 JUNCUS caule brachiato, foliis setaceis, floribus solitariis ad ramum sessilibus. *Gramen parvum bufonium* TABERN. p. 225. in udis.

1320 JUNCUS caule brachiato, foliis setaceis, floribus fasciculatis, ad ramos sessilibus. *Juncoides calyculis*

Sparganium, Typha, — Acorus, Triglochin, Valisneria, Scheuchzeria
Juncus

culis paleaceis glomeratis folio varians SCHEUCHZER. p. 330. t. 7. f. 10. in montanis rarius.

1321 JUNCUS foliis ſeſſilibus articulatis, panicula ſimplici, glumis ariſtatis †. *Gramen junceum folio articulato alpinum* SCHEUCHZER. *Agroſtog.* p. 333 334. alpina.

1322 JUNCUS foliis articulatis, compreſſis, panicula ſemel ramoſa. *Gramen junceum folio articulato aquaticum* C. B. SCHEUCHZER. p. 341. in foſſis & udis.

1323 JUNCUS foliis articulatis, teretibus, panicula repetito ramoſa †. *Gramen junceum folio articulato aquaticum* C. B. SCHEUCHZER. p. 334. in foſſis aquilejenſibus &c.

1324 JUNCUS foliis gramineis hirſutis, floribus paniculatis, faſciculatis. *Gramen Luzulæ maximum* I. B. II. p. 493. in ſylvis montanis & ſubalpinis.

1325 JUNCUS foliis gramineis hirſutis, floribus umbellatis, ſolitariis, petiolatis, ariſtatis. *Gramen rore lucidum nemorenſe* ſ. *Luzulæ* I. B. II. p. 492. vulgo in ſylvis.

1326 JUNCUS foliis gramineis, panicula laxa, petalis mollibus, breviter ariſtatis †. *Gramen hirſutum nemoroſum alpinum anguſtifolium, paniculis obſcure rufeſcentibus* I. I. SCHEUCHZER. *It. VI.* p. 458. alpina.

1327 JUNCUS foliis gramineis, floribus umbellatis, petalis æqualibus. *Gramen hirſutum anguſtifolium majus* C. B. *theatr.* pt 105. in ſylvis.

1328 JUNCUS foliis gramineis, paniculis umbellatis, petalis interioribus duplo longioribus. *Gramen Luzulæ affine flore albo* I. B. II. p. 407. in pratis ſubalpinis.

1329 JUNCUS foliis gramineis glabris, panicula nitente, floribus obtuſis †. *Juncoides alpinum latifolium glabrum, panicula ſublutea ſplendente* I. SCHEUCHZER. *Agroſtogr.* p. 314. cum ic. alpina edita.

1330 JUNCUS foliis gramineis hirſutis, ſpicis petiolatis, nutantibus, petalis ariſtatis. *Gramen hirſutum capitulis Pſyllii* SCHEUCHZER. p. 310. ad vias, in ſylvis.

III. UNIGLUMES.

1331 ERIOPHORUM foliis planis, ſpicis pendulis. *Gramen tomentoſum panicula ſparſa* C. B. *theatr.* p. 60. in pratis udis.

1332 ERIOPHORUM caule terete, ſpica erecta ovata. *Juncus alpinus capitulo lanuginoſo ſ. Schœnolaguros* SCHEUCHZER. p. 302. t. 7. & *Juncus alpinus capitulo tomentoſo majori* EJ. p. 304. t. 7. Iſte in alpinis, ille in torfaceis.

1333 ERIOPHORUM caule foliisque triquetris, ſpica pauciflora. *Linagroſtis juncea alpina, capitulo parvo, tomento rariore* SCHEUCHZER. p. 305. t. 8. alpina & montana, torfaceorum.

1334 SCIRPUS caule terete, aphyllo, ſpica pauciflora, acuminata, calycinæ glumæ longitudine. *Scirpus montanus capitulo breviore* SCHEUCHZER. p. 369 in ſubalpinis & montanis udis.

1335 SCIRPUS caule terete, ſpica nuda, pauciflora, glumis calycinis longiore. *Scirpus minimus capitulo bveviore & craſſiori fuſco* SCHEUCHZER. p. 366. *Scirpus montanus ſpica breviore ſquamoſa ſpadicea* EJ. p. 364. ad ripas fluviorum ſabuloſas.

1336 SCIRPUS caule terete, ſpica terete pauciflora. *Gramen cyperoides capitulo ſimplici* LOESEL. p. 131. ic. 36. in paluſtribus.

1337 SCIRPUS caule terete, panicula laterali, ramoſa, locuſtis ovatis. *Scirpus paluſtris altiſſimus*, SCZEUCHZER. p. 354. in lacubus & ſtagnis.

1338 SCIRPUS caule triquetro, panicula laterali ramoſa, locuſtis ovatis. *Juncus acutus maritimus, caule triangulo* C. B. *theatr.* p. 175. in paluſtribus aquilejenſibus.

1339 SCIRPUS caule triquetro, panicula folioſa, ramoſa, locuſtis ovatis, nutantibus, glumis dentatis ariſtatis. *Gramen panicula ſparſa ex ſpicis longioribus tenerioribus teretibus compoſita* SCHEUCHZER p. 398. circa *Roehe & Michelfeldæ.*

1340 SCIRPUS planifolius, panicula ramoſiſſima, locuſtis ovatis. *Cyperus gramineus* SCHEUCHZER. p. 393. in aquoſis.

— Eriophorum, Scirpus, Mariscus, Cyperus

1341 SCIRPUS foliis ſetaceis, panicula plana, locuſtis teretibus. *Gramen cyperoides paluſtre leucanthemon* SCHEUCHZER. p. 403. in torfaceis.

1342 SCIRPUS planifolius ſpica terminante diſticha. *Gramen cyperoides, ſpica compreſſa diſticha*, SCHEUCHZER. p. 490. in aquoſis, alpinis etiam & montanis.

1343 MARISCUS panicula ramoſa, foliorum oris dorſoque ſerratis. *Pſeudocyperus paluſtris, foliis & carina ſerratis* SCHEUCHZER. p. 375. in Aquilejenſibus udis.

1344 MARISCUS folio gramineo, culmo tereti, capitulis lateralibus, ternis, ovatis †. ad ſummum lacum *Lemanum*, in foſſis. ſi vere differt.

1345 MARISCUS ſetaceus, capitulis lateralibus perpaucis. *Scirpus omnium minimus capitulo breviore*, SCHEUCHZER. p. 358. paſſim ad ſtagna planitiei.

1346 MARISCUS foliis ſetaceis, mollibus, ſpica nuda pauciflora. *Juncellus inutilis* ſ. *Chamæſchœnus* C. B. *theatr*. p. 183. in Aquilejenſium udis & ad ſtagna planitiei.

1347 CYPERUS ſpicis conglomeratis, calyce multifolio. *Junco adfinis capitulo glomerato nigricante*, SCHEUCHZER. p. 349. in torfaceis frequens.

1348 CYPERUS umbella trifolia, ſpicis ſeſſilibus, umbellatis, glumis obtuſis. *Cyperus minimus panicula ſparſa flaveſcente* SCHEUCHZER. p. 485. in aquoſis & ad foſſas.

1349 CYPERUS umbella trifolia, ſpicis petiolatis congeſtis, glumis ovato lanceolatis. *Cyperus minimus panicula ſparſa nigricante*, SCHEUCHZER. p. 389. ſimilibus locis, aliquanto rarior. circa *Roche*.

1350 CAREX ſpica unica, terete, feminibus roſtratis. *Gramen cyperoides ſpica ſimplici caſſa* SCHEUCHZER. p. 497. in paluſtribus & torfaceis.

1351 CAREX ſpica unica, ſubrotunda, feminibus inflatis. *Cyperoides parvum &c.* MICHELI p. 56. t. 32. f. 2. paſſim in paludoſis.

1352 CAREX ſpica unica, capſulis hirſutis rotundis †. Baſileæ, & circa *Ferriéres*.

1353

1353 CAREX culmo foliisque duris, curvulis, ſpica unica, glumis ariſtatis †. alpium Valeſiacarum editiorum.

1354 CAREX ſpica unica ſubrotunda, glumis ovatis breviſſime ariſtatis †. *Gramen cyperoides junci folium ſpica ſimplici in ſummitate culmi atrofuſca* SCHEUCHZER. p. 492. alpium editiorum.

1355 CAREX fœtidus, ſpica fuſca conglomerata †. *Gramen enode alpinum ſpica parva ſubrotunda ferruginea* EJUSD. p. 495. t. 4. alpium editiorum.

1356 CAREX ſpica terminali tripartita †. An *Cyperoides alpinum tenuifolium ſpica brevi ferruginea*, EJUSD. p. 499. alpium editiorum.

1357 CAREX ſpicis androgynis, imis in ala prælongi folii ſeſſilibus, ſupremis nudis. *Cyperoides anguſtifolium ſpicis ſeſſilibus in foliorum alis* EJUSD. p. 483. in aquoſis & ſylvoſis.

1358 CAREX ſpicis diſtichis, teretibus, repandis. *Gramen cyperoides elegans ſpica compoſita aſperiore* HIST. OXON. III. p. 245. alpina & montana, etiam planitiei.

1359 CAREX ſpicis ovatis, imis remotis, ſupremis congeſtis. *Cyperoides polyſtachyon ſpicis laxis paniculam veluti componentibus*, SCHEUCHZER. p. 487. alpina.

1360 CAREX ſpicis ovatis, alternis, ſupremis ſe contingentibus. *Gramen cyperoides ſpicis erectis, divuſis* LOESEL. ic. 32. in paludoſis infrequens.

1361 CAREX ſpicis nudis ſubrotundis, diſtinctis, in ſummo caule congeſtis. *Gramen cyperoides in M. Balon ſpica diviſa* I. B. II. p. 417. in udis frequens.

1362 CAREX ſpicis in ſummo caule congeſtis, imis foliolo inſidentibus. *Gramini cyperoidi in M. Balon ſimile, ſpica totali ex pluribus ſpicis compoſita* PLUKNET. t. 34. f. 7. in udis planitiei.

1363 CAREX ſpicis ſtipula brevioribus, imis diſtinctis, ſuperioribus congeſtis. *Gramen cyperoides minus repens ſpica diviſa* LOESEL. p. 116. ic. 31. *Michelfeldæ*, *Ferrière &c.* in udis.

Carex

1364 CAREX ſpicis ſubrotundis, echinatis, ſupremis confluentibus, capſulis roſtratis bifidis. *Gramen cyperoides majus ſpica conpacta* C.B.*theatr.* p.84. in ſubudis.

1365 CAREX caule foliisque aſperis, ſpicis echinatis, ſubrotundis, ſupremis confluentibus. *Gramen nemoroſum, ſpicis parvis aſperis* C. B. *theatr.* p. 100. in ſylvis & ad vias.

1366 CAREX ſpicis ternis, echinatis, glumis lanceolatis, capſulæ mucrone ſimplici. *Gramen cyperoides minimum ſpica divulſa aculeata* SCHEUCHZER. p. 485. in paludoſis.

1367 CAREX ſpicis ternis, congeſtis, glumis ariſtatis †. in ſepibus gramineis.

1368 CAREX ſpica paniculata. *Cyperus alpinus inodorus longus, panicula inodora minus ſparſa*, SCHEUCHZER. *prodr.* t. 8. in aquoſis.

1369 CAREX ſpicis ovatis, petiolatis, congeſtis, ſeneſcendo nutantibus. *Cyperoides alpinum pulchrum foliis caryophyllæis, ſpicis atris & tumentibus*, EJUSD. p. 481. alpina.

1370 CAREX ſpica mare unica, fementinis plurimis, calycinis glumis maximis, culmo ſeneſcente proſtrato. *Cyperoides montanum humile, anguſtifolium, culmo veluti folioſo ſpicis obſeſſo* EJUSD. p. 407.

β. *Cyperoides longifolium, culmo pumilo veluti folioſo, ſpicis obſeſſo* p. 408. in rupibus ſubalpinis & montanis.

1371 CAREX ſpicis ſeſſilibus, approximatis, ovatis †. *Cyperoides alpinum foliis caryophyllæis, ſpicis brevibus ex nigricante & albido variis* EJUSD. p. 421. Alpes Rhæticæ.

1372 CAREX foliis caryophyllæis, ſpicis ſeſſilibus approximatis, paucifloris, capſulis ovatis ſubhirſutis †. *Cyperoides montanum foliis anguſtis, ſpica ſpadicea diviſa* EJUSD. p. 419. montana, etiam planities.

1373 CAREX anguſtifolius, ſpicis ſeſſilibus, teretibus, approximatis, capſulis hirſutis. *Cyperoides anguſtifolium montanum folliculis ſeminalibus villoſis* EJUSD. p. 423. in ſylvis.

1374

1374 CAREX ſpicis ſeſſilibus approximatis, breviſſimis, glumis lanceolatis †. alpina & montana.

1375 CAREX ſpicis femininis raris, marem adæquantibus, ima petiolata. *Gramen caryophyllatum nemoroſum ſpica multiplici* SCHEUCHZER. p.450. in ſylvis & dumetis.

1376 CAREX ſpicis femininis petiolatis raris, maſculam ſuperantibus. *Gramen caryophyllatum montanum ſpica varia* EJUSD. p. 458. in ſylvis.

1377 CAREX ſpicis femininis raris, petiolatis, teretibus, acutis, marem æquantibus. *Gramen ſpicatum anguſtifolium ſpica alba* EJUSD. p. 410. in ſylvis.

1378 CAREX ſpicis femininis ternis, erectis, petiolatis, folio inſidentibus, capſulis ovatis, breviter mucronatis †. *Cyperoides anguſtifolium ſpica ſpadiceo viridi minus, ſpicis longioribus* EJUSD. *It. VI.* p. 458. alpina Valeſiæ.

1379 CAREX ſpicis femininis petiolatis erectis, floribus remotis †. *Cyperoides hirſutum latifolium, ſpicis tenuioribus* EIUSD. p. 412. in monte *Zürichberg.*

1380 CAREX ſpicis femininis petiolatis, erectis, ovatis, echinatis. *Gramen paluſtre aculeatum ſpica breviore* EJUSD. p. 426. in udis.

1381 CAREX foliis ceſpitoſis, brevibus, ſpicis confertis, petiolis erectis brevibus, capſulis ovato triquetris †. *Cyperoides alpinum caryophyllatæ foliis ſpicis tenuibus e fuſco rufeſcentibus* EJUSD. p. 433 paſſim in apricis.

1382 CAREX ſpicis breviſſime petiolatis diſſitis. *Cyperoides ſpicis parvis longe diſtantibus* EJUSD. p. 431. in udis & torfaceis.

1383 CAREX culmo foliisque firmis erectis, ſpicis femininis quaternis, longe petiolatis, erectis †. *Michelfeldæ.*

1384 CAREX ſpicis ſeſſilibus approximatis, teretibus, folio inſidentibus †. *Cyperoides ſylvaticum anguſtifolium ſpicis parvis tenuibus ſpadiceo viridibus* SCHEUCHZER. p. 425. Baſileæ, Michelfeldæ, in M. *Uetliberg.*

1385

Carex

1384* CAREX ſpicis femininis ſeſſilibus, ima petiolata, glumis perangustis †. *Cyperoides ſpicis viridibus brevibus e ſquamis anguſtioribus compoſitum*, SCHEUCHZER. *Agreſt.* p. 435. M. *Uetliberg.*

1385 CAREX ſpica feminina infima radicali, capſulis triquetris elongatis †. Alpina, etiam montana.

1386 CAREX ſpica feminina infima radicali, capſulis ovatis †. *Cyperoides alpinum anguſtifolium, ſpicis ſeminiferis tenuibus fuſcovirentibus* SCHEUCHZER. p. 416. uda alpium Valeſiæ.

1387 CAREX ſpicis femininis ſeſſilibus ternis, capſulis ovato hirſutis †. *Cyperoides alpinum pumilum, ſpicis ſpadiceo viridibus brevioribus & craſſioribus* EJUSD. p. 428. alpina.

1388 CAREX foliis ceſpitoſis brevibus, ſpicis femininis paucifloris, ſuprema ſeſſili †. *Cyperoides alpinum anguſtifolium ſpicis laxis ſpadiceo viridibus* EJUSD. p. 411. alpina, etiam montana.

1389 CAREX ſpicis femininis binis, longe petiolatis, diſſitis, capſulis longe roſtratis bifidis. *Cyperoides alpinum ſpicis ſeminiferis tenuioribus atroſpadiceis* EJUSD. p. 415. alpina & montana.

1389* CAREX foliis caryophylleis, ſpica feminina unica binisve †. *Cyperoides alpinum pumilum caryophyllatæ foliis ad radicem confertis* EJUSD. H. S. In alpinis.

?1390 CAREX quæ Cyperoides anguſtifolium ſpica tenuiore EJUSD. p. 413. M. *Tſchiera.*

1391 CAREX ſpicis femininis ternis quaternisve, diſtichis, cernuis, capſulis longe mucronatis †. alpina.

1392 CAREX ſpicis femininis pendulis, capſulis ovatis compreſſis. *Cyperoides ſpica pendula breviore ſquamis ex ſpadiceo vel fuſco rutilante viridibus* SCHEUCHZER. p. 433. alpina & torfacea.

1393 CAREX ſpicis femininis pendulis, capſulis ovato conicis. *Cyperoides polyſtachyon flavicans, ſpicis brevibus prope ſummitatem caulis* EJUSD. p. 431. in montanis & alpinis.

1394 CAREX ſpicis femininis raris, pendulis, capſulis ovato conicis mucronatis. *Cyperoides alpinum*

ſpicis

spicis seminiferis pendulis binis in summo caule SEGUIER. *suppl.* p. 83. t. 3. f. 1. summarum alpium.

1395 CAREX spicis femininis pendulis, raris, prælongis, capsulis rostratis, bifidis †. *Cyperoides sylvarum tenuius spicatum* SCHEUCHZER. p. 518. in sylvis vulgo.

1396 CAEX spicis femininis pendulis longissimis, capsulis mucronatis ovatis †. *Cyperoides spica pendula longiore & angustiore* EJUSD. p.445. in sylvis.

1397 CAREX spicis femininis pendulis, asperis, capsulis longe aristatis, retroversis. *Cyperoides spica pendula breviore* EJUSD. p. 440. in udis.

1398 CAREX spica suprema mascula, secunda androgyna, femininis sessilibus, capsulis breviter bifurcatis †. *Cyperoides latifolium spica spadiceo viridi majus* EJUSD. p. 464. & *Cyperoides palustre angustifolium spicis habitioribus spadiceo viridibus* p. 452. in udis.

1399 CAREX spicis masculis duabus, femininis sessilibus, capsulis ellipticis obscure bifidis †. in udis.

1400 CAREX spicis masculis duabus, femininis sessilibus, capsulis ovatis, brevissime mucronatis. *Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis erectis sessilibus, ex seminibus confertis compositis* RAJ. *Syn. III.* p. 418. in pratis udis.

1401 CAREX spicis maribus una pluribusve, femininis erectis, teretibus, capsulis ampullatis, rostratis. *Cyperoides vesicarium spicis teretibus erectum majus* SCHEUCHZER. p. 476. & *medium* p. 474. & *minimum* p. 476. ad fluvios & in palustribus.

1402 CAREX spicis maribus ternis emarcidis, femininis longe petiolatis gracillimis †. *Cyperoides sylvarum spicis tenuibus e viridi albicantibus*, EJUSD. p. 454. in M. *Uetliberg.*

1403 CAREX caule foliis capsulisque hirsutis. *Cyperoides polystachyon lanuginosum* EJUSD. p. 478. in udis.

1404 CAREX spicis masculis ternis, femininis numerosis erectis, brevissime petiolatis, capsulis bicornibus.

Carex

bus. *Cyperoides latifolium ſpica rufa ſ. caule triangulo* SCHEUCHZER. p. 458. & *Cyperoides paluſtre latifolium ſpicis teretibus erectis ex terreo obſcure fuſcis* EJ. p. 465. in udis.

1405 CAREX ſpica mare unica, pluribusve, femininis petiolatis, erectis, capſulis raris, maximis, ovato triquetris bidentatis. *Gramen Cyperoides foliis caryophyllæis ſpicis ex rarioribus & tumidioribus granis compoſitis* PLUKNET. p. 178. t. 91. f. 7. in alpibus & montanis.

1406 CAREX ſpicis maribus ovatis, femininis, gracilibus, erectis, capſulis triquetro conicis. *Cyperoides nigroluteum vernum minus* SCHEUCHZER p. 460. videtur idem ſequenti.

1407 CAREX ſpicis maribus tribus, femininis tribus, capſulis numeroſis, breviter bifurcatis. *Gramen cyperoides anguſtifolium, ſpica ſpadiceo viridi minus* C. B. *theatr.* p. 84. & ipſum idem ſequenti.

1408 CAREX ſpicis maribus una pluribus, femininis pendulis, capſulis ovato triquetris confertis. *Cyperoides paluſtre, ſpicis purpuro ſpadiceis tenuibus pediculis inſidentibus* SCHEUCHZER. p. 467 vulgo ad vias.

1409 CAREX ſpicis maribus una pluribus, femininis teretibus, pendulis, capſulis conicis, roſtratis, bicornibus. *Cyperoides veſicarium ſpicis viridantibus vel ſubfuſcis* EJUSD. p. 470. in udis.

IV. BIGLUMES.

II. GRAMINA.

I. CALYCE NULLO.

1410 NARDUS ſpica ſetacea recta LINN. *Gramen ſpontaneum juncifolium* SCHEUCHZER. p. 90. in montanis & alpinis.

1411 HOMALOCENCHRUS. *Gramen miliaceum paluſtre ſerotinum paniculis ex locuſtis compreſſis compoſitis* MONTI *Prodr.* p. 51, ic. 58. ad aquas circa Baſileam, *Spietz.*

1412 PHOENIX ſpica laxa, locuſtis longe petiolatis quadrifloris, duobus floribus ſeſſilibus, duobus petiolatis. *Aegilops bromoides, ſpica purpuraſcente* SCHEUCHZER. p. 276. in tranſalpinis.

II. CALYCE UNIGLUMI.

1413 TRAGUS. *Gramen caninum maritimum, ſpica echinata* SCHEUCHZER. p. 76. in Valeſia inf.

1414 ANDROPOGON ſpicis villoſis ſeptenis, locuſtis bifloris, folliculis alternis ſeſſilibus. *Gramen dactylon ſpicis villoſis* C. B. SCHEUCHZER. p. 94. ad vias aridas.

1415 ANDROPOGON ſpicis geminis, locuſtis bifloris, folliculis alterne muticis. *Feſtuca juncea ſpica gemina* C.B.*theatr*.p.145. BURSER in Helvetia reperit.

1416 LOLIUM radice perenni, locuſtis octifloris contiguis. *Gramen loliacum anguſtiori folio & ſpica* C. B. SCHEUCHZER. ad vias.

β *Gramen loliaceum ſpica lata ex plurimis ſpicis duplici verſu diſpoſitis conſtante* EJUSD. p.29.t.2.

?1417 LOLIUM quod Gramen loliaceum locuſtis tereтiuſculis muticis EJUSD. p. 28. Tiguri.

1418 LOLIUM perenne locuſtis diſſitis quadrifloris. *Gramen loliaceum anguſtiori folio & ſpica, ſpinis partialibus rarioribus ab invicem remotis,* EJUSD. p. 26. in planitie.

1419 LOLIUM procumbens, ſpica diſticha, locuſtis teretibus trifloris. *Gramen loliaceum majus ſupinum ſpica multiplici* C. B. *Prodr*. p. 19. in Valeſia inferiori.

1420 LOLIUM annuum, locuſtis diſſitis. *Gramen loliaceum ſpica longiore* ſ. *Lolium Dioſcoridis* C. B. SCHEUCHZER. p. 31. inter ſegetes humidiores.

III. CALYCE BIGLUMI.

1421 SECALE glumarum ciliis ſcabris LINN. in Helvetia germanica princeps eſt ſeges.

1422 TRITICUM locuſtis imbricatis, quadrifloris, glabris, muticis. *Triticum* BLAKWELL. t.40. in Helvetia gallice loquente.

— Nardus, & Comalocenchrus, Phoenix — Tragus, Andropogon, Lolium — Secale, Triticum

1423 TRITICUM leviſſimum, glaucum, locuſtis quadrifloris, duobus floribus ariſtatis, duobus mucronatis †. ſeri incipit.

1424 TRITICUM floribus quaternis, duobus fecundis, glumis adhærentibus. *Zea dicoccos & major* C. B. *theatr.* p. 413.

1425 TRITICUM ſpica diſticha, floribus ternis, fertili unico, glumis tridentatis, florali ariſtato. *Zea Oriza dicta* ſ. *monococcos germanica* C. B. *theatr.* p. 415. in montanis.

1426 TRITICUM radicibus repentibus vaginoſis, foliis hirſutis, locuſtis quinquefloris. *Gramen caninum arvenſe* ſ. *Gramen Dioſcoridis* SCHEUCHZER. p. 5 ad ſepes.

1427 TRITICUM radicibus reptantibus vaginoſis, foliis hirſutis, locuſtis octifloris †. *Gramen latifolium ſpica triticea compacta* C. B. SCHEUCHZER. p. 7. ad ſepes.

1428 TRITICUM radice repente, culmo duro, foliis hirſutis, locuſtis quinquefloris. *Gramen tritici ſpica mutica ſimile anguſtifolium* C. B. SCHEUCHZER. p. 7. in apricis ſupra *Yvorne*, in Valeſia.

1429 TRITICUM radice fibroſa, foliis hirſutis, locuſtis quinquefloris ariſtatis. *Gramen caninum non repens elatius ſpica ariſtata* HIST. OXON. III. p. 177. Baſileæ, *à la Ferriére &c.*

1430 TRITICUM radice fibroſa, foliis anguſtiſſimis, locuſtis muticis, ovatis, obeſis. *Gramen loliaceum foliis & ſpicis tenuiſſimis* HIST. OXON. III. p. 182 circa *Wyl.*

1431 TRITICUM ſpicis diſtichis, locuſtis teretibus, hirſutis, ariſtatis, duodecimfloris. *Gramen loliaceum corniculatum* SCHEUCHZER. p. 35. locis ſylvoſis.

1432 TRITICUM locuſtis exiguis, hirſutis, teretibus, remotis, culmis floriferis gracilibus. *Gramen loliaceum corniculatum, ſpica partiali ſubhirſuta fragili* EJUSD. ſylvæ montanæ & ſubalpinæ.

1433 FESTUCA locuſtis teretibus, multifloris, glumis membranaceis breviter ariſtatis †. *Gramen ſparteum*

teum spica Brizæ paniculata BARRELIER. ic. 25. Basileæ, Bernæ.

1434 FESTUCA locustis teretibus muticis octifloris, flosculis alternis imperfectis. *Gramen montanum avenaceum locustis muticis tumentibus, non pilosis* SCHEUCHZER. p. 170. montana.

1435 FESTUCA foliis hirsutis latiusculis, locustis paniculatis, quinquefloris, glabris, aristatis †. *Gramen pratense paniculatum elatius, spica laxa heteromalla* EJUSD. p. 289. in pratis.

?1436 FESTUCA quæ Gramen alpinum latifolium, paniculis heteromallis EJUSD. p. 278. in humidis alpium Rhæticarum.

1437 FESTUCA foliis perangustis, panicula stricta, locustis distichis, aristatis, glabris, septifloris. *Gramen pratense panicula duriore laxa unam partem spectante* RAJ. SCHEUCHZER. p. 285. in pratis siccis.

1438 FESTUCA foliis radicalibus setaceis, caulinis latioribus, locustis septifloris †. *Gramen nemorosum foliis præter culmum junceis in culmo latioribus* SCHEUCHZER. *hort. sicc.* haud longe Tiguro.

1439 FESTUCA panicula stricta, locustis teretibus quadrifloris †. in M. *Tavejannaz.*

1440 FESTUCA foliis perangustis, locustis quinquefloris, teretibus, aristatis, oris membranaceis. *Gramen alpinum panicula duriore laxa locustis majoribus* SCHEUCHZER. p. 287. alpina & montana.

1441 FESTUCA foliis perangustis, panicula stricta, locustis teretibus hirsutis, longius aristatis †. alpina.

1442 FESTUCA foliis perangustis, panicula stricta, locustis quinquefloris subhirsutis. *Gramen foliolis junceis, brevibus, majus, radice nigra* C. B. SCHEUCHZER. p. 279.

β. *Gramen capillaceum locustis pennatis non aristatis* EJUSD. p. 276. in torfaceis.

γ. *Gramen montanum foliis capillaceis longioribus,*

 panicula

panicula heteromalla spadicea & veluti amethystina SCHEUCHZER. p. 276.

δ. *Gramen alpinum pratense panicula laxa locustis majoribus* var. pumila EJUSD. p. 288. Alpina.

β. β. *Gramen sparteum montanum spica spadicea, majus & minus* RAJ. *Syn. III.* p. 410. t. 22. f. 1.

& γ. β. *Gramen paniculatum sparteum alpinum, panicula angusta, spadiceo viridi, proliferum*, SCHEUCHZER. p. 213. t. 1. hæ alpinæ.

1443 FESTUCA foliis setaceis, panicula erecta, locustis glabris, longius aristatis. *Gramen festuceum myurum majori spica heteromalla* EJUSD. p. 294. Basileæ, Bernæ &c.

1444 FESTUCA locustis bifloris, mucronatis, confertim imbricatis, panicula spicata. *Gramen spica aristata subhirsutum* C. B. SCHEUCHZER. p. 167. ad vias siccas.

1445 FESTUCA locustis bifloris spicatis, calycibus glabris, floribus villosis †. *Gramen Valesiacum tenuifolium panicula spicata viridi argentea splendente* EJUSD. p. 169. ad agrorum margines in Valesia inferiori.

1446 SESLERIA locustis trifloris imbricatis, flore tricorni. *Gramen glumis variis* C. B. *theatr.* p. 158 SCHEUCHZER. p. 83. ad rupes, etiam in pratis.

1447 SESLERIA locustis quinquefloris, distichis, calyce bidentato †. summarum alpium.

1448 POA petiolis tenuissimis, locustis ovatis. *Gramen tremulum majus* C. B. SCHEUCHZER. p. 204. in pratis.

1449 POA petiolis tenerrimis, locustis triangularibus. *Gramen tremulum minus panicula parva* C. B. SCHEUCHZER. p. 205. non satis certa planta.

1450 POA locustis distichis decemfloris, calycibus acutis. *Gramen paniculis elegantissimis minimum*, C. B. SCHEUCHZER. p. 192. Villæ novæ, Basileæ.

& β. *Gramen paniculis elegantissimis majus, locustis purpureo spadiceis minoribus* EJUSD. p. 193.

1451 POA foliis latis, asperis, locustis teretibus, muticis, glumarum oris membranaceis. *Gramen loliaceum*,

liaceum, *panicula multiplici & spicata* SCHEUCHZER. p. 200. ad vias.

1452 POA locustis distichis muticis spicatis †. ad vias.

1453 POA locustis teretibus multifloris, glumis floralibus exterioribus truncatis, interioribus bifidis. *Gramen aquaticum fluitans multiplici spica* C. B. SCHEUCHZER. p. 194. in fossis.

1454 POA altissima, foliis latissimis, panicula amplissima, locustis distichis multifloris. *Gramen palustre paniculatum, altissimum* C. B. SCHEUCHZER. p. 191. passim in fossis aqua plenis.

1455 POA culmo compresso, declinato, locustis distichis, sexfloris. *Gramen paniculatum, radice repente, culmo compresso, locustis distichis pulchellis* SCHEUCHZER. p. 198. in muris.

1456 POA latifolia, culmo debili, locustis quadrifloris, calycis glumis æqualibus, floralium dorso sericeo. *Gramen alpinum majus panicula speciosa variegata* SCHEUCHZER. p. 186.

& β. *Gramen pratense paniculatum minus rubrum* EJUSD. p. 190. t. 3.

& β. β. *Gramen alpinum latifolium panicula laxa foliacea, foliolis in panicula paucioribus & mage crispis* EJUSD. *prodr.* p. 22. t. 2. alpina, etiam montana.

1457 POA caule erecto, panicula rara, locustis trifloris, basi dorsoque villosis †. *Gramen alpinum paniculatum panicula spadiceo viridi elegans* EJUSD. p. 163. t. 4. prata altiora alpium.

1458 POA panicula sparsa, locustis quadrifloris, folliculis villosis †. alpina.

1459 POA juncea, culmo erecto, locustis quadrifloris, dorso sericeo †. alpina.

1460 POA foliis duris, se convolventibus, locustis quadrifloris, villosis. *Gramen pratense paniculatum majus angustiore folio* C. B. SCHEUCHZER. p. 178. in pratis aridis.

1461 POA foliis bulbosis, panicula diffusa, locustis quadrifloris subvillosis. *Gramen arvense angustifolium, panicula densa foliacea, foliolis in pa-*

Poa

panicula anguſtiſſimis SCHEUCHZER. p. 212. in muris & ad vias calidiorum.

1462 POA panicula diffuſa, locuſtis trifloris villoſis. *Gramen pratenſe paniculatum majus, foliis præter culmum anguſtioribus in culmo latioribus*, SCHEUCHZER. p. 203. in pratis.

1463 POA culmo recto, locuſtis trifloris glaberrimis, calycibus mucronatis †. *Poa panicula erecta, ſpiculis trifloris glabris, corollis acuminatis calyce duplo longioribus* GERARD. *flor. prov.* p. 9. t. 2. alpina Valeſiæ.

1464 POA ſtolonifera, locuſtis trifloris, folliculis villoſis †. *Gramen pratenſe paniculatum medium, anguſtiori folio* SCHEUCHZER. p. 181. ſubalpina.

1465 POA panicula diffuſa, locuſtis trifloris, glabris. *Gramen paniculatum pratenſe majus*, EJUSD. p. 177. in pratis.

1466 POA culmo infracto, panicula triangulari, locuſtis trifloris glabris. *Gramen pratenſe paniculatum minus* C. B. SCHEUCHZER. p. 189. ad vias.

1467 POA panicula ſtricta, locuſtis trifloris, calycibus ariſtatis, floribus villoſis. *Gramen paniculatum aquaticum anguſtifolium panicula ſpecioſa locuſtis parvis* SCHEUCHZER. p. 184. in udis.

1468 POA panicula ſtricta, locuſtis bifloris, folliculis baſi villoſis †. *Gramen paniculatum anguſtifolium montanum panicula denſa locuſtis parvis muticis* EJUSD. p. 180. in muris.

1469 POA culmo debili, panicula nutante, locuſtis bifloris, folliculis ſubvilloſis. *Gramen canino vineali ſimile, anguſtioribus foliis, paniculis minoribus non ariſtatis* I. I. SCH. *It. II.* p. 135. t. 18. f. 2.

β. *Gramen villoſa & cirrhoſa ſpongia ad ſingula genicula donatum anguſtifolium alpinum* I. SCH. *Agroſtog.* p. 165. in umbroſis montanis & ſubalpinis.

1470 POA panicula laxa, locuſtis bifloris, floribus calyce duplo longioribus glaberrimis †. inter *Salanche & Chamouny.*

1471

1471 POA locustis bifloris, glabris, florali gluma majori plicata serrata. *Gramen miliaceum aquaticum* SCHEUCHZER. *Agrest.* p. 172. in fossis.

1472 POA panicula laxa, locustis nutantibus, dianthis, alterno flore imperfecto. *Gramen avenaceum, locustis rubris montanum* C. B. *prodr.* n. 71. SCHEUCHZER. p. 175. in sylvis.

1473 POA monantha, stolonifera, calycibus subasperis †. *Gramen caninum supinum minus* SCHEUCHZER. p. 128. ad vias.

ß. Gramen radice repente panicula delicata spadiceo viridi EJUSD. p. 127.

1474 POA monantha, foliis setaceis, calycibus dorso exasperatis. *Gramen minimum palustre, panicula spadicea delicata, tenuifolium, semine exiguo rotundo* EIUSD. p. 131. circa lacum Felinum.

1475 POA monantha, caule erecto, panicula diffusa, calycibus dorso exasperatis. *Gramen montanum panicula spadicea delicatiori* C. B. *theatr.* p. 36. SCHEUCHZER. p. 129. in aridis, apricis, etiam alpinis.

1476 POA monantha, caule erecto, panicula stricta pauciflora. *Gramen miliaceum, angustifolium, calyce levi, glumis perexiguis* DILLEN. *Syn. III.* p. 404.

1477 AVENA monantha, paniculata, gluma calycina exasperata, arista flori æquali †. *Gramen parvum paniculatum panicula spadicea aristata* SCHEUCHZER. p. 140. alpina.

1478 AVENA monantha, paniculata, foliis setaceis, gluma calycina exasperata, arista flore duplo longiori †. *Gramen paniculatum capillaceo folio, locustis spadiceo fuscis, aristatis* EJUSD. p. 141. alpina.

1479 AVENA monantha, panicula diffusa, multiflora, adscendente, gluma calycina exasperata. *Gramen caninum supinum paniculatum folio varians* C. B. *theatr.* p. 12.

ß. Gramen paniculatum supinum ad infima culmorum

rum genicula foliorum capillaceorum fasciculo donatum SCHEUCHZER. p. 141. in pratis subudis.

1480 AVENA monantha, panicula adscendente multiflora, calyce levi, florali arista longissima. *Gramen segetum altissima panicula sparsa* EJUSD. p. 144. in agris planioribus.

1481 AVENA monantha, panicula sparsa, arista florem superante †. *Gramen caninum vineale*, EJUSD. p. 143. *Tiguri* in vinearum viis.

1482 AVENA diantha, foliis setaceis, panicula divaricata. *Gramen paniculatum purpuro argenteum locustis parvis annuum* HIST. OXON. III. p. 200. in siccioribus Basileæ, in valle Tellina.

1483 AVENA diantha, foliis setaceis, panicula stricta, aristis clavatis. *Gramen foliolis junceis oblongis*, radice alba C. B. *theatr.* p. 72. HIST. OXON. III. p. 200. SCHEUCHZER. p. 242. Basileæ, nos in sabulosis Germaniæ.

1484 AVENA diantha, floribus ovatis, perfecto mutico, imperfecto aristato. *Gramen pratense paniculatum molle* C. B. HIST. OXON. p. 202. SCHEUCHZER. p. 234. in pratis.

1485 AVENA . . . *Gramen caninum paniculatum molle* SCHEUCHZER. p. 235. Basileæ.

1486 AVENA diantha, pediculis flexuosis, floribus basi villosis, locustis ovatis. *Gramen avenaceum paniculatum alpinum, foliis capillaceis brevibus, locustis purpuro argenteis splendentibus* EJUSD. p. 216. in subalpinis.

β. *Gramen alpinum nemorosum, paniculatum, foliis angustissimis, locustis splendentibus aristatis* EJUSD. p. 218. iisdem locis.

1487 AVENA diantha, panicula amplissima, patula, bicolore. *Gramen segetum panicula arundinacea* EJUSD. p. 244. in pratis & segetibus.

1488 AVENA diantha, panicula sparsa erecta, floribus auratis, basi villosis †. in summis alpibus.

1489 AVENA diantha, foliis planis patulis, petiolis floralibus villosis †. alpium editiorum frequens hospita.

1490 AVENA diantha, panicula denſa ſpicata. *Gramen aveneum paniculatum alpinum humile, locuſtis in ſpicam collectis varicoloribus ariſtatis*, SCHEUCHZER. p. 221. alpium editiorum & ſteriliorum.

1491 AVENA diantha, folliculo villoſo, calycis glumis inæqualibus, altera de imo dorſo, altera de ſummo ariſtata. *Gramen pratenſe ſpica flaveſcente* C. B. *theatr.* p. 44. SCHEUCHZER. p. 88. in pratis.

1492 AVENA diantha, folliculis baſi villoſis, majoris ariſta geniculata. *Gramen nodoſum avenacea panicula* C. B. *theatr.* p. 18. SCHEUCHZER. p. 239 in agris, peſtis frugum.

β. *Gramen avenaceum elatius ſpica longa ſplendente* EJUSD. p. 239.

1493 AVENA diantha, glumis floralibus villoſis, ex baſi ariſtatis †. *Gramen paluſtre paniculatum minus* EJUSD. p. 257. in udis Baſileæ & Tiguri.

1494 AVENA diantha, locuſtis pendulis, floribus cartilagineis, inæqualibus, majori ariſtata. *Avena* BLAKWELL. t. 422. Seritur & ſponte ſata redit.

1495 AVENA triantha, locuſtis patulis villoſis. *Gramen avenaceum locuſtis lanugine flaveſcentibus*, SCHEUCHZER. p. 239. in agris Helvetiæ planioſis.

1496 AVENA triantha, locuſtis paniculatis, hiantibus, floſculo tertio imperfecto. *Gramen Mariæ Boruſſorum* LOESEL. ic. 26. Mülhuſiæ.

1497 AVENA triantha, locuſtis teretibus, calycina gluma altera minima, petiolo villoſo. *Gramen avenaceum pratenſe elatius panicula flaveſcente, locuſtis parvis* SCHEUCHZER. p. 223.

& *Gramen cum locuſtis majoribus villoſis* EJ. p. 225 in pratis.

γ. *Gramen pratenſe villoſa panicula ex argentea dilute ſpadicea vel fuſca* EJ. p. 220.

1498 AVENA triantha, locuſtis teretibus erectis, petiolis ſericeis, gluma exteriori lacera †. *Gramen avenaceum panicula purpuro argentea ſplendente* EJUSD. p. 226. in Helvetiæ pratis.

(Avena) Bromus

1499 AVENA petiolis brevibus unifloris, locuſtis teretibus quinquefloris, baſi pubeſcentibus. *Gramen avenaceum locuſtis ſplendentibus & bicornibus*, VAILLANT. t. 18. f. 1. alpina & ſubalpina.

β. *Gramen avenaicum alpinum anguſtifolium, locuſtis ariſtatis in ſpicam diſpoſitis* SCHEUCHZER. p. 228.

1500 AVENA petiolis ramoſis, locuſtis teretibus, quinquefloris, baſi pubeſcentibus †. *Gramen avenaceum, paniculatum, alpinum, locuſtis varicoloribus majoribus ariſtatis* EJUSD. p. 231. alpina editiora.

1501 AVENA locuſtis teretibus novemfloris, ariſtis reflexis. *Feſtuca avenacea glumis vacuis* EJ. p. 252 in agris Valeſiæ.

1502 BROMUS foliis glabris, locuſtis duodecimfloris. *Feſtuca graminea glumis hirſutis* EJ. p. 253. in ſegetibus.

1503 BROMUS foliis hirſutis, oris aſperrimis, locuſtis glabris, teretibus, novemfloris †. *Feſtuca graminea nemoralis latifolia mollis* C.B. *theatr.* p. 144 145. in ſegetibus.

1504 BROMUS hirſutus, locuſtis ſeptifloris, ovato conicis. *Gramen avenaceum villoſum locuſtis anguſtis candicantibus & ariſtatis*, SCHEUCHZER. p. 254. ad vias, in muris & agris vulgo.

1505 BROMUS panicula nutante, locuſtis ſeptifloris, glumis argute lanceolatis, lineatis, ſubhirſutis. *Gramen avenaceum, panicula ſparſa, locuſtis majoribus & ariſtatis* EJUSD. p. 258. ad vias & muros.

1506 BROMUS glaber, panicula nutante, locuſtis quadrifloris, glumis ſubhirſutis †. *Gramen bromoides montanum hirſutum, panicula minus ſparſa corniculata* EJ. p. 263.

& *Gramen bromoides panicula ſparſa locuſtis minoribus ariſtatis* p. 511. in ſylvis & ad aquas.

1507 BROMUS hirſutus, anguſtifolius, locuſtis quinquefloris, ariſtis folliculo brevioribus †. *Gramen bromoides pratenſe foliis præter culmum anguſtioribus rara lanugine villoſis* EJ. p. 355. in pratis.

1508

1508 BROMUS hirſutus, panicula nutante, pauciflora, locuſtis quinquefloris hirſutis, glumis argute lanceolatis. An *Feſtuca avenacea ſterilis humilior* C. B. ad ripas.

1509 BROMUS glaber, locuſtis glabris nutantibus octifloris, glumis marginatis. *Feſtuca graminea effuſa juba* SCHEUCHZER. p. 262. in agris.

1510 BROMUS glaber, locuſtis nutantibus quadrifloris, ariſtis longiſſimis. *Gramen bromoides aquaticum latifolium, panicula ſparſa tenuiſſime ariſtata*, EJ. p. 264. in aquoſis.

1511 BROMUS panicula laxa, locuſtis quadrifloris, breviſſime ariſtatis. *Gramen arundinaceum, locuſtis viridi ſpadiceis loliaceis, brevius ariſtatis*, EJ. p. 266. ad aquas.

1512 BROMUS locuſtis quadrifloris, faſciculatis, imbricatis. *Gramen ſpicatum folio aſpero* C. B. *theatr.* p. 45. SCHEUCHZER. p. 299. ad vias.

1513 STIPA ariſtis nudis flexuoſis, calyce ſemine longiori. *Feſtuca junceo folio* C. B. *theatr.* p. 145. SCHEUCHZER. p. 151. & *Feſtuca longiſſimis ariſtis* C. B. *theatr.* p. 152. 153. ad muros calidiorum.

1514 STIPA ariſtis plumoſis. *Gramen ſpicatum, ariſtis pennatis* SCHEUCHZER. p. 153. ad rupes calidiores.

1515 ARUNDO foliis ſecantibus, locuſtis trifloris, papposis, muticis. *Arundo vulgaris* ſ. *Phragmites Dioſcoridis* SCHEUCHZER. p. 161. in foſſis, ad ſtagna.

1516 ARUNDO caule lignoſo, geniculato, foliis latiſſimis, locuſtis trifloris. *Arundo ſativa quæ Donax Dioſcoridis* C. B. *theatr.* p. 271. SCHEUCHZER p. 156. in collibus calidis, ſub *Olon.*

1517 ARUNDO locuſtis bifloris, ſpicatis, gluma florali exteriori ciliata. *Gramen avenaceum ſpica ſimplici, locuſtis denſiſſimis candicantibus & lanuginoſis* SCHEUCHZER. p. 174. ad rupes & muros calidiores.

1518 ARUNDO locuſtis bifloris conicis, petiolis ſubvilloſis. *Gramen paniculatum autumnale, panicula*

Stipa, Arundo, Milium, Digitaria

cula ampliore ex viridi nigricante SCHEUCHZER p. 207. & *locustis angustissimis* p. 208. in pratis Aquilejensibus.

β. *Gramen arundinaceum enode minus* EJ. p. 209. in torfaceis.

1519 ARUNDO locustis unifloris, papposis, muticis, panicula alterne contracta. *Gramen arundinaceum panicula molli spadicea majus* C. B. *theatr.* p. 93. SCHEUCHZER. p. 122. in pratis udis arenosis.

1520 ARUNDO locustis unifloris, sericeis, muticis, panicula stricta. *Gramen arundinaceum paniculatum montanum, panicula spadiceo viridi, semine papposo* EJ. p. 124. in sylvis alpinis.

1521 ARUNDO locustis unifloris, ex summa gluma aristatis. *Gramen arundinaceum panicula aristata densa, viridi argentea, splendente,* EJUSD. p. 146. ad rupes Gubernii Aquilejensis frequens.

1522 ARUNDO locustis unifloris, ex imo dorso aristatis †. *Gramen avenaceum montanum panicula angusta e dilutissime fusco albicante & papposa* EJUSD. p. 507. similibus locis, in Rauracis, in M. *Dansex.*

1523 ARUNDO locustis unifloris, arista ex imo dorso, florem superante †. in montanis Aquilejensibus.

1524 ARUNDO locustis unifloris, fasciculatis, imbricatis, glumis floralibus nitentibus subhirsutis. *Gramen miliaceum aquaticum Phalaridis semine* SCHEUCHZER. p. 126. ad fossas & fluvios.

1525. MILIUM paniculis raris, peticlis longissimis. *Gramen sylvaticum miliaceum panicula sparsa,* EJUSD. p. 131. & *Gr. pan. alp. panicula miliacea sparsa* p. 134. in sylvis.

1526 DIGITARIA foliis subhirsutis, caule debili, spicis verticillatis, scapo ancipite. *Gramen dactylon folio latiore* C. B. *theatr.* p. 114. SCHEUCHZER p. 103. in hortis.

1527 DIGITARIA stolonibus teretibus, foliis patulis, glabris, spicis digitatis. *Gramen dactylon radice repente s. officinarum* EJUSD. p. 104. ad lacum Lemanum in arenosis.

1528

1528 PHLEUM caule erecto, ſpica cylindrica longiſſima, glumis calycinis oblique truncatis. *Gramen typhoides maximum ſpica longiſſima* C.B.*theatr*.p.49. SCHEUCHZER. p. 65. in pratis.

β. Varietas ſpica prolifera EJUSD. Horgæ.

1529 PHLEUM ſpicis ovatis hirſutis, locuſtis longe bicornibus. *Gramen typhoides alpinum ſpica brevi denſa & veluti villoſa* EJUSD. p. 64. in alpinis pratis.

1530 PHLEUM caule imo bulboſo, declinante, glumis calycinis obtuſe truncatis. *Gramen typhoides aſperum alterum* EJUSD. p. 62. in pratis & viis.

1531 PHLEUM culmo recto, ſpicis cylindricis glabris, calyce breviſſime mucronato. *Gramen typhoides aſperum primum* C. B.*theatr*. p.51. SCHEUCHZER p. 61. in pratis.

1532 PHLEUM panicula ſpicata hirſuta, calyce lanceolato †. *Gramen typhoides alpinum, ſpica graciliori delicata & villoſa* EJUSD. p. 65. in alpinis & montoſis pratis.

1533 HORDEUM ſpica ſubdiſticha, calyce folioſo ſetaceo, floribus omnibus hermaphroditis, longe ariſtatis. *Hordeum polyſtichon vernum* C.B.*theatr*. p. 439.

1534 HORDEUM ſpica polyſticha, floribus omnibus hermaphroditis, longe ariſtatis. *Hordeum hexaſtichum*. C. B.

1535 HORDEUM . . . *Hordeum diſtichum* C.B. *theatr*: p. 440.

1536 HORDEUM ſpica craſſa, longe ariſtata, calycinis glumis ariſtatis. *Gramen hordeaceum minus & vulgare* C. B. *theatr*. p. 139. SCHEUCHZER. p.14. ad vias.

1537 HORDEUM ſpica cylindrica rigida, calycinis glumis ariſtatis †. *Gramen hordeaceum montanum ſpica ſtrigoſiore brevius ariſtata*, SCHEUCHZER. p. 16. in ſylvis.

1538 HORDEUM ſpica diſticha, folliculo brevi, glumis calycinis ariſtatis †. *Gramen ſpicatum ſecalinum minus* EJUSD. p. 17. ad agros & fluviorum oras.

III. FOL-

Phleum, Hordeum – Alopecurus – Panicum – Cynosurus

IV. FOLLICULO UNIGLUMI.

1539 ALOPECURUS ſpica ovata. *Gramen typhoides molle* SCHEUCHZER. p. 50. in pratis montanis.

1540 ALOPECURUS culmo erecto ſpicato, calyce ciliato. *Gramen ſpicatum ſpica cylindracea tenuiſſima longiore* EJUSD. p. 69. in agris.

1541 ALOPECURUS culmo ſpicato infracto. *Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum* C. B. *theatr.* p. 41. SCHEUCHZER. p. 72. in foſſis aquoſis.

V. CALYCE TRIGLUMI.

1542 PANICUM ſpica unica, floſculis ſeſſilibus ſolitariis, ſetis numeroſis. *Gramen paniceum* ſ. *ſylveſtre*, *ſpica ſimplici* C. B. *theatr.* p. 138. SCHEUCHZER. p. 46. in agris & hortis.

1543 PANICUM ſpica unica, paniculata, ſetis perpaucis. *Gramen paniceum*, *ſpica aſpera* EJUSD. p. 47. C. B. *theatr.* p. 139. in agris.

1544 PANICUM ſpica ramoſa, ſetis nullis. *Gramen panicum ſpica diviſa* SCHEUCHZER. p. 149. ad foſſas & in aquoſis.

VI. CALYCE PINNATO.

1545 CYNOSURUS bracteis pinnatis retuſis. *Gramen pratenſe criſtatum*, ſ. *ſpica criſtata* C. B. SCHEUCHZER. p. 79. in pratis.

1546 CYNOSURUS bractearum dentibus lanceolato linearibus. *Gramen alopecuroides*, *ſpica aſpera*, EJUSD. p. 80. ad pedem M. *S. Bernhardi*, in valle Prætoria.

XIII. APETALÆ.

I. FLORIB. UTRIUSque SEXUS CONJUNCTIS

I. VASCULIFERÆ POLYSPERMÆ.

1547 ASARUM foliis reniformibus ſubhirſutis. *Aſarum* DODON. *purg.* p. 110. paſſim in ſylvis montanis.

1548 CHRYSOSPLENIUM foliis alternis LINN. &c. *Sedum paluſtre majus foliis longis pediculis inſidentibus* HIST. OXON. III. p. 477. in umbroſis paſſim.

1549 CHRYSOSPLENIUM foliis conjugatis LINN. *Saxifraga aurea* DODON. *pempt.* p. 316. ſupra *Mülhuſiam*, in adſcenſu montis *Ballon*, & haud longe *Ferrières.*

II. MONOSPERMÆ.

I. DIPLOSTEMONES.

1550 SCLERANTHUS floris ſegmentis erectis. *Alchimilla gramineo folio majori flore* VAILLANT. t. 1. f. 5. Baſileæ, ad Wieſam & prope *Wyl.* in Valeſiæ inferioris arenoſis.

1551 SCLERANTHUS floribus patulis. *Polygonum Germanis Knawel* TRAG. p. 393. in agris.

II. ANOMALÆ.

1552 HERNIARIA glabra, glomerulis multifloris. *Herniaria glabra* I. B. I. II. p. 379. paſſim in arenoſis & glareoſis.

1553 HERNIARIA hirſuta, glomerulis paucifloris. *Herniaria hirſuta* I. B. ib. Miſta glabræ prope Baſileam. In Valeſia inferiori & vallibus eo ſpectantibus.

1554 POLYGONUM foliis ovato lanceolatis, vaginis calvis truncatis. *Hydropiper* DODON. *cereal.* p. 269. ad foſſas.

1555 POLYGONUM foliis ovato lanceolatis glabris, ſpicis ſtrigoſis, vaginis ciliatis †. *Perſicaria anguſtifolia* C. B. *prodr.* p. 43. in torfaceis & humidis ſylvarum.

1556 POLYGONUM foliis ovato lanceolatis, ſubtus tomentoſis, ſpicis ovatis, vaginis ciliatis †. *Perſicaria folio ſubtus incano* RAJ. *Syn.* *III.* p. 145. in Rheni inſulis.

Asarum, Chrysosplenium — Scleranthus
Herniaria, Polygonum —

1557 POLYGONUM foliis ovato lanceolatis, fubhirfutis, fpicis ovatis, vaginis ciliatis. *Perficaria* Dodon. *pempt.* p. 108. ad foffas & vias.

1558 POLYGONUM radice lignofa, intorta, foliis nervofis, radicalibus ovato lanceolatis, caulinis linearibus. *Bistorta minor* f. *alpina* Camer. *epit.* p. 684. alpina, etiam montana edita.

1559 POLYGONUM radice lignofa intorta, fpica ovata, foliofis petiolis alatis. *Bistorta* Dodon. *purg.* p. 40. 41. in pratis udis.

1560 POLYGONUM procumbens, foliis linearibus acutis, floribus folitariis. *Polygonum mas* Matthiol. p. 911. ad vias & in agris.

1561 POLYGONUM caule volubili, foliis fagittatis. *Volubilis nigra* Tabern. p. 876. agrorum vitium.

1562 POLYGONUM caule volubili, foliis fagittatis, valvulis feminalibus alatis. *Convolvulum nigrum* Dodon. *purg.* p. 220. in fepibus & hortis.

1563 POLYGONUM caule erecto, foliis fagittatis, valvulis integerrimis. *Fagopyrum* Dodon. *cereal.* p. 80. in agris & ad lacum Lemanum.

1564 POLYGONUM caule erecto, foliis ovato lanceolatis, fubhirfutis, fpicis paniculatis. *Perficaria alpina folio nigricante, floribus albis* Boccone *muf. di piant.* t. 27. Allione *fpec.* p. 41. t. 8. ad pedem Alpium *Grifearum* circa *Formazz* in pratis.

1565 POLYGONUM foliis ovato lanceolatis, ciliatis, fpicis ovatis. *Fontalis* f. *Potamogeton* Dodon. *cereal.* p. 227. &

β. *Perficaria acida Jungermanni*, *Comm. Lit. Nor.* 1737. t. 5. f. 1. in ftagnis, adque foffas & in vineis.

III. MEIOSTEMONES.

1566 ALCHEMILLA foliis ferratis, palmatis, feminovemfidis. *Stellaria* Camer. *epit.* p. 908. in pratis.

1567 ALCHEMILLA foliis fericeis digitatis, apice dentatis. *Stellaria argentea* Camer. *epit.* p. 909. in montanis & alpinis.

1568

1568 ALCHEMILLA foliis glabris, quinatis, femimultilobis. *Alchemilla alpina, pentaphyllæa minima lobis fimbriatis* BOCCONE *muf. di piant.* t. 1. fummarum alpium.

1569 ALCHEMILLA hirfuta, foliis trilobatis, lobis bipartitis & tripartitis. *Alchemilla minima montana* COLUMN. I. p. 146. 148. in agris.

1570 POLYCNEMON LINN. *Anthyllis altera Italorum* LOBEL. p. 504. in agris circa *Urbam*, in Valefia inferiori, Bafileæ.

1571 BLITUM foliis femitrilobis, rariter dentatis. *Atriplex fylveftris, lappulas habens* C. B. *prodr.* p. 58. in Rhætia & Helvetia tranfalpina.

IV. ISOSTEMONES.

1572 LIMNOPEUCE CORD. VAILL. *mem.* 1719. t. 1. f. 3. in foffis aquofis & lacubus.

1573 THESIUM caule erecto, paniculato, foliis lanceolatis. *Anonymos Lini folio* CLUS. *pann.* p. 312. circa *Mendris*.

1574 THESIUM caule diffufo, floribus alaribus, foliis linearibus. *Thefium floribus tetrandris* JACQUIN. *vindob.* p. 15.

1575 CHENOPODIUM foliis fubulatis, fericeis, florum glomerulis geminis †. *Kali hirfuto affinis, Anthylloidis forte aliqua fpecies* I. B. III. p. 205. in valle Augufta ad pedem alpium Valefiacarum.

1576 CHENOPODIUM caule erecto, foliis ovatis integris. *Blitum fylveftre* CAMER. *epit.* p. 237. in hortis & ad maceries.

1577 CHENOPODIUM caule diffufo, foliis obtufe lanceolatis. *Garofmus* DODON. *pempt.* p. 616. in regionum vitibus alendis aptarum ruderofis & ad muros.

1578 CHENOPODIUM foliis triangularibus, undulatis, integerrimis, fubtus farinofis. *Bonus Henricus* TRAG. p. 317. in fimetis & ruderofis.

1579 CHENOPODIUM foliis fubtus farinofis rhomboideis, dentatis, fuperioribus integerrimis. *Atriplex fylveftris tertia* CAMER. *epit.* p. 243. ad vias & in hortis.

1580 CHENOPODIUM foliis rhomboideis, dentatis, ſubtus incanis. *Chenopodium opuli folio* VAILLANT. t. 7. f. 1. ad maceries.

1581 CHENOPODIUM foliis glabris ſeptangulis, floribus paniculatis. *Chenopodium Stramonii folio,* VAILLANT. t. 7. f. 2. ſimilibus locis.

1582 CHENOPODIUM foliis glabris trilobatis dentatis. *Blitum ficus folio* PETIVER. *herb. brit.* t. 8. ſimilibus locis.

1583 CHENOPODIUM foliis nitentibus, glabris, acute circumdentatis. *Pes anſerinus* FUCHS p. 633. perinde.

1584 CHENOPODIUM foliis oblongis, ſinuatis, ſubtus incanis. *Atriplex anguſtifolia laciniata* I. B. II. p. 472. Aquilegiæ ad fimeta.

1585 CHENOPODIUM foliis oblongis, ſemipinnatis, viſcidis, rotunde dentatis. *Botrys* MATTHIOL. p. 853. paſſim in Helvetia calidiori, in glareoſis.

1586 ULMUS foliis ſcabris, ovato lanceolatis, dentibus ſerratis. *Ulmus* CAMERAR. *epit.* p. 70. ejuſque multæ varietates. in Aquilejenſibus, &c.

1587 LAPATHUM foliis obtuſis, circa petiolum emarginatis, paniculis denſe ſpicatis, vaginis maximis. *Lapathum folio rotundo alpinum* I. B. II. p. 987. ad caſas alpinas.

1588 LAPATHUM foliis longe lanceolatis, paniculis denſiſſimis. *Lapathum paluſtre* TABERN. p. 437. in foſſis.

1589 LAPATHUM foliis criſpis, imis ovatis, ſupremis lanceolatis, calycibus verrucoſis. *Lapathum acutum criſpum* TABERN. p. 436. ad vias.

1590 LAPATHUM petiolis lateſcentibus, foliis longe lanceolatis, floribus verticillatis verrucoſis. *Lapathum aquaticum minus* I. B. II. p. 987. ad foſſas & ripas.

1591 LAPATHUM petiolo lateſcente, foliis longe lanceolatis, calyce ſerrato. *Oxylapathum* FUCHS p. 461. ad vias.

1592 LAPATHUM foliis ovatis, circa petiolum emarginatis, floribus denſe paniculatis, ſerratis, verrucoſis. *Hippolapathum ſylveſtre* TABERN. p. 436. ad vias.

1593 LAPATHUM foliis radicalibus utrinque emarginatis, calycibus reticulatis, ciliatis, verrucoſis. *Lapathum pulchrum Bononienſe ſinuatum* I. B. II. p. 988. ad vias vineti Vaudenſis.

β. *Lapathum arvenſe ſuchirſutum foliis rugoſis, caule longe brachiato, capſula ſeminis crenata*, TILLI t. 37. f. 2.

1594 LAPATHUM foliis ſagittatis, cis mucronem latiſſimis, hamis reflexis divergentibus. *Acetoſa alpina ſerpeggiante* ZANON. t. 87. in alpinis, etiam montanis & muris.

1595 LAPATHUM foliis antice emarginatis. *Acetoſa Britannica* BLAIR. *miſcell. obſſ.* p. 67. alpina editiora.

1596 LAPATHUM ſexubus ſeparatis, foliis ſagittatis, hamis acutis, recurvis *Oxalis minor* CAMER. *epit.* p. 231. in ſterilibus.

1597 LAPATHUM ſexubus ſeparatis, foliis ſagittatis, hamis retrorſum porrectis. *Oxalis* FUCHS. p. 464. in pratis.

1598 LAPATHUM ſexubus ſeparatis, foliis ſagittatis, hamis breviſſimis, recta divergentibus. *Acetoſa montana latiori ari rotundo folio* BOCCONE t. 125. in vallibus alpinis.

APETALÆ. II. SEXUBUS DIVISIS.

I. IN EADEM PLANTA.

I. POLYSTEMONES.

1599 CERATOPHYLLUM foliis ſubſpinoſis, capſulis tricornibus. *Hydroceratophyllum, folio aſpero, quatuor cornubus armato* VAILLANT. *mem. de l'Acad.* 1719. t. 2. in foſſis planitiei.

Rapatium — Ceratophyllum, Mercurialis, Laurus — Hippophae — Zanichellia, Empetrum — Amaranthus, Ficus, Lemna, Viscum, Buxus ...

1600 MERCURIALIS caule annuo brachiato, foliis glabris, conjugatis, ovato lanceolatis. *Mercurialis femina* CAMERAR. *epit.* p. 996. & *Mercurialis* EJUSD. p. 991. in vineis.

1601 MERCURIALIS caule perenni, indiviſo, foliis hirſutis, ovato lanceolatis. *Cynocrambe* CAMER. *epit.* p. 998. in ſylvis.

1602 LAURUS foliis ovato lanceolatis, ramis florigeris folio brevioribus. *Laurus* CAMER. *epit.* p. 60. circa *Moutru.*

II. DIPLOSTEMONES.

1603 HIPPOPHAE foliis linearibus, ſubtus rubiginoſis *Rhamni ſpecies* CAMER. *epit.* p. 81. in glareis torrentum.

III. MEIOSTEMONES.

1604 ZANICHELLIA paluſtris major &c. MICHELI, t. 11. f. 1.

1605 EMPETRUM procumbens, foliis ovato lanceolatis obtuſis. *Erica baccifera* CAMER. *epit.* p. 77. alpina edita.

IV. ISOSTEMONES.

1606 AMARANTHUS procumbens, foliis ovatis emarginatis. *Blitum album minus* CAMER. *epit.* p. 236. in hortorum rejectaneis.

1607 FICUS foliis palmatis. *Ficus* DODON. *pempt.* p. 812. ad vias Valeſiæ, vallis Tellinæ.

1608 LEMNA JUSSIEU *mem. de l'Acad.* 1743. p. 263.

1609 VISCUM foliis lanceolatis, obtuſis, caule dichotomo, ſpicis alaribus. *Le Gui male* DU HAMEL t. 22. &c. in arboribus, potiſſimum malis.

1610 BUXUS CAMER. *epit* p. 601. Baſileæ, Genevæ &c. in collibus aridis.

1611 MORUS foliis ſcabris, cordatis & ſemitrilobis. *Morus alba candida* LOBEL. II. p. 196. in glareis fluviorum.

1612

1612 PARIETARIA foliis hirſutis, elliptico lanceolatis. *Helxine* CAMERAR. *epit.* p. 949. ad muros Helvetiæ calidioris.

1613 PARIETARIA foliis ſubhirſutis, ovato lanceolatis. *Parietaria breviori folio*, BOCCONE *ſicul.* p. 47. *Chiavennæ*, *Mendriſii.*

1614 URTICA ſtirpibus ſexu diſtinctis, foliis ovato lanceolatis, productis, ſerratis. *Urtica II.* MATTHIOL. p. 862. ad ſepes.

1615 URTICA ſexubus ſede disjunctis, foliis ovato lanceolatis ſerratis, ſpicis oblongis. *Urtica tertia* MATTHIOL. p. 1127. iisdem locis.

1616 CANNABIS DU HAMEL *de la Corderie* t. 2. & *C. mas* ib. T. I. ex ſativa vagabunda.

1616* ATRIPLEX foliis imis hamatis, reliquis lingulatis, valvulis ſeminalibus dentatis. *Atriplex vulgaris anguſtifolia cum folliculis* I. B. II. p. 973. ruderoſa.

1617 ATRIPLEX foliis triangularibus, baſi producta, valvulis triangularibus ſubaſperis. *Deltorrach* PETIVER. t. 7. rarior. Mûlhuſiæ.

1618 LUPULUS CAMER. *epit.* p. 933. &c.

1619 CELTIS foliis ſcabris, ſerratis, longiſſime lanceolatis. *Lotus arbor* LOBEL. II. p. 186. in Helvetia transalpina, adque M. *S. Bernhardi* pedem.

1620 TAMUS foliis cordatis indiviſis. *Vitis nigra*, MATTHIOL. p. 1285. ad ſepes.

V. FLORE COMPOSITO.

1621 XANTHIUM foliis ſemitrilobatis, aculeis uncinatis. *Xanthium* CAMER. *epit.* p. 926. ad fimeta & rudera Helvetiæ planioris.

VI. JULIFERÆ.

1622 FAGUS foliis ovato lanceolatis, oris undulatis. *Fagus* CAMER. *epit.* p. 112. vulgo ſylvas efficit.

1623 CASTANEA foliis ovato lanceolatis, ſerratis, dentibus aduncis. *Caſtanea* CAMER. *epit.* p. 118. ſylvas facit in Helvetia calidiori.

Urticaria, Urtica, Cannabis, Atriplex, Humulus, Celtis, Tamus — Xanthium — Fagus, Castanea, Juglans, Corylus, Quercus, Carpinus, Betula, Alnus, Populus

1624 JUGLANS foliis ſeptenis, ovato lanceolatis, integerrimis. *Juglans* CAMERAR. *epit.* p. 172. ad vias.

1625 CORYLUS ſylveſtris LOBEL. II. p. 192.

1626 QUERCUS foliis glabris, ſemipinnatis, pinnis obtuſis, ſuperioribus majoribus.
 α. *Sommereiche* CRAMER. t. 2. f. 4
 β. *Wintereiche* EJUSD. ib. f. 3. Prior in cultis, aquoſis, & fertilibus. β. in aridis collibus.

1627 CARPINUS CAMER. *epit.* p. 71. in nemoribus planitiei.

1628 BETULA foliis cordato lanceolatis ſerratis. *Betula* MATTHIOL. p. 142. in montoſis & aquoſis.

1629 BETULA foliis orbiculatis, crenatis LINN. *flor. Lap.* t. 6. f. 4. in torfaceis Juræ.

1630 ALNUS foliis glabris, rotundis, rotunde crenatis, ſpongiolis ad nervorum angulos. *Alnus* MATTHIOL. p. 140. in aquoſis.

1631 ALNUS foliis mucronatis, acute ſerratis, ſubtus lanuginoſis. *Alnus incana & hirſuta* I.B.I. P. II. p. 154. in dumetis, montanis.
 β. *Alnus montana criſpa viridis nana glutinoſo ſerrato folio* BOCCONE *muſ. di piant.* p. 80. & t. 96. montana.

1632 POPULUS foliis glabris cordato rhomboideis ſerratis. *Populus nigra* MATTHIOL. p. 137. in aquoſis.

1633 POPULUS foliis glabris, orbiculatis, acuminatis, laxe ſerratis. *Populus Lybica* CAMER. *epit.* p. 67. in ſylvis.

1634 POPULUS foliis anguloſis, ſubtus tomentoſis, ſubrotundis, dentato angulatis. *Populus alba* CAMER. *epit.* p. 61. in Valeſia & Baſileæ ad fluvios.

1635 SALIX arborea, foliis ellipticis, lanceolatis, ſubtus ſericeis, dentibus craſſeſcentibus. *Salix* LOBEL. II. p. 136. BLAKWELL. t. 327. ad vias, in ſylvis.
 β. *Salix lutea tenuior ſativa viminea* I. B. I. P. II. p. 214. ad rivos adque foſſas.

1636 SALIX ſtipulis ſerratis, foliis lanceolatis, ſerratis, glabris. *Salix ſpontanea fragilis, amygdalino folio, non auriculata* I. B. II. p. 214. ad ripas lacus Lemani.

1637 SALIX foliis glabris, elliptico lanceolatis, ſerratis, ſtipulis dentatis, julis gracilibus, triandris. *Salix elliptico lanceolatis, utrinque glabris, ſerratis, appendiculatis* GMELIN. t. 34. f. 3. ad ſabuloſa fluviorum littora.

1638 SALIX ſtipulis dentatis, foliis glabris, ovato lanceolatis, glumis ovatis piloſis. *Salix folio auriculato ſplendente flexilis* RAJ. *Syn. III.* p. 448. non ſatis certa civis.

1639 SALIX foliis glabris, ovato lanceolatis, petiolis glanduloſis, floribus hexaſtemonibus. *Salix floribus pentandris* LINN. *flor. Lapon.* t. 8. f. 32. neque ipſa nimis certa civis.

1640 SALIX monoſtemon, foliis glabris, lineari lançeolatis, ſerratis, ſuperne conjugatis, julis tomentoſis. *Salix monandra* ARDUIN. *mem.* p. 67. in aggeribus torrentum, pratis &c.

1641 SALIX foliis prælongis, obſcure dentatis, ſubtus tomentoſis & albicantibus. *Salix foliis anguſtis & longiſſimis criſpis ſubtus albicantibus* I.B.I.P.II. p. 212. ad ſepes.

1642 SALIX foliis integerrimis, ovato lanceolatis, ſubtus ſericeis, julis tomentoſis. *Salix pumila foliis utrinque candicantibus & tomentoſis* GMELIN. p. 164. t. 36. f. 1. alpina.

1643 SALIX foliis craſſis, elliptico lanceolatis, integerrimis, utrinque ſericeis †. alpina ſaxa.

1644 SALIX procumbens, foliis lanceolatis, ſubtus ſericeis. *Salix humilis repens* I. B. I. P. II. p. 209. in glareis fluviorum.

1645 SALIX foliis ovato lanceolatis, venoſis, ſerratis, julis tomentoſis. *Salix foliis ſerratis glabris ovatis* LINN. *flor. Lapon.* t. 7. f. 6. alpes editiores.

1646 SALIX foliis ovato lanceolatis glabris, obſcure ſerratis, venoſis. *Salix pumila folio utrinque glabro* I. B. ib. p. 217. inter SCHEUCHZERIANAS.

Salix

1647 SALIX foliis ovato lanceolatis, teneris, ferratis, ftipulis lanceolatis. *Salix foliis ferratis glabris obovatis* LINN. *flor. Lapon.* t.8. E.c. alpinæ valles.

1648 SALIX foliis glabris ovatis, nitentibus, julis paucifloris. *Salix alpina pumila repens, retufo ferpylli folio lucido* BOCCONE *muf. di piant.* p.18.t.1. alpium & fummorum montium.

1649 SALIX foliis orbiculatis, ferratis, glabris, julis paucifloris. *Salix alpina minima lucida repens, alni rotundo folio* BOCCONE ib. p. 29. t. 1. alpina edita.

1650 SALIX foliis rotundis, integerrimis, fubtus tomentofis, julis gracilibus longe petiolatis. *Salix pumila folio rotundo* I. B. I. P. II. p.217. ZANON. t. 117. alpina & montana.

1651 SALIX foliis integerrimis, ovato lanceolatis, fubtus fericeis, foliis ovatis. *Salix latifolia rotunda* RAJ. *Syn. III.* p. 449. &

β. *Salix foliis utrinque ferratis fubrotundis acutis* LINN. *flor. Lapon.* t. 8. f. . t. 7. f. 7. in dumetis & ad fepes.

1652 SALIX foliis rugofis, reticulatis, integerrimis, inferne tomentofis, julis ovatis. *Salix caprea pumila* RAJ. *Syn. III.* p. 450. iisdem locis.

1653 SALIX foliis ovatis, rugofis, fubtus reticulatis, tomentofis, julis ovatis, ftipulis amplexicaulibus ferratis. *Salix caprea latifolia* TABERN. p.1038. in dumetis & ad fepes.

1654 SALIX foliis glabris, ovatis, ferratis, ftipulis latiffimis. *Salix latifolia non hirfuta* I. B. I. P. II. p. 216. ad fepes.

1655 SALIX foliis ovato lanceolatis ferratis, fubtus albiffimis. in Rhodani infulis, & fubalpinis.

VII. CONIFERÆ.

1657 PINUS foliis folitariis tetragonis mucronatis. *Picea* MATTHIOL. p. 97. fylvas facit montanas.

1658 PINUS foliis folitariis, planis, pectinatis, emarginatis. *Abies* MATTHIOL. p. 102. inter prioris fylvas.

1659 PINUS foliis fasciculatis, deciduis. *Larix* CAMER. *epit.* p. 46. in pratis subalpinis.

1660 PINUS foliis quinis triquetris. *Pinaster* MICHELI *nov. gen.* p. 223. t. 15.

1661 PINUS foliis binis, convexo concavis, julis masculis solitariis alaribus. *Pinus sylvestris montana* CAMER. *epit.* p. 46. in arenosis.

β. Pinus sylvestris Mugho EJUSD. p. 41.

1662 JUNIPERUS foliis convexo concavis, aristatis, baccis alaribus. *Juniperus* CAMER. *epit.* p. 13. in sterilibus.

1663 JUNIPERUS foliis cauli adpressis, lanceolatis, alterne conjugatis. *Sabina* CAMER. *epit.* p. 55. alpium altiorum, etiam vallis Tellinæ.

1664 TAXUS baccifera. *Taxus* CAMER. *epit.* p. 840. passim in montosis.

1665 EPHEDRA petiolis masculis, repetito ramosis. *Polygonum IIII. Plinii majus* CLUS. *hisp.* p. 187. & *minus* EJUSD. p. 189. in Valesiæ inferioris collibus.

XIV. CAULIFOLIÆ.

1675 EQUISETUM caule florigero nudo, sterili verticillato, radiorum quadraginta. *Equisetum I.* CAMER. *epit.* p. 770. B. in aquosis.

1676 EQUISETUM caule florigero nudo, sterili verticillato, radiorum duodecim. *Hippuris minor cum flore* DODON. *pempt.* p. 73. in aquosis agris.

1677 EQUISETUM caule sulcato, ramis multifloris, foliis indivisis. *Equisetum minus, palustre polystachyon* C. B. *theatr.* p. 245. in aquosis.

β. Equisetum palustre majus TABERN. p. 252. in fossis.

1678 EQUISETUM caule sulcato, subnudo, vaginis aristatis. *Equisetum minus, nudum, variegatum, Basileense* C. B. *prodr.* p. 24. in arenosis fluviorum & lacuum litoribus.

1679 EQUISETUM caule subnudo, asperrimo, vaginis caulinis indivisis, ramis foliatis. *Equisetum nudum* RAJ. *Syn. III.* p. 131. Michelfeldæ, Genevæ.

—Pinus, Juniperus, Taxus, Ephedra, Equisetum, Chara, Ophioglossum, Osmunda, Struthiopteris, Filix

1680 EQUISETUM foliis repetito ramosis, vaginis levissimis. *Equisetum sylvaticum* TABERN. p. 253. in montanis & subalpinis.

1681 CHARA caule levi fragili. *Equisetum fœtidum sub aquis repens* C. B. *prodr.* p. 25. in fossis.

1682 CHARA caule fragili, spinoso. *Chara major, cauliculis spinosis* VAILLANT. p. 18. t. 3. f. 3. perinde.

1683 CHARA caule subtomentoso fragili. *Chara major subcinerea fragilis* VAILL. p. 18. ibidem, si vera.

1684 CHARA caule levi pellucido flexili. *Chara translucens major flexilis* VAILLANT. p. 18. f. 8. Basileæ.

XV. EPIPHYLLOSPERMÆ.

1685 OPHIOGLOSSUM folio unico, ovato lanceolato obtuso. *Ophioglossum* CAMER. *epit.* p. 364. in pratis subudis.

1686 OSMUNDA foliis pinnatis, flabelliformibus, lunatis. Επιμηδιον COL. *phytob.* p. 61. *Lunaria minor* CAMER. *epit.* p. 643. in asperis tenui gramine vestitis.

1687 STRUTHIOPTERIS. *Asplenon sylvestre*, TRAG. p. 550. in sylvis Bernensibus montanis & subalpinis.

1688 FILIX foliis triplicato pinnatis, pinnis nervosis integerrimis, ultimis lanceolatis. *Filix femina* MATTHIOL. p. 291. in sylvis.

1689 FILIX foliis duplicato pinnatis, sterilibus obtusis dentatis, floralibus ovatis integerrimis. *Adianthum album tenuifolium rutæ murariæ accedens* I. B. III. p. 433. alpina.

1690 ASPLENIUM caule pinnato, pinnis imis trifoliatis, superioribus simplicibus, dentatis †. *Adiantum novum germanicum rutæ murariæ facie*, BREYNE *Centur. I.* ic. 97. in alpinis, infrequens.

1691 ASPLENIUM fronde laxa ramosa, ramis secundis trifoliis, superioribus semitrilobis rhomboideis, circumserratis. *Paronychia* CAMER. *epit.* p. 785. ad muros.

1692 ASPLENIUM foliis triangularibus, pinnis pinnatis, pinnulis ſemipinnatis, lobulis ovatis, ſerratis. *Onopteris major* TABERN. p. 796. ad muros non vulgo.

1693 ASPLENIUM foliis pinnatis, pinnis ovatis, crenatis. *Trichomanes* FUCHS p. 796. ad muros & rupes.

β. *Trichomanes ramoſum* I. B. III. p. 755.

1694 ASPLENIUM foliis pinnatis, pinnis in baſi dilatatis, obtuſis, ſubtus muſcoſis. *Aſplenium* CAMER. *epit.* p. 640. in muris Helvetiæ calidioris & ſubalpinæ.

1695 ASPLENIUM petiolis hirſutis, folio longe lineari lanceolato, integerrimo, poſtice cordato. *Phyllitis* MATTHIOL. *epit.* p. 579. ſubmontana & ſubalpina.

1696 POLYPODIUM foliis pinnatis, lanceolatis, radice ſquamata LINN. *Polypodium* MATTH. p. 1292 ad rupes & arbores.

1697 POLYPODIUM pinnis pinnatis, pinnulis ovatis integerrimis. *Filix minor non ramoſa* I. B. III. p. 149. in udis.

1698 POLYPODIUM foliis pinnatis, reflexis, pinnis ovatis, hirſutis, primis cum nervo confluentibus. *Filix non ramoſa minor & ſylveſtris Letr. à un Medecin* p. 50. ad rupes ſubalpinas & ſubmontanas.

1699 POLYPODIUM pinnis pinnatis, conjugatis, pinnulis ovatis, obtuſis, crenatis. *Filix petræa montana IIII.* TABERNÆM. p. 799. in montanis & ſubalpinis.

1700 POLYPODIUM pinnulis pinnatis, ſubtus hirſutis, obtuſis. *Filix montana latiore folio* PLUKNET. p. 190. t. 180. f. 6. ſimilibus locis.

1701 POLYPODIUM pinnis pinnatis, obtuſis, dentatis. *Filix mas* FUCHS p. 594. in ſylvis & ad ſepes.

1702 POLYPODIUM pinnis paucis, ſemipinnatis, breviſſimis, acute ſerratis †. Planta non ſatis certa, alpina.

1703

Asplenium, Polypodium, Adiantum

1703 POLYPODIUM pinnis pinnatis, pinnulis ovatis, obtusis, dentatis, dentibus imis bifidis †. *Filix mollis s. glabra vulgari non ramosæ accedens*, VAILLANT. p. 53. t. 9. f. 4. in sylvis.

1704 POLYPODIUM pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis, semipinnatis, lobis acute bisectis. *Polypodium &c.* MULLER. *flor. Fridrichsdal.* t. 2. f. 2. in sylvis.

1705 POLYPODIUM pinnulis pinnatis, lobis semipinnatis, dentatis, aristatis †. *Polypodium &c*, MULLER. ib. f. 4. in alpinis & montanis.

1706 POLYPODIUM duriusculum, pinnis laxe pinnatis, pinnulis bidentatis & tridentatis. *Filicula fontana* TABERNÆM. p. 792. Aquilejenses rupes.

1707 POLYPODIUM pinnis pinnatis, laxe divisis, pinnulis semipinnatis, lobulis subrotundis dentatis. *Filix saxatilis regia fumariæ pinnulis* VAILLANT t. 9. f. 1. in muris & rupibus.

1708 POLYPODIUM pinnis pinnatis, laxe divisis, pinnulis semipinnatis, acutis. *Filix pumila saxatilis altera* PLUKNET. p. 159. t. 179. f. 1. rupes montanæ & subalpinæ.

1709 POLYPODIUM pinnis pinnarum pinnatis, laxissime divisis, lobulis obtusis dentatis. *Felice crespo saxatile* PON. *Bald. Ital.* p. 224. alpina.

1710 POLYPODIUM triplicato pinnatum, pinnulis tertiis semipinnatis, lobulis bifidis. *Filix Rhætica tenuissime divisa*, I. B. III. p. 740. alpina & montana.

1711 POLYPODIUM foliis pinnatis, pinnis ciliatis, dentatis, appendiculatis. *Lonchitis aspera major* CAMER. *epit.* p. 664. alpina & montana.

1712 POLYPODIUM pinnis pinnatis, ciliatis, serratis, appendiculatis. *Filix aculeata Lonchitidi adfinis* PLUKNET. t. 180. f. 3. & *Filix mas pinnis auriculatis spinosis* t. 179. f. 6. & *Filix mas aculeata, nostras, alis expansis muscosa lanugine tectis* t. 180. f. 1. montana alpina & palustria.

1713 ADIANTUM petiolis ramosis, foliis flabelliformibus lobatis. *Adiantum* CAMER. *epit.* p. 924. in puteis & lapidosis transalpinis.

1714

1714 ACROSTICHUM caule bis bifurcato. *Holosteum petræum* TABERN. p. 736. in rupestribus.

1715 ACROSTICHUM pinnis subtus pinnatis, squamosis, obtusis, basi utrinque appendiculata. *Lonchitis aspera Marantæ* CAMER. *epit.* p. 666. circa *Ardenn* vallis Tellinæ.

XVI. MUSCI.

1716 LYCOPODIUM spica sessili, foliis lateralibus lanceolatis, confertis. *Selago vulgaris abietis rubræ facie* DILLEN. *sylv. musc.* p. 435. t. 36. f. 1. sylvæ alpinæ & montanæ.

1717 LYCOPODIUM foliis sessilibus, foliis ovato lanceolatis, serratis, confertis t. 45. f. 1. *Selaginoides foliis spinosis* DILL. *sylv.* p. 460. t. 68.

1718 LYCOPODIUM caule plano, foliis superne quaternis, inferne binis, spicis obscure petiolatis. *Lycopodioides imbricatum repens* DILL. p. 762. t. 66. f. 1. & *Lycopodioides denticulatum, pulchrum, repens, spicis pediculis insidentibus* EJ. p. 465. t. 64. f. 3. in alpinis & aquilejensibus.

1719 LYCOPODIUM spicis sessilibus, foliis lanceolatis adpressis, utrinque ternatis. *Lycopodium caule repente clavis tetragonis*, LINN. *flor. Lapon.* n. 417. t. 11. f. 6. alpina.

1720 LYCOPODIUM ramis prolixis, spicis sessilibus, foliis linearibus, subserratis. *Muscus clavatus, Juniperinis foliis reflexis, clavis singularibus sine pediculis* DILL. *hist. musc.* p. 455. t. 67. f. 9. Ericeta torfacea.

1721 LYCOPODIUM spicis sessilibus, foliis linearibus, confertissimis, incurvis. *Lycopodium palustre repens clava singulari* VAILLANT. t. 16. f. 4. DILL. t. 62. f. 7. montana, circa *Ferriére.*

1722 LYCOPODIUM ramis prolixis, spicis petiolatis gemellis, foliis linearibus pilo aristatis. *Lycopodium* TABERN. p. 814. in sylvis abiegnis.

1723 LYCOPODIUM spicis petiolatis, quaternis, caulibus complanatis, foliis adpressis. *Sabina sylvestris* TRAG. p. 554. circa Morbinium vallis Tellinæ.

Acrostichum — Lycopodium, Sphagnum Buxbaumia

1724 SPHAGNUM cauliferum ramis teretibus pendulis. *Muscus paluſtris in ericetis naſcens* VAILLANT. p. 138. t. 23. f. 3. in torfaceis.
ß. Sphagnum paluſtre molle deflexum ſquamis capillaceis DILL. t. 32. f. 2.

1725 SPHAGNUM ſeſſile, foliis radialibus obtuſis, centralibus ciliatis t. 45. f. 3. in aggeribus viarum Bernæ.

1726 SPHAGNUM acaulon, foliis ovato lanceolatis, pilo ariſtatis. *Muſcus trichoides acaulos minor latifolius* VAILLANT. t. 27. f. 2. ad vias.

1727 SPHAGNUM acaulon trichoides DILLEN. *ſylv.* p. 251. t. 32. f. 10. in agris & ad vias.

1728 BUXBAUMIA aphylla. *Muſcus capillaceus aphyllos capitulo brevi bivalvi* BUXBAUM. *Centur. II.* p. 8. t. 4. f. 2. prope villam *Drakau.*

1729 HYPNUM foliis hiſpidis, ovato lanceolatis, ariſtatis. *Muſcus ſquamoſus major ſ. vulgaris*, VAILLANT. t. 28. f. 9. in pratis & ſylvis.

1730 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, patulis, ſtriatis, breviter ariſtatis, operculis conicis. *Hypnum dentatum vulgatiſſimum operculis obtuſis* DILL. *ſylv.* p. 295. f. 29. ſimilibus locis.

1731 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, acutiſſimis, operculis ariſtatis †. *Hypnum vulgatius dentatum operculis cuſpidatis* DILLEN. p. 297. t. 38. f. 30. vulgo.

1732 HYPNUM foliis patulis, ſubulatis, operculis conicis †. *Muſcus terreſtris minor foliis criſpis*, BUXBAUM. *Cent. IV.* t. 63. f. 3. ad vias & in ſylvis.

1733 HYPNUM foliis cincinnatis, patulis, reflexis. *Muſcus erectus foliis reflexis* VAILL. t. 27. f. 5.

1734 HYPNUM caulibus proſtratis, foliis lanceolatis reflexis, operculo conico *Emend. III.* n. 33. † ſubalpina.

1735 HYPNUM caulibus teretibus, foliis cincinnatis, heteromallis. *Hypnum luteſcens criſpum Polypodii facie* DILL. *ſylv.* t. 37. f. 26.

1736 HYPNUM caule erecto, foliis falcatis, pilo ariſtatis, operculis conicis. *Hypnum paluſtre repens ſummi-*

fummitatibus aduncis DILLEN. *fylv.* t. 37. f. 36. in pratis udis.

1737 HYPNUM caule compreffo, foliis imbricatis, falcatis, pilo ariftatis. *Mufcus fquamofus ramofus minor & crifpus* VAILLANT. t. 27. f. 13. ubique ad arborum radices.

1738 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, falcatis, capfulis ovatis. *Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalon repens* DILL. t. 37. f. 27. in aquofis.

1739 HYPNUM foliis lanceolatis, crifpis, capfulis erectis, operculo conico. *Mufcus montanus gracilis ramofus, viticulis longioribus glabris* DILL. t. 39. f. 43. ad arbores & faxa.

1740 HYPNUM ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis, pilo ariftatis, capfulis ovatis pendulis, operculis ariftatis. *Hypoum dentatum curtipendulum, ramis tenacibus* DILLEN. t. 43. n. 69. in montanis fylvis.

1741 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, ramis teretibus, fupremis conicis, acuminatis. *Mufcus fquamofus paluftris, foliis flagellisque rigidiufculis incurvis*, VAILLANT. t. 28. f. 11. in foffis & paluftribus.

1742 HYPNUM ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis, fetis prælongis, capfulis craffis, operculis conicis †. *Mufcus erectus foliis anguftis caulibus appreffis* VAILL. t. 29. f. 10.

1743 HYPNUM ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis, fetis prælongis, capfulis inclinatis, ariftatis. *Mufcus fquamofus cupreffiformis* VAILL. t. 28. f. 3. fimilibus locis.

1744 HYPNUM ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis ramis teretibus. *Mufcus terreftris furculis Kali aut illecebræ æmulis foliis fubrotundis fquamatim incumbentibus* VAILL. t. 25. f. 7. in fylvis.

1745 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, ramis teretibus compreffis. *Hypnum myofuroides, craffius, capfulis erectis* DILLEN. t. 41. f. 50. ad arborum cortices.

1746 HYPNUM ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis, pilo terminatis, fetis caulinis brevibus. *Hypnum*

Hypnum aquaticum foliis & teretibus & pinnatis DILLEN. t. 40. f. 44.

1747 HYPNUM caule nudo, inclinato, ramis teretibus confertis, capsulis acutis ariſtatis. *Muſcus erectus major foliis anguſtioribus acutis* VAILLANT, t. 23. f. 2.

1748 HYPNUM caule nudo, confertim ramoſo, ramis inclinatis, capſulis ariſtatis. *Muſcus dendroides elatior radice repente* VAILL. t. 23. f. 5. ad rivum *Glasbach.*

1749 HYPNUM caulibus teretibus ramoſis, foliis appreſſis, pilo ariſtatis, operculis conicis. *Muſcus arboreus ſplendens myoſuroideus* VAILL. t.27. f. 12. ad arborum cortices.

1750 HYPNUM ramis teretibus, foliis pilo præpilatis, capſulis cylindricis erectis ariſtatis. *Muſcus arboreus ſplendens ſericeus* VAILL. t. 27. f. 3. ad arborum radices & ſaxa.

1751 HYPNUM ramis brevibus, teretibus, foliis pilo præpilatis, capſulis erectis, ariſtatis. *Hypnum trichoides capitulis oblongis in ſetis breviſſimis*, DILLEN. t. 42. n. 65. montana.

1752 HYPNUM ramis teretibus, foliis pilo præpilatis, capitulis ovatis, mucronatis, inclinatis. *Muſcus myoſuroides ramoſus minor capitulis incurvis*, VAILLANT. t. 27. f. 6. ſubmontana.

1753 HYPNUM caulibus teretibus, foliis pilo præpilatis, capſulis oblongis ariſtatis †. *Hypnum ſericeum, ſurculis rectioribus & longioribus, capſulis incurvis* DILLEN. t. 42. f. 60.

1754 HYPNUM ramis teretibus, foliis pilo præpilatis, capſulis ovatis inclinatis, mucronatis. *Muſcus ſquamoſus ramoſus tenuior capitulis incurvis*, VAILLANT. t. 26. f. 9. ad radices arborum.

1755 HYPNUM foliis peranguſtis, pilo terminatis, capſulis inclinatis, breviter ariſtatis †. *Muſcus trichoides terreſtre minimus, capitulis recurvis*, HIST. OXON. III. t. 6. f. 16.

1756 HYPNUM caulibus proſtratis, foliis minimis, pilo terminatis, capſulis cylindricis erectis, mucronatis. *Hypnum terreſtre ſerpens ſetis & capſulis longis*

longis erectis DILLEN. t. 42. f. 64. ad arborum corticem, asseres &c.

1757 HYPNUM minimum, foliis ovato lanceolatis, capsulis erectis, operculis conicis †. subalpinum.

1758 HYPNUM foliis distichis, lanceolatis, pilo terminatis, capsulis ovatis, inclinatis, aristatis. *Muscus filicinus minor* VAILLANT. t. 23. f. 9.

1759 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, pilo terminatis, rarissimis, setis de medio caule erectis †. montana.

1760 HYPNUM caulibus fluitantibus prælongis, foliis lanceolatis, capsulis inclinatis †. *Hypnum fluitans, foliis tenuissimis, capsulis exilibus* DILLEN. t. 83. f. 7. alpinum.

1761 HYPNUM caule fluitante prælongo, foliis raris, lanceolatis, adscendentibus †. *Muscus fluitans foliis & flagellis longis tenuibusque* VAILLANT. t. 33. f. 6. in montanis aquosis.

1762 HYPNUM ramis duris, teretibus, foliis appressis, ovato lanceolatis, pilo aristatis. *Hypnum lutescens ramis subulatis tenacibus* DILLEN. t. 35. f. 12. sylvæ montanæ.

1763 HYPNUM caulibus teretibus, clavatis & filescentibus †. aquilejensia montana.

1764 HYPNUM ramis teretibus, pinnatis, pinnulis pinnatis, foliis adpressis. *Muscus filicinus minor* VAILLANT. t. 23. f. 9. ad arborum radices.

1765 HYPNUM caule subrecto, flexuoso, ramis teretibus pinnatis, pinnulis pinnatis, operculis aristatis. *Muscus filicinus major sericeus* VAILL. t. 29. f. 1. sylvæ abiegnæ.

1766 HYPNUM caulibus pinnatis, pinnis distantibus, alterne longioribus, ex apice confertis, foliis cincinnatis. *Hypnum repens filicinum crispum* DILLEN. t. 36. f. 13. in paludosis.

1767 HYPNUM ramis pinnatis, pinnis ramosis, foliis cincinnatis. *Muscus terrestris repens subflavus &c.* VAILLANT. t. 27. f. 14. alpinum.

1768 HYPNUM foliis pinnatis, pinnis simplicibus, æqualibus, foliis cincinnatis. *Hypnum filicinum cristam*

criſtam caſtrenſem repræſentans DILLEN. t. 36. f. 20. in ſylvis.

1769 HYPNUM caule plano, foliis diſtichis, ovatis, transverſim undulatis, operculis ariſtatis t. 45. f. 5. *Hypnum pennatum & undulatum criſpum. ſetis & capſulis brevibus* DILLEN. t. 36. f. 12. in montoſis.

1770 HYPNUM caule plano, foliis diſtichis, obiter rugoſis, nitidis, operculo conico. *Hypnum pennatum & undulatum Lycopodii inſtar ſparſum* DILLEN. t. 36. f. 11. in ſubalpinis Aquilejenſibus.

1771 HYPNUM caule diſticho, foliis ovatis, planis, capſulis ovatis, ariſtatis. *Muscus trichomanoides filicifolius ſplendens* VAILLANT. t. 23. f. 4. ad arborum corticem.

1772 HYPNUM foliis laxis, pinnatis, ovato lanceolatis, ariſtatis, retroverſis. *Muscus pennatus denticulatus minor* VAILLANT. t. 29. f. 8. in cavis montium ſemitis.

1773 HYPNUM denticulatum, pinnatum, pinnis ſimplicibus rectioribus DILLEN. t. 34. f. 6. ad vias montanas.

1774 HYPNUM foliis planis, pinnarum paribus quadraginta. *Muscus taxiformis ramoſus* VAILLANT. t. 28. f. 5. in ſubalpinis Aquilejenſibus.

1775 HYPNUM foliis planis, pinnarum paribus duodenis, ſetis radicalibus. *Muscus pennatus, capitulis Adianthi* VAILLANT. t. 24. f. 11. in ſylvis &c.

1776 HYPNUM foliis planis, pinnarum paribus ſeptem, ſetis ex ſummitate. *Muscus polytrichoides exiguis capitulis in ſummis ſurculis, ſ. foliis ſubrotundis erectis* VAILLANT. t. 24. f. 13. ad cavas ſemitas.

1777 HYPNUM foliis falcatis, heteromallis, vaginis multifloris. *Muscus capillaceus major, pedunculo & capitulo tenuioribus* VAILLANT. t. 28. f. 12. vulgo in ſylvis.

1778 HYPNUM foliis vagis, ſubulatis, pilo terminatis, capſulis cylindricis inclinatis, operculis ariſtatis †. altiſſimarum alpium.

1779 HYPNUM foliis lanceolatis, falcatis, setis alaribus, capsulis ovatis inclinatis †. alpina Aquilejensia, etiam Basileæ.

1780 HYPNUM ramis alterne brevioribus, foliis pilosis, petiolis brevibus flexuosis t. 45. f. 4. *Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum* DILLEN. t. 47. f. 32. montana & subalpina.

1781 HYPNUM caulibus teretibus, foliis imbricatis, lanceolatis, capsulis erectis, ovatis, aristatis. *Muscus aquaticus pileis acutis* VAILLANT. t. 27. f. 16.

1782 HYPNUM caulibus teretibus, foliis pilo aristatis, setis brevissimis †. *Bryum hypnoides setis & capsulis exiguis* DILLEN. t. 47. f. 29. ad saxa alpina.

1783 HYPNUM cauliculis teretibus, foliis mucronatis, capsulis ventricosis †. *Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis incurvis* VAILL. t. 26. f. 7. alpina & subalpina.

1784 HYPNUM ramis compressis, foliis pilo aristatis, nitentibus, capsulis erectis, operculis conicis †. *Hypnum palustre erectum, trichoides, ramulis crebris luteo & rufovirentibus glabris* DILLEN. t. 39. f. 37. alpina & montana.

1785 HYPNUM caulibus erectis, teretibus, foliis imbricatis, fragilibus, capsulis inclinatis, aristatis. *Muscus ericoides erectus, montanus, albidus, fragilis* VAILLANT. t. 26. f. 13. passim Bernæ &c. in torfaceis.

1786 HYPNUM foliis capillaceis, congestis, crispescentibus, capsulis ovato cylindricis, brevissime ciliatis. *Bryum cirrhatum & stellatum tenuioribus foliis* DILLEN. t. 48. f. 42. subalpina & montana.

1787 HYPNUM foliis subulatis, cincinnatis, capsulis cylindricis, longissime ciliatis. *Bryum cirrhatum capsulis & setis longioribus* DILLEN. t. 48. f. 40. subalpina & montana.

1788 HYPNUM cauliculis teretibus, foliis lanceolatis repandis, capsulis erectis, cylindricis, aristatis. *Bryum stellatum nitidum pallidum, capsulis te-*

nuissimis DILLEN. t. 48. f. 44. subalpina & montana.

1789 HYPNUM caulibus erectis, foliis lanceolatis, pilo fluitante terminatis, capsulis erectis, longe rostratis. *Bryum rurale unguiculatum & hirsutum majus & ramosius* DILLEN. t. 45. f. 12. in tectis stramineis.

1790 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, aristatis, patulis, capsulis ovatis pendulis. *Muscus capillaceus minimus capitulo nutante, pediculo purpureo* VAILLANT. t. 29. f. 7. ad muros &c.

1791 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, aristatis, capsulis pendulis ovatis, operculis conicis. *Bryum foliis latiusculis congestis, capsulis longis nutantibus* DILLEN. t. 50. f. 67. ad muros & rupes.

1792 HYPNUM caulibus teretibus ramosis, foliis ovato lanceolatis, pilo aristatis, operculo conico. *Muscus saxatilis tortuosus & nodosus* VAILL. t. 27. f. 8. ad saxa.

1793 HYPNUM caulibus ramosis, foliis lanceolatis, hirsutis, operculis aristatis. *Muscus apocarpus saxis adnascens, capitulis obscure rubris* VAILL. t. 27. f. 11. perinde ut prior.

1794 HYPNUM foliis complicatis, ovato lanceolatis, capsulis in alis petiolatis ovatis. *Muscus squamosus acutissimus, in aqua nascens* VAILLANT. t. 32. f. 5. ad saxa riparia fluviorum.

1795 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, carinatis, apicibus capsuliferis †. *Fontinalis triangularis minor carinata e cymis capsulifera* DILL. t. 23. f. 2. Basileæ.

1796 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, pilo terminatis, capsulis per alas sessilibus. *Fontinalis squamosa tenuis sericea atrovirens* DILLEN. t. 33. f. 3. in torrente *l'Eau froide*.

1797 HYPNUM caulibus distichis, ramosis, foliis ovatis transversim undosis t. 45. f. 2. *Muscus terrestris major, foliis compressis, superficie crispis* VAILLANT t. 27. f. 4. prope Bernam, ad quercuum cortices.

1798

1798 BRYUM ſetis breviſſimis alaribus, calyptris cylindricis villoſiſſimis. *Muscus capillaceus minimus calyptra villoſa* VAILLANT. t. 27. f. 9. ad arborum cortices.

1799 BRYUM ſetis breviſſimis alaribus, calyptris villoſis conicis †. *Muscus capillaceus acaulos minimus calyptra ſtriata* VAILLANT. t. 27. f. 10. ad arborum cortices.

1800 BRYUM foliis ſerratis, capſulis ovatis, baſi turbinatis t. 46. f. 6. *Polytrichum alpinum ramoſum capſulis e ſummitate ellipticis* DILLEN. t. 55. f. 4. in ericetis alpium.

1801 BRYUM caule ramoſo, ex alis florigerum, foliis ſerratis, capſulis cylindricis. *Polytrichum ramoſum ſetis ex alis urnigeris* DILLEN. t. 55. f. 6. vulgo.

1802 BRYUM foliis mollibus ſubulatis, ſetis breviſſimis alaribus, capſulis ovatis †. t. 45. f. 8. *It. Helv. II.* t. 1. alpina & montana.

1803 BRYUM foliis ſubulatis, ſetis verticalibus, capſulis ſphæricis. *Muscus capillaceus medius capitulis globoſis* VAILLANT. t. 24. f. 9. 12. ad vias inque ſaxis.

1804 BRYUM foliis capillaceis, capſulis cylindricis, operculis ariſtatis. *Bryum piloſum molle ſetis intortis* DILLEN. t. 47. f. 33. paſſim in terra argilloſa, montanum & ſubalpinum.

1805 BRYUM caule ſeſſili, foliiis capillaribus, capſulis ovato cylindricis, operculo conico †. *Bryum acaulon heteromallum, ſetis longis pallidis* DILL. t. 49. f. 57. Baſileæ.

1806 BRYUM caulibus erectis, foliis capillaribus vagis, capſulis cylindricis, operculo conico t. 46. f. 1. in montoſis ubique.

1807 BRYUM foliis capillaribus heteromallis, capſulis ovatis, operculis ariſtatis. *Bryum heteromallum* DILL. t. 47. f. 37. ad raras ſemitas.

1808 BRYUM cauliculis cernuis, foliis capillaribus heteromallis, capſulis curvulis cylindricis, operculis conicis. *Bryum trichoides capſulis rubris cernuis* DILL. t. 50. n. 59. cum priori.

1809 BRYUM foliis capillaribus, capſulis ovatis ariſtatis. *Muscus capillaceus omnium minimus, foliis longioribus & anguſtioribus* VAILLANT. t. 29. f. 5. ad aggeres foſſarum.

1810 BRYUM foliis capillaribus, cauliculo ſeſſili, capſulis ovatis ariſtatis. *Bryum trichoides acaulon, paluſtre, minimum, ſetis & capſulis breviſſimis* DILLEN. t. 49. f. 57. ad rupes humidas.

1811 BRYUM cauliculis ſubnudis, ramoſis, foliis ſubulatis, brevibus, capſulis ovatis. *Bryum paluſtre æſtivum conferva facie* EJ. t. 47. f. 36.

1812 BRYUM foliis capillaceis erectis, ſetis longiſſimis, capſulis ſurſum lateſcentibus, operculo breviſſimo. *Bryum trichoides aureum capſulis incurvis obtuſis in ſetis longis* EJ. t. 49. f. 58. in montanis & ſubalpinis.

1813 BRYUM foliis capillaceis, capitulis pyriformibus pendulis t. 46. f. 7. *Bryum trichoides læte virens capſulis cernuis oblongis* EJ. t. 50. f. 60. ſubalpina.

1814 BRYUM foliis lanceolatis, imbricatis, capſulis erectis, cylindricis, ariſtatis. *Bryum tenue imberbe & pallidum, foliis crebrioribus* EJ. t. 49. f. 46. ad muros & vias.

1815 BRYUM foliis ſubulato lanceolatis, capſula inclinata, operculo conico. Montana.

1816 BRYUM foliis lanceolatis, ſubulatis, capſulis erectis, operculis conicis. *Bryum tenue ſtellatum ſetis purpureis* DILL. t. 49. f. 51. ad vias inque ſylvis.

1817 BRYUM foliis lanceolatis, imbricatis, capſulis cylindricis ariſtatis †. *Bryum tenue & barbatum foliis anguſtioribus & rarioribus* EJ. t. 48. n. 49. perinde.

1818 BRYUM foliis lanceolatis, laxe imbricatis, capſulis cylindricis obliquis, operculis conicis †. *Bryum polytrichoides paluſtre, ſetis longioribus rubris ſericeis* EJ. t. 49. n. 52. ſubalpinum.

1819 BRYUM foliis lanceolatis, ariſtatis, ſtellatis, capſulis ovatis ariſtatis reſectis. in rupibus ſubalpinis.

1820

1820 BRYUM foliis imbricatis, lanceolatis, ſetis alaribus, capſulis ovatis ariſtatis. *Bryum montanum hemiheterophyllum, capſulis acutis* DILLEN. t. 46. f. 25. montanum.

1821 BRYUM cauliculis teretibus, capſulis ovatis acuminatis pendulis. *Muscus ſquamoſus argenteus Ericæ folio* VAILLANT t. 26. f. 3. in aſſeribus.

β. Bryum pendulum, ſurculis teretibus viridibus DILLEN. t. 50. f. 67. ſubalpina.

1822 BRYUM foliis lanceolatis, pilo terminatis, capſulis pendulis, ovatis, ariſtatis. *Muscus capillaceus denſiſſimus lanuginoſus* VAILLANT. t. 29. f. 2. ad muros & ſaxa.

1823 BRYUM foliis lanceolatis, ſerratis, capſulis cylindricis inclinatis, ariſtatis. *Muscus capillaceus minor capitulo longiori falcato* VAILL. t. 26. f. 17. ad vias inque ſylvis.

1824 BRYUM foliis ovato lanceolatis, ariſtatis, reflexis, capſulis ovatis, obliquis. *Bryum erectis capitulis brevibus, foliis reflexis* DILLEN. t. 46. f. 24. in ſubalpinis.

1825 BRYUM cauliculis breviſſimis, foliis ovato lanceolatis, patulis, pilo terminatis, operculo ariſtato. *Muscus muralis omnium vulgatiſſimus villoſus* VAILLANT. t. 24. f. 15. in muris.

1826 BRYUM cauliculo breviſſimo, foliis ovato lanceolatis, patulis, operculis ariſtatis. *Muscus vulgaris omnium vulgatiſſimus non villoſus* EJ. t. 24. f. 14. t. 25. f. 4.

1827 BRYUM cauliculo breviſſimo, foliis lanceolatis, capſulis & operculis longiſſimis. *Muscus capillaceus, corniculis longiſſimis recurvis* EJ. t. 25. f. 8. paſſim ad terram.

1828 BRYUM caule folioſo, capſula cylindrica, ciliata, longe ariſtata †. *Bryum calyptra exſtinctoris figura majus & ramoſum* DILLEN, t. 45. f. 9. montana & ſubalpina.

1829 BRYUM caule breviſſimo, calyptra cylindrica, longe ariſtata. *Muscus capillaceus minimus, calyptra longa conoidea nitida* VAILLANT. t. 26. f. 1. rupes alpinæ.

Bryum

1830 BRYUM foliis ovato lanceolatis, capſula piriformi, terminata cylindro. *Muſcus capillaceus minor capitulis geminatis* VAILLANT. t. 26. f. 4. in torfaceis montanis.

1831 BRYUM foliis ovato lanceolatis, capſula piriformi, breviſſime papillata †. *Bryum ampullaceum foliis Serpylli pellucidis collo craſſiore* DILLEN. t. 44. f. 4. terra nigra alpina.

1832 BRYUM caule breviſſimo, foliis ovato lanceolatis, capſulis erectis, ovatis, operculo brevi. *Muſcus capillaceus minimus, capitulis piriformibus turgidis* VAILLANT. t. 29. f. 3. in terra argilloſa & in agris.

1833 BRYUM foliis ovato lanceolatis, capſulis erectis, ovatis, ariſtatis. *Muſcus capillaceus omnium minimus* EJ. t. 26. f. 2. in argilloſis & cavis viarum oris.

1834 BRYUM foliis lanceolatis rarioribus, capſulis ovatis pendulis t. 46. f. 6. *Bryum lanceolatum pellucidum, capſulis rotundis pendulis carneis* DILL. t. 51. f. 69. Bernæ, Baſileæ in viis cavis.

1835 MNIUM calyptris villoſis, foliis ſerratis, capſulis quadrangulis, diſco inſidentibus. *Polytrichum quadrangulare vulgare .. foliis ſerratis* DILLEN. t. 54. f. 1. in ſylvis abiegnis.

1836 MNIUM calyptris villoſis, foliis ſerratis, pilo ariſtatis, capſulis quadrangulis, inſidentibus diſco †. *Muſcus erectus Juniperi folio rigido glauco calyptra longiſſima* VAILLANT. t. 23. f. 6. ericeta & torfacea.

1837 MNIUM acaulon, calyptra villoſa, foliis ſerratis, capſulis cylindricis erectis. *Polytrichum parvum aloes folio ſerrato capſulis oblongis* DILLEN. t. 55. f. 7. in cavarum ſemitarum oris.

1838 MNIUM acaulon, calyptra villoſa, capſula cylindrica, foliis integerrimis. *Muſcus capillaceus minor calyptra tomentoſa* VAILL. t. 26. f. 25. ſimilibus locis.

1839 MNIUM foliis ovato lanceolatis congeſtis, patulis, ſetis numeroſis, capſulis ovatis, acuminatis, pendulis. *Bryum ſtellare roſeum majus, capſulis*

ovatis,

ovatis pendulis DILLEN. t. 52. f. 77. in muris, circa scaturigines.

1840 MNIUM foliis in summo caule congestis, lanceolatis, serratis, crispis, capsulis pendulis, aristatis †. montanum.

1841 MNIUM foliis ovato lanceolatis, serratis, confertis, capsulis nutantibus obtusis †. *Muscus palustris foliis subrotundis* VAILLANT. t. 26. f. 16. similibus locis.

1842 MNIUM foliis pinnatis, lanceolatis, serratis, capsulis nutantibus aristatis t. 46. f. 4. †. etiam similibus locis.

1843 MNIUM foliis lanceolatis, aristatis, in vertice congestis, capsulis inclinatis, operculo mammillari †. alpinum.

1844 MNIUM foliis cordatis, ellipticis, setis aggregatis, capsulis ovatis, obtusis, pendulis. *Muscus roseus polycephalus*, *Linaria foliis undulatis* VAILLANT t. 24. f. 3. ad vias.

1845 MNIUM foliis ovatis integerrimis, capsulis pendulis, ovatis, aristatis. *Bryum pendulum Serpylli folio longiori pellucido, capsulis oblongis cuspidatis* DILLEN. t. 53. f. 80. & inprimis n. 81. in sylvis, viarum oris.

1846 MNIUM foliis lanceolatis, imbricatis, capsulis pendulis, cylindricis, obtusis. *Bryum stellare hornum sylvaticum capsulis magnis nutantibus* EJ. t. 51. n. 71. in sylvis & rupibus udis &c.

1847 MNIUM caulibus rubiginosis, foliis lanceolatis alternis, capsulis pendulis pyriformibus obtusis †. *Bryum lanceolatum bimum setis & capsulis longis pendulis* EJ. t. 51. f. 73. alpes udæ.

1848 MNIUM foliis ovato lanceolatis, imis patulis, supremis congestis, myosuroideis †. uda alpina.

1849 MNIUM caulibus prælongis rubiginosis, foliis ovato lanceolatis, capsulis ovatis pendulis. *Bryum annotinum palustre capsulis ventricosis pendulis* DILLEN. t. 52. f. 72. subalpinum.

1850 MNIUM foliis cespitosis, lanceolatis, aristatis, capsula inclinata, cylindrica, aristata †. *Bryum*

Mnium, Blasia

stellare rosoum minus, capsulis & setis longioribus DILLEN. t. 52. f. 78.

1851 MNIUM caulibus teretibus, erectis, ex vertice multifidis. *Bryum palustre, capitulis teretibus stellatis capsulis magnis subrotundis* EJ. t. 42. f. 2. scaturigines alpinæ.

1852 MNIUM foliis ovato lanceolatis, conniventibus, capsulis ovatis, reflexis. *Bryum bulbiferum aureum calyptra quadrangulari, capsulis piriformibus nutantibus* EJ. t. 52. f. 75. ad muros.

1853 MNIUM caule simplicissimo, foliis ovato lanceolatis, seta fungifera foliosa t. 46. f. 8. *Mnium perangustis & brevibus foliis* SCHMIEDEL. ic. t. 3. in dejectis arboribus.

1854 MNIUM caule simplici, capitulis rosiferis nudis. *Mnium perangustis brevibus foliis* DILLEN. t. 31. f. 1. M. *Mole.*

1855 MNIUM caulibus rubiginosis bipartitis, foliis mollibus, lanceolatis, capsulis cylindricis acuminatis. *Muscus capillaris palustris flagellis longioribus bifurcatis* VAILLANT. t. 25. f. 1. in palustribus.

1856 MNIUM fluitans, prolixum, petiolis alaribus, sphærulis pulveriferis. *Mnium majus, minus ramosum, capitulis pulverulentis crebrioribus* DILLEN. t. 31. f. 1. in fossis paludosis.

1857 BLASIA fronde lobata, lobis subrotundis, nervis setiferis. *Blasia* SCHMIEDEL. in diss. in sylvis *Bremgarten* circa Bernam.

1858 JUNGERMANNIA foliis integerrimis, glabris, ovatis, distichis, extremo caule setifero. *Mnium Trichomanis facie foliis integris* DILLEN. t. 31. f. 5 ad acclivia viarum.

1859 JUNGERMANNIA foliis bipartitis, auriculatis, imbricatis, supernis punctiferis. *Lichenastrum auriculatum, pinnis minoribus crenatis* EJ. p. 490 t. 71. f. 18. in sylvis.

1860 JUNGERMANNIA foliis rotundis, alterne imbricatis, caule plano, multifloro, setis brevissimis. *Lichenastrum imbricatum majus squamis compressis & planis* EJ. *sylv.* p. 496. t. 72. f. 26.

1861

1861 JUNGERMANNIA foliis amplexicaulibus ſubrotundis. *Lichenaſtrum alpinum purpureum, foliis auritis & cochleariformibus* DILLEN. *ſylv.* p. 479. t. 69. f. 1. montana & alpina.

1862 JUNGERMANNIA foliis laceris, multidentatis, ſeſſilibus †. alpina.

1863 JUNGERMANNIA foliis imbricatis, bicuſpidatis, globuligeris †. *Jungermannia bidentana* SCHMIEDEL. f. 14. in humo & ad arbores.

1864 JUNGERMANNIA foliis bidentatis, fragiferis. *Mnium Trichomanis facie foliolis bifidis* DILL. p. 237. t. 31. f. 6. in montoſis ſylvis.

1865 JUNGERMANNIA foliis diſtichis, bicuſpidatis, ſummis ramis globuligeris. *Lichenaſtrum pinnulis acutiſſime bifidis minimis* EJUSD. p. 458. t. 70. f. 13.

1866 JUNGERMANNIA caulibus convexis, foliis deſcendentibus tridentatis †. Non rara in montoſis & ſubalpinis.

1867 JUNGERMANNIA foliis planis, lanceolatis, tridentatis †. ſubalpina.

1868 JUNGERMANNIA foliis pinnatis, ſubrotundis, ſerratis, ex apice florifera. *Lichenaſtrum Aſplenii facie, pinnulis majoribus* DIELEN. p. 482. t. 69. f. 2 in ſylvis ad terram.

β. Hepaticoides Polytrichi facie VAILLANT. t. 19. f. 7.

1869 JUNGERMANNIA foliis pinnatis, ſubrotundis, ex apice florifera. *Lichenaſtrum Trichomanis facie ex baſi & medio florens* DILLEN. t. 69. f. 2? ad terram.

1870 JUNGERMANNIA foliis pinnatis ovatis, ex caule florifera. *Lichenaſtrum Trichomanis facie polyanthemum breve & repens* EJ. p. 485. t. 70. f. 9. in terra & ligno putrido.

1871 JUNGERMANNIA foliis pinnatis ovatis, confertis, ex apice florifera. *Lichenaſtrum Trichomanis facie minus ab extremitate florens* EJ. p. 486 t. 70. f. 10. ad terram.

1872 JUNGERMANNIA foliis imbricatis, lanceolatis, ſuperne planis, alternis, inferne concavis quinque-

fariis.

Jungermannia

fariis. *Lichenastrum arboris vitæ facie, foliis minus rotundis* DILLEN. p. 505. t. 22. n. 32. & β. *Lichenastrum arboris vitæ facie, foliis rotundioribus* EJ. p. 502. t. 72. f. 33. ad arbores & rupes.

1873 JUNGERMANNIA foliis imbricatis, rotundis, superne alternis, convexis, inferne quadrifariis. *Lichenastrum imbricatum Tamarisci Narbonensis facie* EJ. p. 499. t. 72. f. 31. ad arbores & rupes.

1874 JUNGERMANNIA foliis imbricatis, alternis, orbiculatis, setis brevissimis. *Lichenastrum imbricatum minimum, squamis convexo concavis* EJ. p. 497. t. 72. f. 27. iisdem locis.

1875 JUNGERMANNIA foliis amplexicaulibus aristatis.† alpina & montana.

1876 JUNGERMANNIA minima durior, foliis auriculatis bicuspidatis †. subalpina.

1877 JUNGERMANNIA foliis bifidis, in ramo florifero majoribus. *Jungermannia minor repens, foliis subrotundis bifidis, vagina floris cylindracea,* MICHELI t. 5. f. 13. vulgo ad terram & arbores.

1878 JUNGERMANNIA foliis bifidis, ex medio caule multiflora. *Lichenastrum pinnulis acutissime bifidis minimum* DILLEN. p. 488. t. 70. f. 13. similibus locis.

1879 JUNGERMANNIA minima, ramosa, polyanthos foliis imbricatis trifidis. *Lichenastrum multifidum exiguum, ad basin florens, per siccitatem imbricatum* EJ. p. 494. t. 71. f. 24. in terra & corticibus.

1880 JUNGERMANNIA minima, foliis capillariter multifidis. *Lichenastrum trichoides minimum ab extremitate florens* EJ. p. 505. t. 73. f. 37. in cavis semitis.

1881 JUNGERMANNIA caule pinnato, foliis crispis, capillariter multifidis. *Lichenastrum filicinum pulchrum villosum* EJ. p. 503. t. 73. f. 35.

1882 JUNGERMANNIA caule filiformi, foliis adpressis inconspicuis. *Lichenastrum alpinum Bryi julacei argentei facie* EJ. p. 506. t. 73. f. 38. alpina.

1883 JUNGERMANNIA fronde foliacea, obtuſe lobata, ex medio florifera. *Lichenaſtrum capitulis rotundis e foliorum medio egredientibus* DILLEN. p. 508. t. 74. f. 44. ad argilloſos ſtagnorum & rivorum aggeres.

1884 JUNGERMANNIA fronde folioſa lacera, ex oris florifera. *Lichenaſtrum capitulis oblongis, juxta foliorum diviſuras enaſcentibus* EJ. p. 509. t. 74. f. 42. ſimilibus locis.

1885 JUNGERMANNIA foliis linearibus dichotomis, inferne florifera. *Lichenaſtrum tenuifolium furcatum thecis globoſis piloſis* EJ. p. 512. t. 74. f. 45. ad arborum radices.

1886 JUNGERMANNA fronde plana, pinnata, dichotoma, ramulis breviſſime bicornibus. *Lichenaſtrum aquaticum fluitans tenuifolium furcatum* EJ. p. 511. t. 74. f. 47. in ſtagnis Friedlingenſibus.

1887 JUNGERMANNIA foliis palmatis digitatis, ex baſi florifera. *Lichenaſtrum exiguum capitulis nigris lucidis e cotylis parvis enaſcentibus* EJ. p. 513. t. 74. f. 46. paſſim in ligno putrido.

1888 MARCHANTIA ſcyphis lunatis, capitulis quadrifidis. *Lunularia vulgaris* MICHEL. t. 4. f. 4. rarior ad terram cavarum ſemitarum.

1889 MARCHANTIA verrucis aſperis, capitulis conicis. *Hepatica vulgaris major &c.* MICHEL. p. 3. t. 2. f. 1. ad muros umbroſos.

1890 MARCHANTIA fronde crenata, capitulis conicis hirſutis. *Hepatica media capite hemisphærico*, MICHEL. p. 3. t. 2. f. 2. in ſubalpinis ad terram.

1891 MARCHANTIA linea frondem bipartiente, cyathis ſcobiferis ſerratis, ſetis umbellatis & ſtellatis decemfidis. *Marchantia major capitulo ſtellato &c.* MICHEL. p. 2. t. 1. f. 1. ad rupes & muros uvidos.

1892 MARCHANTIA fronde æquabili, cyathis ſerratis, bacillis umbellatis & ſtellatis octifidis. *Lichen domeſticus ſtellatus, æque ac umbellatus ac cyatophorus* DILLEN. p. 527. t. 77. f. 7. ſimilibus locis.

Marcuantia, Anthoceros, Riccia
Hydrophaca —

1893 ANTHOCEROS frondibus indivisis, sinuatis, levibus. *Anthoceros major* MICHEL. p. 11. t. 7. f. 1. circa Basileam.

1894 ANTHOCEROS fronde lineari, triplicato pinnata. *Anthoceros folio tenuissimo multifido* DILLEN. p. 477. t. 68. f. 4. Basileæ.

1895 RICCIA fronde reticulata, æquabili, lobis bipartitis, & tripartitis, lobulis triangularibus. in aquæ superficie. Michelfeldæ.

1896 RICCIA fronde reticulata æquabili, lobis denticulatis, obtusis, simplicibus & cordatis. *Riccia minor latifolia pinguis aspergine crystallina perfusa* MICHEL. t. 57. f. 3. inter hydrophacas.

1897 RICCIA fronde sulco divisa, lobis bifurcatis, lobulis lanceolatis obtusis. *Hepatica palustris bifurcata, foliis brevioribus carinatis* VAILLANT t. 19. f. 1.

1898 HYDROPHACE monorrhiza, foliis pulvinatis, inferne convexissimis. *Lenticula palustris major, inferne magis convexa, fructu polyspermo* MICHEL. p. 15. t. 11. f. 2. in aquarum stagnantium superficie.

1899 HYDROPHACE polyrrhiza, foliis ovatis planis. *Lenticularia major polyrrhiza, inferne atropurpurea.* circa Noville in fossis.

1900 HYDROPHACE monorrhiza, foliis planis ovatis. *Lenticularia minor monorhiza, foliis utrinque viridibus* MICHEL. p. 16. t. 11. f. 3. vulgatissima.

1901 HYDROPHACE caule filiformi, foliis elliptico lanceolatis viviparis. *Lenticularia ramosa monorhiza, foliis oblongis, pediculis longioribus,* MICHEL. p. 16. t. 11. f. 5. passim etsi non ubique, similibus locis.

XVII. CRUSTACEÆ.

f. LICHENES.

I. CORNICULATI & PYXIDATI.

1902 LICHEN corniculis simplicissimis acutis farinosis. *Coralloides*

Coralloides scyphiforme cornutum DILLEN. p. 92. t. 15. f. 16. varietas I. ad terram & cortices putridos vulgo.

1903 LICHEN cornubus acutis, farinosis, subramosis. *Coralloides vix ramosum scyphis obscuris* DILL. p. 90. t. 25. f. 14. & *L. tubulosus nivei fere candoris, apicibus recurvis, acutis* SCHEUCHZER *It. II.* p. 137. alpinus.

1904 LICHEN corniculo simplici, maximo, levi. *Lichen corniculatus omnium maximus* RAJ. *synops.* p. 68. subalpina.

1905 LICHEN corniculo simplici, duro, subaspero †. *Lichen tubulosus verrucosus ex obscuro virore florescens* SCHEUCHZER. *It. II.* p. 136. subalpina.

1906 LICHEN corniculo simplici verrucoso †. in sylvis.

1907 LICHEN corniculo simplici obtuso. *Coralloides scyphiforme ossis femoris facie* DILLEN. p. 91. t. 15. n. 5. alpinus.

1908 LICHEN corniculo simplici, apice depresso scutellato. *Coralloides scyphis gracilibus tubiformibus pedicularis folio* DILLEN. p. 85. t. 14. f. 10.

1909 LICHEN corniculis acute bifidis, scyphis imperfectis †.

1910 LICHEN corniculo subramoso fungifero. *Coralloides* 19. var. A. B. DILL.

1911 LICHEN corniculo spadiceo, scyphis cylindricis †.

1912 LICHEN scypho infundibuliformi simplici. *Lichen pyxidatus minor* VAILLANT. t. 25. f. 6. & *major* f. 8. vulgatissimus.

1913 LICHEN scyphiger infundibulis verrucosis. *Coralloides* 9. var. DILL.

1914 LICHEN scyphiger, verrucis racemosis †. *Lichen tubulatus albus &c.* MICHEL. p. 83. n. 4.

1915 LICHEN scyphiger, infundibulis serratis.

1916 LICHEN scyphiger infundibulis serratis coronatis. *Lichen non ramosus, acetabulis fimbriatis* MICHEL. t. 41. f. 5.

1917 LICHEN pyxidatus amplissimus. infundibulis incisis crenatis. †

1918

1918 LICHEN ſcyphiger infundibulorum fungis coccineis. *Coralloides ſcyphiforme tuberculis coccineis* DILLEN. p. 82. t. 14. f. 7. paſſim ad arbores putridas, etiam in torfaceis.

1919 LICHEN ſcyphiger infundibulorum fungis fuſcis. VAILLANT. t. 21. f. 11.

1920 LICHEN pyxidatus maximus, profunde diviſus, dentibus dentatis punctatis †.

1921 LICHEN ſcyphiger infundibulis ſpinoſis †.

1922 LICHEN cylindricus, fungo fuſco terminatus †.

1923 LICHEN infundibulis glabris proliferis VAILLANT. t. 21. f. 5. vulgo.

1924 LICHEN infundibulis ſerratis proliferis. *Coralloides ſcyphiforme gracile marginibus ſerratis* DILL t. 14. f. 8. p. 81.

1925 LICHEN infundibulis proliferis ſerratis, folioſis & verrucoſis †.

1926 LICHEN pyxidatus, extus prolifer †.

1927 LICHEN infundibulis proliferis, fungis coccineis. *Coralloides ſcyphiforme tuberculis coccineis* DILL. p. 82. t. 14. f. 7. in lignis & paludoſis.

1928 LICHEN infundibulis proliferis, fungulis atrofuſcis VAILLANT. t. 21. f. 10.

1929 LICHEN infundibulis proliferis, folioſis & fungoſis. *Coralloides ſcyphiforme marginibus radiatis & foliatis* DILL. p. 85. t. 14. f. 9.

1930 LICHEN aſper, infundibulis gracilibus, corniculis folioſis & verrucoſis fungiferis †. montana.

1931 LICHEN infundibulis tubiformibus proliferis †.

1932 LICHEN infundibulis foliatis punctatis †. MICHEL. t. 42. f. 3. alpina.

1933 LICHEN triplicato prolifer, ſcyphis anguſtis folioſis †.

1934 LICHEN infundibulis explanatis fungiferis. *Coralloides ſcyphiforme foliis alcicornibus cartilaginoſis* DLL. p. 87. f. 14. montana.

1935 LICHEN fronde ſemipinnata, rotunde lobata, ex medio ſcyphigera †. MICHELI t. 42. f. 1.2. ſubalpina.

1936 LICHEN pyxidatus prolifer, multiformis, ſcyphis folioſis, cylindrici, & ſpinuloſis.†

1937

1937 LICHEN infundibulis proliferis palmatis, ferratis & punctatis †. *Coralloides cornucopioides incanum scyphis cristatis* DILLEN. p. 94. t. 15. f. 17.

1938 LICHEN pyxidatus difformis, acetabulis cornigeris. *Coralloides crassius, subincanum, calycibus dentatis* EJ. p. 95. t. 15. f. 18.

1939 LICHEN infundibulis palmatis, fungulis coccineis. *Coralloides ramulosum, tuberculis coccineis* EJ. p. 95. t. 15. f. 19.

1940 LICHEN corniculatus bicornis & tricornis, puncto coccineo terminali †.

1941 LICHEN verrucosus, bicornis & tricornis, fungulis fuscis terminatis. *Coralloides parum ramosum, tuberculis fuscis* DILLEN. p. 97. t. 15. f. 20. in sylvis.

1942 LICHEN verrucosus minimus, infundibulis bifidis & trifidis, fungis fuscis terminalibus †.

1943 LICHEN asper, infundibulis gracilibus, corniculis ramosis. *Lichen pyxidatus & ramosus prolifer e viridi sordide lutescens* MICHEL. p. 80. t. 41. f. 1.

1944 LICHEN caulibus scyphigeris & corniculatis, corniculis ramosis. *Lichen pyxidatus & corniculatus albidus minor & gracilior* EJUSD. p. 86. n. 7.

1945 LICHEN corniculis erectis ramosis, infundibulis gracilibus. *Lichen pyxidatus & corniculatus cinereus angustior & elatior corniculis longioribus* EJUSD. t. 41. f. 3. & f. 4.

1946 LICHEN infundibulis proliferis & corniculatis erectis. *Coralloides scyphiforme, serratum elatius caulibus gracilibus glabris* DILLEN.

1947 LICHEN cornutus, scyphis cornigeris & fungosis. †

1948 LICHEN spadiceus, caulibus foliosis, scyphigeris & corniculatis †.

1949 LICHEN pyxidatus serratus, cornubus ramosis subpyxidatis †. alpinus.

1950 LICHEN pyxidatus & corniculatus spadiceus tuberculosus †.

1951 LICHEN prolifer & corniculatus, corniculis brevissime digitatis, fungiferis †. *Lichen pyxidatus ramosus, acetabulis fimbriatis* MICHEL. p. 81. n. 10. & *Lichen* t. 41. n. 7. f. 5. subalpinus.

II. LICHENES CORALLOIDEI.

1952 LICHEN fruticoſus, vage ramoſus, folioſus, extremis ramis palmatis, fungiferis. *Coralloides ſparſum, cauliculis tortuoſis & ſpinoſis* DILLEN. p. 101. t. 16. f. 25. vulgaris.

1953 LICHEN coralloides folioſus & palmatus, ramis confertis, folioſis, bifidis, fungiferis †. alpinus.

1954 LICHEN caule fruticoſo, ſubfolioſo, ramis adſcendentibus, repetito bifurcatis, punctiferis. *Coralloides corniculis brevioribus & crebrioribus* DILLEN. p. 104. t. 16. f. 22.

1955 LICHEN caule fruticoſo, erecto, ramis adſcendentibus dichotomis. *Coralloides corniculis longioribus & rarioribus* EJ. p. 102. t. 16. n. 26. in montanis.

1956 LICHEN caule fruticoſo, folioſo, ramis ſubnutantibus, minute multifidis, fungiferis. *Coralloides fruticuli ſpecie candicans corniculis rufeſcentibus* EJ. p. 110. t. 16. f. 30.

1957 LICHEN fruticoſus, farinoſus, ſurculis innumeris nutantibus. *Coralloides montanum, fruticuli ſpecie ubique candicans* EJ. p. 107. t. 16. f. 29. in ſylvis.

1958 LICHEN corniculatus verrucoſus, incanus, intus anthracinus, fungis minimis †.

1959 LICHEN fruticoſus, levis, perforatus, ſpinoſus, ramulis punctiferis. *Coralloides perforatum majus molle & craſſum* DILLEN. p. 98. t. 16. f. 2. montana.

1960 LICHEN fruticoſus, levis, perforatus. cauliculis palmatis breviſſimis. *Coralloides perforatum minus & tenue* EJ. p. 99. t. 16. f. 22.

1961 LICHEN caule fruticoſo, compreſſo, ramoſiſſimo, ramulis punctiferis †. *Lichen coralloides tubuloſus alpinus major &c.* MICHEL. p. 80. n. 9. alpinus.

1962 LICHEN caule fruticoſo, ramoſo, erecto, denſiſſime ceſpitoſo †. *Coralloides minimum fragile Madreporæ inſtar naſcens* DILLEN. p. 101. t. 16. f. 25. in montoſis.

1963

1963 LICHEN caule fruticoſo, fungifero, tecto verrucis calcariis. *Coralloides criſpum & botryforme alpinum* DILLEN. p. 114. t. 17. f. 32. alpina edita.

1964 LICHEN fruticoſus, levis, diffuſus, ramoſiſſimus flavus, ramulis liventibus. † alpina edita.

1965 LICHEN fruticoſus, durus, caſtaneus, ſurculis ſpinoſis †. *Coralloides fruticuli ſpecie fuſcum ſpinoſum* DILL. p. 112. t. 17. f. 31. alpina.

III. USNEÆ.

1966 LICHEN fruticoſus, durus, niger, repetito dichotomus. *Coralloides corniculatum fuci tenuioris facie* DILLEN. p. 118. t. 17. f. 37. alpina.

1967 LICHEN fruticoſus minimus, flexuoſus, cauliculis nigris capillaceis. *Uſnea nigræ lanæ ſimilis, ſaxis adnaſcens* EJ. p. 66. t. 12. f. 8. alpina & montana.

1968 LICHEN barbatus, pendulus, filamentis nigris prolixis. *Uſnea jubata nigricans* DILL. *ſylv.* p. 64. t. 12. f. 7. alpinæ & montanæ arbores.

1969 LICHEN fruticoſus, diffuſus, caulibus vagis, flexuoſis, rigidis, teretibus. *Uſnea rigida borſum verſum verſa* EJ. p. 66. t. 13. f. 10. alpina.

1970 LICHEN barbatus trunco articulato levi. *Uſnea barbata loris tenuibus fibroſis* EJ. p. 63. t. 16. f. 6. in alpinis fruticibus.

1971 LICHEN pendulus, teres, exaſperatus, ſcutellis radiatis. *Uſnea vulgaris loris longis implexis* EJ. p. 56. t. 11. f. 1. vulgaris.

1972 LICHEN barbatus, ramis teretibus, ſurculis parallelis ſimplicibus, ſcutellis radiatis. *Uſnea vulgatiſſima tenuior & brevior cum orbiculis* EJ. p. 69. t. 13. f. 13. vulgatiſſimus.

1973 LICHEN barbatus, teretibus cauliculis, ramis ſimplicibus parallelis. *Uſnea vulgatiſſima tenuior & brevior, ſine orbiculis* EJ. p. 67. t. 13. f. 12.

IV. LACUNATI. CYPRII.

1974 LICHEN ramoſus aureus, cauliculis planis lacunatis, farinoſis, cornutis †. alpinus.

1975 LICHEN ramoſus, lacunatus, flaccidus. *Uſnea mollis ramis longis compreſſis* DILLEN. p. 62. t. 12. f. 1. alpinus & montanus.

1976 LICHEN cornubus planiuſculis ovatis, ſuperne farinoſis, inferne atris & reticulatis. *Lichenoides cornutum amarum, ſuperne cinereum inferne nigrum* EJ. p. 157. t. 21. f. 52. alpina & montana.

1977 LICHEN convexo concavus, lacunatus & glaber, ramis criſpis ſubluteis. *Lichenoides lacunoſum, candidum, glabrum, endiviæ criſpæ facie* EJ. p. 163. t. 21. f. 56. alpinus & montanus.

1978 LICHEN fronde convexa, ciliata, puſtulata, obtuſe ramoſa, utrinque levi, ramis breviſſime bicornibus. *Lichenoides rigidum Eryngii folia referens* EJ. p. 209. t. 28. f. 111. alpina & montana.

1979 LICHEN fronde convexa, oris plicatis, ramis brevibus, obtuſe lobatis †. *Lichenoides Eryngii folia referens, tenuioribus & criſpioribus foliis* EJ. p. 212. t. 28. f. 112. alpina & montana.

1980 LICHEN corniculatus, planus, ramulis capillaribus, ſcutellis petiolatis. *Lichenoides hiſpidum majus & rigidum ſcutellis nigris* EJ. p. 150. t. 20. f. 45. ad arborum cortices.

1981 LICHEN lacunoſus, complanatus, ramis acutiſſimis, orbiculis farinoſis, marginalibus, frequentiſſimis. *Lichenoides ſegmentis anguſtioribus, ad margines muſcoſis & pulverulentis* EJ. p, 172. t. 22. f. 63. vulgo ad arbores.

1982 LICHEN . . . cornua damæ referens anguſtifolius VAILLANT. t. 20. f. 7. ibid.

1983 LICHEN utrinque lacunatus, complanatus, farinoſus & ſcutellifer. *Lichenoides coralliforme roſtratum & canaliculatum* DILLEN. p. 170. t. 21. f. 62.

1984

1984 LICHEN complanatus, utrinque lacunatus, undique farinofus. *Lichenoides cornutum bronchiale molle fubtus incanum* DILLEN. p. 160. t. 21. f. 55.

1985 LICHEN utrinque lacunatus, fronde latiffima, fcutellis creberrimis. *Lichenoides longifolium rugofum rigidum* EJ. p. 165. t. 22. f. 9.

1986 LICHEN lacunatus, inferne gibbofus, reticulo farinofo, fcutellis lateralibus. *Lichenoides pulmonarium reticulatum vulgare marginibus peltiferis* EJ. p. 212. t. 29. f. 113. Omnes ad arborum cortices.

1987 LICHEN lacunatus exafperatus, inferne villofus & fcutellifer †. *Lichenoides polyfchides villofum & fcabrum peltis parvis* EJ. p. 199. t. 27. f. 101. ad rupes.

V. ANTILYSSI.

1988 LICHEN fronde fubrotunde lobata, inferne reticulata, peltis convexo concavis. *Lichenoides cinereum digitatum lactucæ foliis finuofis* DILLEN p. 200. t. 27. f. 102. ad terram.

1989 LICHEN fronde obtufe lobata, inferne fcabra, maculis rotundis varia †. *Lichenoides pulmoneum villofum, fuperficie fcrobiculata & peltata* EJ. p. 216. t. 29. f. 114.

1990 LICHEN fronde rotunde lobata, inferne villofa, peltis erectis convexo concavis †. *Lichenoides digitatum rufefcens foliis lactucæ crifpis* EJ. p. 203. t. 27. f. 103.

1991 LICHEN fronde rotunde lobata, peltis planiffimis. *Lichenoides fubfufcum, peltis horizontalibus planis* EJ. p. 205. t. 25. f. 104.

1992 LICHEN fronde obtufe lobata, fuperne verrucofa, inferne villofa. *Lichenoides digitatum, læte virens, verucis nigris notatum* EJ. p. 207. t. 28. f. 106. omnes ad arbores & terram mufcofam.

1993 LICHEN flabelliformis, fubtus reticulatus, fcutellis marginalibus planis. *Lichenoides parvum vires-*

virescene peltis nigricantibus planis, DILLEN. p. 208. t. 28. f. 109. ad terram.

1994 LICHEN fronde rotunde lobata, plana, subtus venosa, miniata. *Lichenoides subtus croceum, peltis adpressis* EJ. p. 221. t. 29. f. 120. alpina summa.

VI. PULMONARII.

1995 LICHEN fronde coriacea, rotunde lobata, scutellis inmersis. *Lichenoides lichenis facie, acetabulis inmersis* DILLEN. p. 221. t. 30. f. 121. ad rupes roridas.

1996 LICHEN fronde cinerea, inferne lacunata, arbusculis superne nigris. *Lichenoides pustulatum cinereum & veluti ambustum* DILLEN. p. 226. t. 31. f. 131. alpina & montana.

1997 LICHEN fronde coriacea, inferne pustulata, villosa, scutellis atris †. *Lichenoides coriaceum, latissimo folio umbilicato & verrucoso* DILLEN. p. 545. t. 82. f. 5. montana.

1998 LICHEN fronde rotunde lobata, inferne nigerrima glebosa. *Lichenoides coriaceum cinereum, peltis atris compressis* DILLEN. p. 219. t. 30. f. 17.

1999 LICHEN fronde imbricata, rotunde lobata, cinerea, punctata, inferne ochrea subaspera t. 42. f. 2. *Lichenoides coriaceum nebulosum cinereum punctatum subtus fulvum* DILLEN. p. 223. t. 30. f. 127. ad rupes subalpinas.

2000 LICHEN fronde imbricata, subrotunda, punctata, inferne villosa, atris scutellis t. 47. f. 4. *Lichenoides pullum superne glabrum inferne nigrum & cirrhosum* DILLEN. p. 226. t. 30. f. 129. rupes subalpinæ.

2001 LICHEN lapideus crispus, coloris utrinque schistei t. 47. f. 5. alpina & montana.

2002 LICHEN fronde rotunde lobata virente, inferne scabra †. *Lichenoides laete virens, scutellis fulvis* DILLEN. t. 25. f. 48. ad terram alpinam.

2003 LICHEN pulmonarius latifolius, utrinque glaber, inferne lignei coloris, scutellis fuscis depressis, polline

polline rubro aurantio adſperſus. circa *Ragaz.*

2004 LICHEN fronde rotunde lobata, inferne ſcabra, arbuſculis obſcuris †. *Lichenoides ſubglaucum cumatile, foliis tenacibus eleganter laciniatis*, DILLEN. p. 197. t. 26. f. 99. ad terram.

2005 LICHEN fronde rotunde lobata, rugoſa, inferne atra & aſpera. *Lichenoides caperatum roſacee expanſum e ſulfureo virens* DILLEN. p. 193. t. 25. f. 97.

2006 LICHEN viridis concolor, ſcutellis planis ſerratis †. ad arbores.

2007 LICHEN fronde laciniata & criſpa, inferne atra & aſpera. *Lichenoides endiviæ foliis criſpis & ſplendentibus ſubtus nigricantibus* DILL. p. 192. t. 25. f. 96. perinde.

2008 LICHEN fronde rotunde lobata, glauca, polline concolore ſcabra, ſubtus hirta & atra †. MICHELI t. 45. f. 1.

2009 LICHEN cartilagineus, ſcutellis congeſtis cervinis, fronde brevi, rotunde lobata †. *Lichenoides cartilagineum ſcutellis fulvis planis*, DILLEN. p. 179. t. 24. f. 74. ad alpinam humum.

2010 LICHEN foliis anguloſis imbricatis calcariis ſpadiceis t. 47. f. 1. *Lichen pulmonarius terreſtris clypeatus minimus & indiviſus vireſcens*, MICHEL. n. 36. f. 3. ſubalpinus.

2011 LICHEN ſubviridis, fronde ſemipinnata, rotunde lobata, lineis pulverulentis reticulata, inferne ſcabra, carbonaria. *Lichenoides vulgatiſſimum cinereo glaucum, lacunatum & cirrhoſum* DILL. p. 188. t. 24. f. 83. ad arbores.

2012 LICHEN criſpus, convolutus, fronde olivacea, ſcrobiculoſa, marginibus polliniferis. †

2013 LICHEN fronde ſemipinnata, rotunde lobata, olivacea, ſcutellis levibus †. *Lichenoides olivaceum ſcutellis levibus* DILLEN. p. 77. t. 24. f. 77.

2014 LICHEN fronde ſemipinnata, rotunde lobata, olivacea, pulla, ſcutellis crenatis. *Lichenoides olivaceum ſcutellis amplioribus verrucoſis* DILL. p. 84. t. 24. f. 78. ad arbores uterque.

2015 LICHEN fronde ſemipinnata, rotunde lobata, craſſe villoſa, ſcutellis peramplis *Lichenoïdes imbricatum viridans, ſcutellis badiis* DILLEN. p. 180. t. 24. f. 75. ad arbores & ſaxa.

2016 LICHEN fronde ſemipinnata, rotunde lobata, cinerea, ſcutellis nigris. *Lichenoides glaucum orbiculare, ſegmentis latiuſculis, ſcutellis nigris* DILL. p. 177. t. 24. f. 71. perinde.

2017 LICHEN fronde ſemipinnata, cinerea, obtuſe lobata, ſcutellis glaucis nigreſcentibus. *Lichenoides cinereum ſegmentis argutis ſtellatis, ſcutellis nigris* DILLEN. p. 176. t. 24. f. 70. ibidem.

2018 LICHEN fronde ſemipinnata, cava, cornubus pulverulentis. *Lichenoides ceratophyllon obtuſum & minus ramoſum* DILLEN. p. 154. t. 20. f. 49. itidem vulgo.

2019 LICHEN fronde ſemipinnata, canaliculata, cinerea †. *Lichenoides hiſpidum minus & tenuius ſcutellis nigris* DILLEN. p. 152. t. 20. f. 46. & L. 48. EJ. p. 154. ad cortices arborum.

2020 LICHEN fronde laciniata, undique nigerrima, ſcutellis concoloribus. *Lichenoides tinctorium atrum foliis minimis criſpis* DILLEN. p. 188. t. 24. f. 81. alpinus & montanus.

VII. PSORÆ.

2021 LICHEN fronde rugoſa, rotunde lobata, flava, concolore. *Lichen Dioſcoridis & Plinii ſecundus colore flaveſcente* COLUMN. *ecphraſ. I.* p. 330. 331. ad muros & arbores.

2022 LICHEN fronde calcaria, pulpoſa, miniata, laciniata, lobis linearibus †. *Lichenoides tenuiſſimum, ſcutellis exiguis miniatis* DILLEN. p. 175. f. 68. in rupibus alpinis & montanis.

2023 LICHEN fronde laciniata, rotunde lobata, flava, concolore. *Lichenoides cruſtoſum, orbiculis & ſcutellis flavis* DILLEN. p. 116. f. 18. ad muros & rupes.

2024 LICHEN fronde laciniata, adpreſſa, cervina, con-

concolore †. *Lichenoides crustosum orbiculare incanum* DILLEN. p. 135. f. 17. ad saxa & arbores.

2025 LICHEN fronde viridi, verrucosa, obscure lobata †. ad cortices.

2026 LICHEN quisquiliaris, fronde cinerea, scabra, ramis brevibus, acutis, scutellis nigerrimis †. *Lichen terrestris minimus, fruticosus cinereus* MICHEL. p. 78. t. 53, f. 8. Muscis innatat.

2027 LICHEN friabilis, obtuse lobatus, luteus, scutellis fuscis †. ad terram glareosam.

2028 LICHEN foliis pulposis, calcariis, glauco polline villosis, scutellis atris †. ad rupes.

2029 LICHEN saxatilis, undosus, niveus †. in saxis alpinis.

2030 LICHEN undosus purpurascens †. ad cortices.

2031 LICHEN foliis pulposis, calcariis, fuscis, imbricatis, scutellis nigris †. *Lichen alpinus glaucus squamis crassis & brevissimis Enum.* t. 47. f. 3, DILLEN. p. 228. t. 30.

VIII. NOSTOCH.

2032 LICHEN atrocæruleus laciniatus & ciliatus. *Lichen terrestris minimus fuscus* VAILLANT. t. 20. f. 15. in sylvis.

2033 LICHEN nigerrimus, sessilis, obtuse lobatus †. ad corticem.

2034 LICHEN albidus, laciniatus, lobis acutis †. *Tremella terrestris cornuta* DILLEN. p. 52. t. 10. f. 12. in alveo fontis.

2035 LICHEN schisteus, crispus, acute laciniatus, scutellis ex fusco rubentibus †. *Lichen saxatilis ex cæruleo nigricans crispus Enum.* t. 74. f. 5. in muris & saxis.

2036 LICHEN gelatinosus viridis, exasperatus †. *Lichenoides gelatinosum lobis crassioribus fuscoviridibus* DILL. p. 158, t. 19. f. 22. montanus.

2037 LICHEN gelatinosus, membranaceus, exasperatus, convolutus, atroviridis, scutellis rubris †

Lichenoides gelatinoſum , membranaceum tenue nigricans Dill. p. 139. t. 19. f. 20. ad aſſeres ſiccos.

2038 LICHEN gelatinoſus niger, undoſus & criſpus †. *Lichen arboreus membranaceus nigricans* Buxbaum. *Comm. petrop.* T. III. p. 273. t. 14. f. 3. ad terram, locis macilentis.

2039 LICHEN gelatinoſus, ramoſus, laciniatus, ſcutellis rubris †. *Lichenoides gelatinoſum fuſcum Jacobeæ maritimæ diviſura* Dillen. p. 140. t. 19. f. 25. ad terram.

2040 LICHEN niger undatus cruſtaceus †.

2041 LICHEN gelatinoſus, plicatus, undulatus, laciniis criſpis, granuloſis. *Tremella terreſtris, ſinuoſa pinguis & fugax* Dill. *ſylv.* p. 52. t. 10. f. 11. abunde in glareoſis.

IX. SCUTELLATI CRUSTACEI. HERPETES.

2042 LICHEN cruſta tenace verrucoſa albida fungis incarnatis. *Coralloides fungiferum candidum baſi lignoſa* Dillen. p. 76. t. 14. f. 1. in cavis ſemitis.

2043 LICHEN cruſta tenace verrucoſa fungis fuſcis †. *Coralloides fungiforme fuſcum baſi foliacea* Dill p. 77. t. 14. f. 2. perinde.

2044 LICHEN cruſta verrucoſa, cinerea, ſcutellis carneis planis †. non rarus in putridis arboribus.

2045 LICHEN cruſta verrucoſa, olivacea, ſcutellis rubris ſerratis †, in radicibus arborum.

2046 LICHEN cruſta farinacea, verrucoſa, glauca, ſcutellis flavis planiſſimis †. in vallo urbano.

2047 LICHEN cruſta farinoſa, ſcutellis ſordide rufis planiſſimis. *Lichen cruſtaceus, farinaceus, arboribus adnaſcens, verrucoſus candidus receptaculis florum ruſeſcentibus* Michel. p. 96. n. 2.† ad arbores & rupes.

2048 LICHEN verrucoſus tenax, albus, ſcutellis excavatis marginatis, concoloribus †. *Lichenoides leproſum*

leprosum tinctorium scutellis lapidum cancri figura DILLEN. p. 130. t. 18. f. 10.

2049 LICHEN crusta tenace, verrucosa, cinerea, scutellis rufis marginatis. *Lichenoides crustaceum leprosum scutellis subfuscis* DILLEN. p. 134. t. 18. f. 16.

2050 LICHEN crustaceus tartareus, glaucus, scutis difformibus planis, creberrimis. ad rupes alpinas.

2051 LICHEN crusta tenace alba, scutellis sessilibus atris †. passim ad rupes.

2052 LICHEN crustaceus ater, scutellis inferne excavatis. †

2053 LICHEN crusta verrucosa, areis polygoniis punctiferis †. *Lichenoides verrucosum & rugosum cinereum glabrum* DILLEN. p. 128. t. 18. f. 9. ad saxa & arbores.

2054 LICHEN crusta verrucosa tenace, fusca, scutellis spadiceis nitidis. *Lichenoides tartareum lividum, scutellis rufis margine exili* DILLEN. p. 134. t. 18. f. 14. in muris & saxis.

2055 LICHEN crusta tenui farinosa rimosa, punctata, scutellis atris †. *Lichenes* MICHELI t. 54. f. 3. 7. 8.

2056 LICHEN crusta glauca, tenace, verrucosa †. *Lichenoides crustaceum & leprosum, scutellis nigricantibus majoribus & minoribus*, DILLEN. p. 133. t. 15. f. 15. ad calcem in parietinis.

2057 LICHEN sessilis, scutellis sordide virentibus, oris albis †.

2058 LICHEN saxatilis, crusta verrucosa flava, scutellis concoloribus †. in duro saxo prope *Yvorne.*

2059 LICHEN crusta inseparabili, reticulata, cinerea, scutellis nigris minutissimis †. ad saxa.

2060 LICHEN crusta tartarea albissima, scutellis nigris marginatis †. in duro lapide.

2061 LICHEN crusta tartarea albissima, scutellis nigris. † in lateribus & saxis.

2062 LICHEN crusta farinacea, inseparabili, cinerea, scutis nigerrimis confertis. in saxis.

2063 LICHEN crusta inseparabili flava, scutellis nigris confluentibus. *Lichenoides nigro flavum tabulæ* geo-

geographicæ instar pictum DILLEN. t. 18. f. 5. ad ſaxa.

2064 LICHEN cruſta inſeparabili, farinoſa, cinerea, villoſa, ſcutellis atris †. in ſaxis arenoſis.

2065 LICHEN cruſta farinacea vireſcente, ſcutellis atris. *Lichenoides leproſum, cruſta cinereo vireſceate, tuberculis nigerrimis* DILLEN. p. 126. t. 18. f. 3. in ligno putrido.

2066 LICHEN cruſta verrucoſa, cinerea, ſcutellis nigerrimis planis †. in cortice arborum.

2067 LICHEN cruſta tenerrima, ſcutellis hemisphæricis viridibus †. in ligno putreſcente.

2068 LICHEN cruſta colliculoſa nigricante †. in cortice.

2069 LICHEN cruſta farinoſa, tenuiſſima, albida, ſcutellis nigris †. perinde.

2070 LICHEN cruſta tenuiſſima cinerea, ſcutellis fuſcis †. *Lichenoides leproſum tuberculis fuſcis & ferrugineis* DILL. p. 126. t. 18. f. 4.

2071 LICHEN cruſta tenuiſſima, ſcutellis hemisphæricis, albo polline efflореſcentibus †. etiam in cortice.

2072 LICHEN cruſta tenerrima, farinoſa, alba, atris punctis notata. etiam.

2073 LICHEN cruſta tenuiſſima, inſeparabili, ſubcarnea, ſcutellis ſanguineis ſubhirſutis †. in marmore.

2074 LICHEN cruſta miniata, tenerrima, inſeparabili, ſcutellis flavis marginatis †. ibidem.

2075 LICHEN cruſta nigerrima verrucoſa, ſcutellis maximis flavis †. in cote.

2076 LICHEN ſcutellis in ſaxum immerſis nigris †. *Lichenoides punctatum & rugoſum nigrum* DILL p. 125. t. 18. f. 2. in duro lapide.

2077 LICHEN ſubrubellus minimus, ſcutellis in ſaxum immerſis.

2078 LICHEN ſcutellis flavis, ſaxo immerſis †. in marmore.

2079 LICHEN bivalvis, de rimis efflореſcens, ater, characteriſticus. *Lichenoides cruſta tenuiſſima, pere-*

peregrinis veluti literis inſcripta DILL. t. 18. f. 1. in cortice.

2080 LICHEN ſtigmaticus, ſcutellis atris †. perinde.

X. CRUSTACEI ABSQUE SCUTELLIS LEPRÆ.

2081 LICHEN cruſtaceus ſaxatilis, omnium minimus, niger †. in ſaxo arenoſo.

2082 LICHEN minimus, atrocinereus, villoſus †. perinde.

2083 LICHEN nigerrimus, aſper †. etiam.

2084 LICHEN cruſta continua, aterrima, globulis ſubrotundis †. & iſte.

2085 LICHEN archipelagius †. in ſaxo.

2086 LICHEN verrucoſus, cruſtaceus, albus, orbiculis villoſis concoloribus †. *Lichenoides candidum & farinaceum ſcutellis fere planis* DILLEN. p. 131 t. 18. f. 11. in cortice.

2087 LICHEN verrucoſus, cinereus, orbiculis villoſis flaveſcentibus †. & iſte.

2088 LICHEN cruſtaceus tenax, verrucoſus, ſubcinereus †. & iſte.

2089 LICHEN cruſtaceus, verrucoſus viridis. *Byſſus botryoides ſaturate virens* DILLEN. p. 31. t. 1. f. 5. in murorum ſcrobibus.

2090 LICHEN cruſtaceus, iridis odore, ruberrimus. *Lapis violaceus ſylvæ hercyniæ* BRUKMAN. diſſ. ad duros lapides.

2091 LICHEN cruſtaceus rimoſus verrucoſus cinereus †. in cortice.

2092 LICHEN farinaceus, mollis, albicans, villis effloreſcens †. late per terram.

2093 LICHEN farinaceus, mollis, albus, globulis ſphæricis. *Byſſus candidiſſima calcis inſtar muſcos veſtiens* DILL. p. 2. t. 1. f. 2. ad terram.

2094 LICHEN farinaceus, mollis albicans, glebis difformibus †. *Byſſus pulverulenta, incana farinæ inſtar ſtrata* DILLEN. p. 3. t. 1. f. 3.

2095 LICHEN farinoſus arboreus candicans †. *L. cruſtaceus arboribus adnaſcens, neque ramoſus, neque verrucoſus, candidus pulviſculo concolore adſperſus* MICHEL. p. 99. t. 53. f. 7.

2096 LICHEN cruſta tenuiſſima flava. *Byſſus pulverulenta flava, lignis adnaſcens* DILLEN. p. 3. t. 1. f. 4.

2097 LICHEN cruſta viridiſſima †. *Byſſus lanuginoſa æruginoſa* DILL. p. 4. t. 1. f. 8.

2098 LICHEN cruſta cinnabarina †. *L. cruſtaceus pulverulentus ruber, arboribus adnaſcens* MICHEL. p. 100. n. 73.

2099 LICHEN læte purpureus latiſſimis cruſtis & tenuiſſimis †. Hi omnes ad cortices & aſſeres.

2100 LICHEN omnium tenuiſſimus, late ſparſus, læte purpuraſcens †. in fungis putreſcentibus.

XVIII. FILAMENTOSÆ.

2101 BYSSUS viridis, filamentis ramoſis †. *Byſſus tenerrima viridis velutum referens* DILL. p. 7. t. 1. f. 14. ad terram & lapides.

2102 BYSSUS cærulea ceſpitoſa criſpa †. *Byſſus cærulea non ramoſa muſco innaſcens*, MICHEL. p. 212. t. 90. f. 8. ad rupes ſabuloſas.

2103 BYSSUS ſpadicea criſpa †. *Byſſus ſericea fulva perelegans tenuiſſima rimis tamen innaſcens & glebas circumveſtiens* MICHELI p. 211. t. 90. f. 4. ſimili loco.

2104 BYSSUS nigra velutina †. *Byſſus petræa nigerrima fibroſa* DILL. p. 9. t. 1. f. 18. Muſcis per alpes inſtrata.

2105 BYSSUS rupeſtris aurantia criſpa †. montana.

2106 BYSSUS ceſpitoſa, pulverulenta, crocea. *Byſſus petræa crocea glomerulis lanuginoſis* DILL. p. 8. t. 1. f. 18. in muris & ad rupes.

2107 BYSSUS longiſſima filamentis cervinis ramoſis †. in fungis putridis.

2108 BYSSUS longiſſima, tenerrima, nivea †. *Byſſus major ſpeluncis & cellis vinariis innaſcens &c.* MICHEL.

MICHEL. p. 211. t. 90. f. 1. in cuniculis ſubterraneis.

2109 CONFERVA pollinea purpurea aquæ innatans. in ſtagnis.

2110 CONFERVA pollinea globoſa gelatinoſa †. in aquis puris.

2111 CONFERVA cruſtacea gelatinoſa †. in alveis fontium ſalſarum.

2112 CONFERVA natatilis tenuiſſima iridis coloribus †. in aquis.

2113 CONFERVA cruſtacea tenerrima ſubviridis. *Byſſus latiſſima papiri inſtar ſuper aquam ſparſa* DILL. p. 21. t. 1.

2114 CONFERVA ceſpitoſa, filis rectis, undique divergentibus †. *Conferva minima Byſſi facie*, DILL. p. 14. t. 2. f. 3. in lapidibus rivorum.

2115 CONFERVA filamentis ſimpliciſſimis æqualibus, longiſſimis. *Conferva fluviatilis ſericea vulgaris & fluitans* DILL. p. 12. t. 2. f. 2. in rivulis.

2116 CONFERVA filamentis ſimpliciſſimis duriuſculis. † *Conferva paluſtris craſſior & varie extenſa* DILL. p. 13. t. 2. f. 2.

2117 CONFERVA dichotoma ſetis porcinis ſimilis DILL. p. 17. t. 3. f. 9. non ſatis certa civis.

2118 CONFERVA filamentis tenuibus, ramoſis, intricatis, fuſcis. *Conferva rivulorum capillacea denſiſſime congeſtis ramulis* DILL. p. 21. t. 4. f. 15. in rivis.

2119 CONFERVA reticulata DILLEN. p. 20. t. 4. f. 14. Baſileæ in aquis tranquillis.

2120 CONFERVA pilis tenerrimis, vellere goſſypiaceo. *Conferva paluſtris bombycina* DILL. p. 18. t. 3. f. 11 in aquis ſtagnantibus.

2121 CONFERVA cruſta continua, pellicea, filis planis ſtipatis †. *aux Combes de Valanvron.*

2122 CONFERVA foliis craſſiuſculis, rigidioribus, ſubarticulatis †. *Conferva fluviatilis fibrilloſa ſubrigida* DILL. p. 21. t. 4. f. 16. in rivis.

2123 CONFERVA coriacea obſcura †. *Tremella paluſtris veſiculis ſphæricis fungiformibus* DILLEN. p. 55. t. 10. f. 17.

Conferva, Tremella, Ulva — Mucilago, Fuligo, Embolus

2124 CONFERVA gelatinosa globulis punctatis concatenatis. *Conferva fontana nodosa spermatis ranarum instar lubrica major & fusca* DILLEN. p. 36. t. 7. f. 92. & EJUSD. n. 43. 44. 45. in rivulis purioriubs.

2125 TREMELLA viridissima, corniculis palmatis †. *Tremella palustris gelatinosa Damæ cornuum facie* DILL. p. 51. t. 10. f. 10. in fossis paludosis.

2126 TREMELLA plana, difformis, ramosa †.

2127 TREMELLA lobata & rugosa. *Tremella saxatilis gelatinosa & utriculosa* DILL. p. 54. t. 10. f. 16. in aquis palustribus.

2128 ULVA tubulis cylindricis, tuberosis. *Tremella maxima tuberosa intestinorum forma* DILL. p. 47 t. 9. f. 7. in aquis stagnantibus rarior.

XIX. FUNGI.

2129 MUCILAGO alba crustacea & filamentosa. *Mucilago crustacea alba* MICHEL. p. 216. t. 96. f. 2. & plures aliæ. ad terram.

2130 MUCILAGO plumosa nivea †. in fungis putridis.

1231 MUCILAGO cinerea, filis cespitosis, ramosis & non ramosis †. in lignis & corticibus.

2132 MUCILAGO miniata villosa minima †. alpina.

2132* MUCILAGO agminata, globosa, aurantia †.

2133 FULIGO butyracea, crocea, cauliculis ramosis, laciniatis †. *Spongia fugax mollis flava & amœna in pulvere coriario nascens Mem. de l'Acad.* 1727 in lignis putridis.

2134 FULIGO ovata, laminosa, albida †. *Mucor primus* SCHÆFFER. *fung.* t. 192. circa virgulta.

2135 FULIGO flava butyracea capitata †. in foliis putridis.

2136 EMBOLUS carneus †. *Lycoperdon spurium arboreum barbatum* BUXBAUM. *Hist. plant. Helv.* p. 204. in arborum corticibus.

2137 EMBOLUS nigerrimus albo villo adspersus. in ligno putrido.

2138 EMBOLUS albissimus. in ligno putrido.

2139 BO-

2139 BOTRYTIS cinerea racemis sphæricis. *Botrytis comata grisea caule simplici crassiori seminibus rotundis* MICHEL. t. 91. f. 1. in plantulis humectis sub prelo positis.

2140 BOTRYTIS flava simplex & ramosa †. An MICH. p. 91. f. 2. perinde,

2141 BOTRYTIS alba racemis sphæricis STÆH. MICH. f. 3.

2142 LYCOGALA sessile fulvum †. *Lycogala globosum granis pisi multitudine, æris recocti colore* MICHEL. p. 216. t. 95. f. 2.

2143 LYCOGALA sessile niveum †. ad terram.

2144 LYCOGALA petiolatum album aquosum †. in cuniculis subterraneis.

2145 LYCOGALA petiolatum aquosum flavescens †. in ossibus humanis.

2146 LYCOGALA petiolatum, niveum, opacum †. in ligno putrido.

2147 MUCOR petiolatus cinereus. *Mucor vulgaris, capitulo lucido, per maturitatem nigro, pediculo griseo* MICHEL. p. 215. t. 95. f. 1. in pane situm contrahente. &c.

2148 MUCOR petiolatus albus minimus, MICHEL. p. 215. t. 95. f. 1. in fungis humidis.

2149 MUCOR petiolatus albissimus, capitulo ovali †. in pruno putrescente.

2150 MUCOR sessilis globosus albus †. An *Mucilago* MICHEL. t. 96. f. 6.

2151 MUCOR sessilis globosus luteus †. in plantis humectis.

2152 ASPERGILLUS capitatus ochroleucos †. in cortice.

2153 ASPERGILLUS purpureus †.

2154 ASPERGILLUS capitulo subrotundo, seminibus subrotundis MICHEL. p. 212.

2155 ASPERGILLUS albus, pediculo articulato †.

2156 ASPERGILLUS petiolatus, capite cylindrico cinereo †.

2157 ASPERGILLUS ramosissimus, in globulos terminatus †. Hos Basileæ STÆHELINUS.

Botrytis, Lycogala, Mucor, Aspergillus
Trichia

2158 TRICHIA nigra petiolata, capitulo ſphærico †. in ligno putreſcente.

2159 TRICHIA nigra petiolis flexuoſis †.

2160 TRICHIA petiolo breviſſimo, capitulo ſphærico, cortice niveo, filamentis nigris *Enum.* t. 48. f. 2. †.

2161 TRICHIA petiolata, nigra, capitulo ſphærico, villo ochroleuco t. 48. f. 3. †.

2162 TRICHIA flava, petiolata, capitulo ſphærico †. *Lycoperdon omnium minimum ſplendide luteſcens* FABRIC. *butisbac.* p. 28.

2163 TRICHIA petiolata, rufa, capitulo ſphærico t. 48 f. 4. †.

2164 TRICHIA gregaria, purpurea, petiolata, capitulo ſphærico t. 48. f. 6. *Arcyria petiolo in volvam expanſo* HILL.

2164* TRICHIA petiolata, nigra, capitulo cylindrico †.

2165 TRICHIA petiolata, capitulo cylindrico, axi perforato. *Clathroidaſtrum obſcure purpureum majus* MICHEL. p. 214. t. 94. f. 1. & *minus* f. 2.

2166 TRICHIA gregaria, cinerea, petiolata, piriformis †.

2167 TRICHIA breviſſime petiolata, purpurea, piriformis *Enum.* t. 48. f. 5. †. An *Clathroides purpureum pediculo carens* MICHELI p. 214. t. 94. f. 2.

2168 TRICHIA gregaria, ſeſſilis, piriformis, flava t. 48 f. 7.

2169 TRICHIA gregaria, ſeſſilis, ſphærica, glauca †. Trichiæ in ligno fere putrido naſcuntur, hæc in Muſco.

2170 LYCOPERDON petiolo gracili, capite ſphærico, levi, papillato, perforato. *Lycoperdon Pariſienſe minimum pediculo donatum* I. R. H. t. 333. E. F.

2171 LYCOPERDUM totum exaſperatum, petiolo cylindrico, capitulo ſphærico †. *Lycoperdon album totum aſperum* MICHEL. p. 217.

2172 LYCOPERDUM ſaccatum cinereum, polline obſcure viridi. Hujus ſpeciei pene innumeræ varietates ſunt, adamantibus conſperſæ, leves, ſeſſiles, collo cylindrico, maximum &c. ad terram omnia.

2173

2173 LYCOPERDUM leve, miniatum, sphæricum. *Lycoperdon sanguineum sphæricum*, BUXBAUM. *Cent. V.* t. 29. f. 2. in asseribus.

2174 LYCOPERDUM cortice exteriori revoluto, stellato MICHELI t. 100. f. 1. 2. 3. 4. in sylvis ad terram.

2175 LYCOPERDUM corticibus revolutis stellatis, globo projectili. *Carpobolus aureus &c.* MICHELI t. 101. f. 2. in ligno putrido.

2176 LYCOPERDON saccatum nigerrimum, pulva flava, cellulis fimbriatis †. *Lycoperdoides* MICHEL. p. 219. t. 89. Basileæ STÆH.

2177 LYCOPERDON subterraneum, conglomeratum, cortice nigro. *Tubera* ZANON. t. 333. &c. in sylvis *de la Côte.*

2178 LYCOPERDON subterraneum, rugosum, congestum †. Fungi brassicæ in foliis sepultis nascentes.

2179 SPHÆRIA atrata, solitaria, minima †. in virgultis nudis.

2180 SPHÆRIA solitaria, scutellis nudis, atris, obtuse conicis †. *Lichen &c.* MICHEL. t. 54. f. 4. petinde.

2181 SPHÆRIA solitaria, mammiformis, olivacea †. *Lichenagaricus olivæ conditæ colore &c.* MICHEL. t. 55. f. 1.

2182 SPHÆRIA tenuissima, cinerea, sphærulis miniatis †.

2183 SPHÆRIA obscura, tuberculosa, sessilis †. Hæc in virgultis.

2184 SPHÆRIA nivea, plana, punctis nigricantibus. Icon OEDER. f. 288. in stercore equino.

2185 SPHÆRIA obscura, minima †. in virgultis.

2186 SPHÆRIA plana, carne alba †. *Lichenoides disciforme compressum lignis putridis adnascens*, DILLEN. *Sylv.* p. 127. t. 18. f. 7.

2187 SPHÆRIA atra, convexa, carne nigra †. *Lichenagaricus bullatus parvus, ex obscuro nigricans, sub cute emortuarum arborum* MICHEL. t. 54. f. 2.

Lycoperdon, Sphæria, Clavaria

2188 SPHÆRIA cruſtacea, nigerrima, tuberculoſa, foliis innaſcens t. 47. f. 8. GLEICHEN. *Reich der Pflanz. append.* t. 5.

2189 SPHÆRIA convexa miniata hirſuta †. *Lichenoides tuberculoſum amœne purpureum* DILLEN. p. 127. t. 18. f. 6. in virgultis.

2190 SPHÆRIA rubra fragi ſimilis t. 47. f. 10. perinde.

2191 SPHÆRIA ſubrotunda, tuberculis minimis, medulla atra pulverulenta. *Tubera cervina* LOBEL ic. p. 276. in montanis.

2192 SPHÆRIA maxima, convexa, nigerrima. *Lichenagaricus cruſtaceus craſſius bovillum quaſi renem referens, nigricans & veluti deuſtus* MICHEL. t. 54. f. 1. in dejectis arborum truncis.

2193 SPHÆRIA nigerrima, aſpera, petiolata, conica. *Lichenagaricus &c.* MICHEL. p. 104. t. 54. f. 4. 5. in aridis lignis.

2194 SPHÆRIA nigerrima, aſpera, palmata, cornubus planis, carnoſis, pulverulentis. *Lichenagaricus nigricans ligno innaſcens* &c. MICHEL. t. 55. f. 1. in arborum cortice.

β. Radix ejusdem. *Plante nouvelle* DODART. *anc. mem.* T. 10. p. 557. t. 4. f. 3. ſub arborum cortice.

2195 CLAVARIA ſimplex & ramoſa, ſubulata, vellere albo †. in ligno putreſcente.

2196 CLAVARIA caule ramisque cylindricis, fine craſſeſcente †. in ligno putrido ſubterraneo.

2197 CLAVARIA vertice multifido, ramis acutiſſimis. † *Corallofungus ornithopodioides* VAILLANT. p. 41. t. 8. f. 4. in ligno putreſcente.

2198 CLAVARIA caule dichotomo, ramis breviter bicornibus †. in gramineis.

2199 CLAVARIA caule ramoſo, ramis flexuoſis acutis. *Fungus parvus luteus ramoſus*, RAJ. *Syn. III.* t. 24. f. 7.

2200 CLAVARIA caule plano, ſulcato, ramis ſerratis †. *Coralloides minor criſtata* BUXBAUM. *Cent. IV.* t. 66. f. 1. in gramineis utraque.

2201

2201 CLAVARIA caule craſſiſſimo, ramis innumeris, ceſpitoſis, breviter dentatis. *Corallofungus flavus* VAILLANT. t. 8. f. 5. variat albo & ſubrubello colore. in ſylvis abiegnis.

2202 CLAVARIA rugoſa & tuberculoſa ramis obtuſis †. *Corallofungus candidiſſimus* VAILLANT. t. 8. f. 2. perinde.

2203 CLAVARIA alba, longe petiolata. *Clavaria ceſpitoſa major candida* MICHEL. t. 87. f. 10.

2204 CLAVARIA indiviſa flaveſcens plicata. *Clavaria major lutea* MICHEL. p. 208. t. 87. f. 1.

2025 CLAVARIA indiviſa viridis, rugoſa & compreſſa.† in ſylvis.

2206 CLAVARIA indiviſa nigra, compreſſa. *Clavaria ophioglоſſoides nigra* VAILLANT. t. 9. f. 3. in torfaceis.

2207 CLAVARIA lutea minima MICHEL. t. 87. f. 5.

2208 PUCCINIA minima, candidiſſima, ramoſa, bifurcata MICHEL. p. 20. t. 92. f. 2. †. in dejecto ligno.

2209 PUCCINIA flava, conica, fiſtuloſa †. in Sabina STÆH.

2210 PUCCINIA flava depreſſa †. STÆH.

2211 PUCCINIA nivea granis coccineis †. STÆH. omnes in arborum corticibus.

2212 CERATOSPERMUM nigrum, diſcoides, minimum, in diverſarum arborum corticibus &c. MICHELI p. 125. t. 56. f. 1.

2213 CERATOSPERMUM minimum, cornucopioides album & ſubhirſutum, ſeminibus incarnati coloris MICHEL. t. 36. f. 3. utrumque Cel. GAGNEBIN.

2214 CYATHUS hirſutus, intus ſtriatus. *Fungoides infundibuliforme ſemine fetum, interne ſtriatum, externe hirſutum* VAILLANT. t. 11. f. 4. 5. ad terram.

2215 CYATHUS ſericeus, intus levis †. *Fungoides infundibuliforme ſemine fetum* VAILL. t. 11. f. 6. 7 ad aſſeres ſiccos.

2216 PEZIZA membranacea, tubæ ſimilis, marginibus repli-

Puccinia, Ceratospermum, Cyathus, Peziza

replicatis. *Fungoides nigricans majus cornucopiæ forma* VAILLANT. t. 13. f. 22. in ſylvis.

2217 PEZIZA membranacea, tubæ ſimilis, marginibus erectis laceris †. *Elvela petiolata tubuloſa margine inæquali multifido* GLEDITSCH. p. 40. in ſylvis.

2218 PEZIZA bracteata, petiolo rugoſo, fronde ſanguinea, ſericea †. An *Fungoides auriculam Judæ referens, extus candicans & farinoſum*, VAILLANT. t. 11. f. 8. in ſylvis.

2219 PEZIZA ſeſſilis infundibuliformis, extus hirſuta, umbrina, intus nigerrima t. 48. f. 8. paſſim ad arbores.

2220 PEZIZA bracteata, ceſpitoſa, plana, ſericea. *Agaricum auriculæ forma*, MICHEL. t. 66. f. 1. ad arbores.

2221 PEZIZA gelatinoſa, coccinea, ſcyphis conicis, ſimplicibus & gregariis †. ad ligna putrida.

2222 PEZIZA cava, albida, intus coccinea. *Fungoides coccineum acetabuli forma* MICHEL. p. 207. n. 13. ad orbitas viarum.

2223 PEZIZA bracteata, ſordide lutea, ſubvilloſa. *Fungi Pezizæ Plinii* COLUMN. *ecphraſ. I.* p. 335. cum multis varietatibus, ad vias.

2224 PEZIZA terrea, petiolo rugoſo, acetabulo hemiſphærico gracili †. in ſylvis ad terram.

2225 PEZIZA ſordide lutea, longiſſime petiolata, cupula parabolica †.

2226 PEZIZA fuſca, petiolo longiſſimo, cupula hemiſphærica reticulata HOFER *Act. Helv. I.* p. 80. in ſylva ad terram.

2227 PEZIZA terrea, petiolo longo, gracili, acetabulo extus ſubaſpero SCHÆFFER. t. 167. perinde.

2228 PEZIZA petiolata, hemiſphærica, ora dentata. *Fungoides glandis cupulam referens, margine dentato* VAILLANT. t. 11. f. 1. 2. 3. in ſylvis ad terram.

2229 PEZIZA ſeſſilis, hemiſphærica, ora ſubdentata †. *Fungoides parvum nigrum interne leve exterius rugoſum vel ſtriatum* MICHEL. t. 86. f. 18. ad terram.

2230

2230 PEZIZA atra, cupula hemisphærica feffili †.

2231 PEZIZA feffilis, hemisphærica, extus villofa, fpadicea. Icon SCHÆFFERI t. 151. in fylvis.

2232 PEZIZA feffilis, alba, hemisphærica, extus villofa †. *Elvela hemifphærica, excavata & feffilis radice longa* GLEDITSCH.

2233 PEZIZA infundibuliformis umbrina †. *Fungoides ceſpitoſum infundibuli forma fulvum &c.* MICHELI t. 86. f. 10

2234 PEZIZA breviffime petiolata viridis †.

2235 PEZIZA petiolata, flavefcens, fcypho infundibuliformi †. in cortice virgultorum.

2236 PEZIZA viridiffima, petiolata, fcypho infundibuliformi †.

2237 PEZIZA minima, fufca, petiolata, fcypho infundibuliformi †.

2238 PEZIZA minima, alba, petiolata, fcypho infundibuliformi †. *Fungoides minimum pyxidatum album externe hirſutum pediculo donatum* MICHELI t. 86. f. 11. Hæc in virgultis ficcis.

2239 PEZIZA nivea, infundibuliformis, breviffime petiolata †. *Fungoides &c.* MICHELI t. 86. f. 15. perinde.

2240 PEZIZA minima, petiolata, coccinea, hirfuta †. *Fungoides minimum cernuum coccineum totum pediculo donatum* MICHELI t. 86. f. 12. in cortice putrefcente.

2241 PEZIZA plana, flava, breviffime petiolata †. in terra & ligno putrefcente.

2242 PEZIZA plana, feffilis, aurantia, anulata VAILL. t. 13. f. 14. ad terram.

2243 PEZIZA planiffima, ex glauco nigricans †.

2244 PEZIZA plana, feffilis, glauca, extus nivea †.

2245 PEZIZA plana, feffilis, miniata, oris ciliatis. *Fungus minimus ſcutellatus, coloris aurantii,* VAILL. t. 13. f. 11. ad terram.

2245* PEZIZA humida, exilis, læte rubicunda *Basl. merkw. III.* p. 384.

2246 BOLETUS capitulo explanato laciniato. *Fungoides &c.* MICHELI t. 86. f. 8. & 9. in fylvofis.

Pezizal Boletus, Phallus, et Agaricum

2247 BOLETUS capite terete reticulato. Multas varietates Morchellæ vide ap. MICHELI t. 85. f. 2, 6. ad terram circa ulmos.

2248 PHALLUS volva exceptus, capituli apice patulo GLEDITSCH. p. 55. MICHELI t. 83. in Comitatu Burgundiæ proxime fines.

2249 AGARICUM lenticulare †.

2250 AGARICUM febaceum, undulatum, ex albo fpadiceum †.

2251 AGARICUM cruftaceum, flavum, refinæ fimile. *Fungus non vefcus* LOESEL. p. 56. in corticibus arborum.

2252 AGARICUM purpureum undulatum †.

2252* AGARICUM album, tenue, cruftis fubrotundis †. in corticibus.

2253 AGARICUM cruftaceum, laciniatum, ochroleucum. †

2254 AGARICUM cruftaceum, fubcalcarium, acute laciniatum, ftercoris humani odore.

2255 AGARICUM cruftaceum, acute laciniatum, albiffimum, coriaceum. Hæc ad terram per mufcos effufa.

2256 AGARICUM cruftaceum, rotunde lobatum, fuperne villofum †.

2257 AGARICUM gelatinofum, granulofum, e flavo rufum. † in cortice.

2258 AGARICUM gelatinofum, coccineum, lobis craffis dentatis †.

2259 AGARICUM gelatinofum, fcutatum, obfcure flavum †.

2260 AGARICUM gelatinofum, flavorubrum, fuperne tuberculofum. *Fungi juniperini* HOFMAN. *Delic. flor. Altdorf.*

2261 AGARICUM gelatinofum, intortum & mefenteriforme †. *Noftoch luteum, Mefenterii forma,* VAILLANT. t. 14. f. 4. ad ligna demortua.

2262 AGARICUM gelatinofum, imbricatum, villofum, zonis diverficoloribus, inferne rugofum & unicolor. *Agaricum fquamofum & lichenofum &c.* MICHELI t. 66. f. 5. SCHÆFFER. t. 168. ad trabes humidas.

2262*

2262* AGARICUM ſubhirſutum, miniatum, inferne planum †. in ramis abiegnis.

2263 AGARICUM coriaceum, ſquamis ellipticis, imbricatis, ſuperne villoſis & diverſicoloribus †. *Agaricum ſquamoſum & lichenoſum membranaceum &c.* MICHEL. p. 124. f. 8. & forte n. 7. t. 66. f. 2. ad ligna arida.

2264 AGARICUM ſquamis ellipticis, imbricatis, ſinuatis, ſuperne album & hirſutum, inferne violaceum †. ad terram.

2265 AGARICUM ſquamis ellipticis imbricatis, ſuperne cervinis & villoſis, inferne flavis levibusque †. ad ligna emortua.

2266 AGARICUM durum, craſſiſſimum, ſquamis ellipticis, ſuperne villoſum & fulvum, inferne albidum †. *Stereum craſſiſſimum durum* HILL. *hiſt.* p. 35. ad arborum truncos.

2267 AGARICUM durum ceſpitoſum, acetabulis imperfectis, intus ſquamoſum †. Tabulæ 144. 145. forte & 146. SCHÆFFERI. in ſylvis.

2268 AGARICUM anulare, atrum, laciniatum †. *Agaricus ſericeus fuſcus* VAILLANT. p. 3. t. 1. f. 4. circa arida virgulta.

2269 AGARICUM petiolatum, gelatinoſum, capitatum flavum. *Fungus gelatinoſus flavus* VAILLANT. t. 13. f. 7. 8. 9. in ſylvis.

2270 AGARICUM petiolatum, gelatinoſum, corallinum, capitulis ſphæricis †. *Fungus omnium minimus turbinatus croceus* BOCCONE *muſ. di piant.* p. 150. t. 110. ad terram inter Muſcos.

2271 AGARICUM petiolatum, gelatinoſum, carneum, capitulis ſphæricis †. *Coralloides fungiforme ex ungula equina livide rufeſcens*, DILLEN. *ſylv.* t. 14. f. 5.

2272 POLYPORUS effuſus cruſtaceus albus †. *Agaricum terreſtre medullam panis referens* MICHEL. p. 121. t. 65. f. 2. in ſylvis per ligna putrida.

2273 POLYPORUS cruſtaceus albus jugis criſpatis †. *Coralloſungus argenteus omenti forma* VAILLANT p. 41. t. 8. f. 1. in arboribus refertis & putreſcentibus.

2274 POLYPORUS cruſtaceus purpureus †. perinde.

2275 POLYPORUS cruſtaceus albiſſimus, poris maximis †. perinde.

2276 POLYPORUS frondoſus, ceſpitoſus, imbricatus, ſpadiceus, poris albidis. *Florum Faſciculus* STERBEEK p. 269. t. 28. A. ad pedem arborum.

2277 POLYPORUS ſeſſilis, carnoſus, flavus, digitatus, maximus †. *Fungus caſearius ex Campenhout* STERBEEK. p. 170. t. 12. lit. A. ex arboribus & lapidibus effloreſcit.

2278 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, poris ampliſſimis albidis SCHÆFFER. t. 101. 102. ad arbores.

2279 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, ſpadiceus, poris fulvis, latioribus, anguloſis †. perinde.

2280 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, albiſſimus, ſuperne hirſutus, poris latioribus †. ſimiliter.

2281 POLYPORUS ſeſſilis, hirſutus, ſuperne fuſcus, poris albis tenuiſſimis †. *Agaricus cinereus margine albo* BATARRA t. 35? ad arbores.

2282 POLYPORUS ſeſſilis, ceſpitoſus, planus, hirſutus, anulis verſicoloribus. *Agaricus ſquamis iridiformibus* BATARRA t. 35. ad ſiccos arborum truncos.

2283 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, anulis verſicoloribus, poris albis tenuiſſimis. *Agaricus imbricatus laciniatus major* BUXBAUM. *Cent. V.* t. 1. f. 1. perinde.

2284 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, anulis diſcoloribus fulvis, poris ochroleucis. *Agaricus* ſ. *Fungus Laricis* C. B. ad larices.

2285 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, miniatus.† alpinarum arborum.

2286 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, hirſutus, fulvus †. ad arbores.

2287 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, farinoſus. † *Fungus non veſcus XXXVI.* LOESEL. p. 97. perinde.

2288 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, duriſſimus, cinereus, inferne albidus. *Fungi arborei ad Elychnia* I. B. III. p. 840. ad arbores.

2289 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, inferne albidus, ſuperne fulvus, zonis diſcoloribus †. *Agaricus pedis equini facie* BATARRA t. 37. E. ad arbores.

2290 AGARICUS coriaceus faginus hæmatocles? eumdem eſſe ſuſpicor.

2291 POLYPORUS ſeſſilis, convexo planus, laciniatus, flavus, imbricatus & cæſpitoſus †. *Agaricus igniarius heteroclitus* BATARRA t. 37. G.

2292 POLYPORUS ſeſſilis, petiolo horizontali †. *Agaricus aureus flabelli effigie* BATARRA t. 37. A. ad arborum truncos.

2293 POLYPORUS petiolo laterali, pileo cervino, poris cinnameis †.

2294 POLYPORUS petiolatus, ampliſſimus, albidus, alveolis ſubtus quadrangulis †. in ſylvis.

2295 POLYPORUS petiolatus, niveus, alveolis ſubtus quadrangulis †. perinde.

2296 POLYPORUS petiolo & pileo reticulatis, albo viridis, alveolis ſubtus reticulatis terreis.† perinde.

2297 POLYPORUS petiolatus, ceſpitoſus, ramoſus, lobatus, ſpadiceus, inferne albidus †.

2298 POLYPORUS petiolatus, infundibuli forma, ceſpitoſus, intus nigricans, extus albus †. *Polyporus lignoſus & ceſpitoſus &c.* MICHEL. p. 13. t. 70. f. 6. ad ligna putrida.

2299 POLYPORUS reticulatus, pileo fuſco depreſſo †. An *Polyporus exiguus coriaceus fulvus &c.* MICHELI p. 130. t. 70. f. 9. in ſylvis omnes.

2300 POLYPORUS petiolo curvo, pileo pulvinato albo †. *Polyporus exiguus coriaceus albus, lignis adnaſcens* MICHELI p. 130. t. 70. f. 7.

2301 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, anulatus. *Fungus poroſus autumnalis viſcidus* BUXBAUM. *Cent. V.* t. 14. in ſylvis.

2302 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, fulvus, inferne vireſcens. *Suillus eſculentus craſſus. ſuperne fulvus, inferne initio albidus, deinde ex flavo vireſcens, petiolo ventricoſo, & ſupernæ parti pilei concolore* MICHELI p. 127.

Polyporus

2303 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, ſubviridis, inferne aurantius †.

2304 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, leoninus, inferne cinnameus †. *Fungi* t. 107. 115. 123. 134. SCHÆFFERI.

2305 POLYPORUS carne ſecedente, purpureus, inferne flavus †. t. 133. SCHÆFFERI.

2306 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, petiolo albido, poris violaceis †.

2307 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, petiolo terreo, inferne aurantio †.

2308 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, pileo ſpadiceo, inferne pallido †. *Fungus poroſus magnus craſſus* I. B. III. p. 833.

2309 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, terreus, concolor †.

2310 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, pileo ovato miniato, poris ochroleucis †. *Fungus aurantius pileolo longo* STERBEEK. p. 119. t. 16. f. A.

2311 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, pileo villoſo cervino, poris albidis †. *Fungus poroſus, tenuis coriaceus* BUXBAUM. *Cent. V.* t. 15. f. 1.

2312 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, ſpadiceus, inferne albidus, poris minimis †.

2313 POLYPORUS carne ſecedente, petiolatus, roſeus, inferne flavus †.

2314 POLYPORUS ſemipetiolatus, lobatus, ſpadiceus, inferne cinereus †. Hi omnes in ſylvis & ad terram.

2315 POLYPORUS ſeſſilis, carne ſecedente, mollis, ſanguineus, craſſus, obſcure lobatus. *Agaricum eſculentum, caſtaneis adnaſcens, latiſſimum, hepatis facie, ſuperne in rubro ſanguineum, interne ſanguineum, ſubtus ochroleucum* MICHELI p. 117. t. 60. in cavis arboribus & ad earum radices.

2316 ECHINUS ſeſſilis, albicans, ſquamis ellipticis, ſuperne villoſus †. *Agaricus* t. 5. & 6. MICHELI p. 122. & t. 64. f. 3. 4. 5. ad truncos arborum inque ſylvis.

2317

2317 ECHINUS ramoſus, aculeis parallelis †. *Agaricum eſculentum, ceſpitoſum, album, multifidum & denticulatum, denticulis aſperis*, MICHELI p. 122. t. 64. f. 2.

2318 ECHINUS nigricans, ſquamis ellipticis, aculeis longiſſimis †. circumnatus pini ramo. Idem fere 2324.

2319 ECHINUS cryſtallinus, gelatinoſus †. *Fungus non veſcus IX.* LOESEL. p. 96. in lignis putridis.

2320 ECHINUS infundibuliformis rufus, intus aculeatus †. *Agaricus ramoſus cornua rangiferi referens* BLAKSTON. *ſpecim.* p. 2. t. 1. in montanis.

2321 ECHINUS petiolo gracili, laterali, pileolo plano, obſcuro. *Fungus erinaceus parvus in conis abiegnis naſcens* BUXBAUM. *Cent. I.* t. 57. f. 1. in viis & ſemitis.

2322 ECHINUS cryſtallinus, petiolo craſſo puſtulato.† alpinus.

2323 ECHINUS petiolatus, petiolo hemisphærico, aculeis ovatis †. in ſylvis.

2324 ECHINUS petiolatus albicans, ſuperne ſquamoſus. *Fungus erinaceus eſculentus albus* MICHEL. p. 132 t. 72. f. 2.

2325 ECHINUS petiolatus, lamellatus, ſubrufus, petiolo levi. *Erinaceus &c.* MICHELI t. 12. f. 3. uterque in ſylvis frequens.

2326 MERULIUS flavus, oris contortis & laceris. *Fungus anguloſus & veluti in lacinias diſſectus* VAILLANT. p. 60. t. 11. f. 14. 15. in ſylvis.

2327 MERULIUS violaceus †. multo rarior.

2328 MERULIUS ſeſſilis, ſemipetiolatus, convexo planus †. in ſylvis.

2329 MERULIUS ſeſſilis, albus, hirſutus, ſubtus croceus, venis ſerpentinis intricatis. ad ligna.

2330 AMANITA ſeſſilis, duriſſimus, lamellis cartilagineis, intricatis. *Agaricus de St. Clou* VAILL. p. 3. t. 1. f. 1. 2. ad ligna.

2331 AMANITA ſeſſilis, hirſutus, fulvus, lamellis concoloribus †. *Agaricus hirſutus nigricans, lamellis luteis* BUXBAUM. *Cent. V.* t. 6. perinde.

Echinus, Merulius, Amanita

2332 AMANITA sessilis, siccus, villosus, albicans, lamellis fulvis †. & iste.

2333 AMANITA sessilis, laminis pulverulentis, bifidis. *Agaricus imbricatus, hirsutus, lamellis violaceis* BUXBAUM. *Cent. V.* t. 7. f. 1. tum iste.

2334 AMANITA sessilis, perexiguus, tener, cinerei coloris †.

2335 AMANITA sessilis, minimus, albus †.

2336 AMANITA sessilis, crustaceus, albissimus †.

2337 AMANITA semipetiolatus, albidus subtus terreus. † *Agarici* MICHELI t. 65. f. 1. 5. 6. omnes ad ligna sicca.

2338 AMANITA umbilicatus, albus, lacte acri manans. *Fungus piperatus albus lacteo succo turgens* I.B.III. p 823. vulgo in sylvis.

2339 AMANITA maximus, albus, infundibuliformis. *Fungus* BUXBAUM. *Cent. IV.* t. 1. f. 1. perinde.

2340 AMANITA albus, oris repandis & laceris †. *wit hasenoor* STERBEEK. p. 119. t. 15. B. B.

2341 AMANITA albus, viscidus, lamellis tenuissimis †. *Fungus capite expanso viscosus*, VAILL. n. 67. & alii ejusd.

2342 AMANITA albus petiolo villoso, pileolo umbonato striato. *Fungus albus viscidus petiolo longo* BUXBAUM. *Cent. IV.* t. 30. f. 2. omnes in sylvis.

2343 AMANITA albus, hemisphæricus, ambitu striato† *Fungus gracilis &c.* MICHELI t. 75. f. 6.

2344 AMANITA albus, siccus, cute coriacea †. *Omphalomyces* BATARRA.

2345 AMANITA albus, petiolo gracili, prælongo, pileolo striato conico †. *Fungus parvus gracillimus &c.* MICHELI t. 73. f. 4.

2346 AMANITA albus, tener, pileolo campanulato striato †. *Fungus minimus totus albus &c*, MICHELI t. 80. f. 11. in foliis faginis.

2347 AMANITA albus, petiolo gracili, pileolo campanulato, striato, farinoso †. *Fungus gracilissimus Androsacen simulans* MICHELI t. 19. f. 6. inter muscos.

2348 AMANITA albus, pileo hemisphærico, excarni, oris striatis †. *Fungus minimus albus. pileo hemisphærico*

misphærico in arborum caudicibus MICHEL. t. 74 f. 7. in foliis aridis.

2349 AMANITA albus, omnium minimus, pileolo hemisphærico †. *Fungus minimus candidus, pileolo hemisphærico* MICHELI t. 80. f. 10. & iste.

2350 AMANITA pileolo campaniformi albo, superne violaceo, petiolo concolore †.

2351 AMANITA petiolo nigro, pileolo albo, striato, excarni. *Fungus pileolo candicante, lamellis paucis &c.* VAILL. t. 11. f. 21. 22. in foliis abiegnis.

2352 AMANITA albus, lamellis crassissimis †. *Fungus parvus albus subtus lamellis torosis*, MICHELI p. 146. n. 18. in sylvis.

2353 AMANITA albus, levis, pulvinatus, anulatus †. *Leomyces* F. x. c. BATARRÆ.

2354 AMANITA albus, squamosus, pulvinatus, petiolo crasso anulato †. MICHELI p. 171. n. 12.

2355 AMANITA albus, squamosus, petiolo gracili, anulato †. BATARRA t. VIII. D. E.

2356 AMANITA albus, squamosus, striatus, petiolo gracili, auulato †. *Fungus minimus albus &c.* MICHELI t. 78. f. 7. in sylvis.

2357 AMANITA albus, campanulatus, squamosus, nigrescens. *Fungus bombaceus perniciosus* STERBEEK. t. 24. B. in ruderosis.

2358 AMANITA pulvinatus, pileolo cervino, lamellis albis undulatis †.

2359 AMANITA infundibuli forma, cervinus, lamellis albis †.

2360 AMANITA pileo pulvinato, leonino, centro fusco, squamoso †. SCHÆFFER. t. 77. in sylvis omnes.

2361 AMANITA sanguineus, lamellis albidis, petiolo bulboso ad c. l. BATARRÆ t. 10.

2362 AMANITA campaniformis, cervinus, reticulatus, lamellis albis †.

2363 AMANITA viscidus, pileo flavescente, lamellis albis SCHÆFFER. t. 45.

2364 AMANITA petiolo gracili anulato, pileolo convexo, tuuerculoso, cervino, lamellis albis †. ad T. X. A. BATARRÆ.

2365 AMANITA petiolo craſſiſſimo, anulato, ſpadiceo, lamellis albis toroſis †.

2366 AMANITA petiolo bulboſo, anulato, pileolo convexo, ſpadiceo †.

2366* AMANITA petiolo procero, ſquamoſo, anulato, pileo conico, ſquamoſo, ſubſpadiceo, laminis albis †. *Fungus* 23. SCHÆFFERI. in ſylvis abiegnis.

2367 AMANITA pileo flavo, oris ſtriatis & lanuginoſis, lamellis albis. *Fungus crocetus magnus* STERBEEK p. 63. t. 4. C. omnes in ſylvis.

2368 AMANITA pileo pulvinato flavo, oris & lamellis albis †. T. 35. SCHÆFFERI.

2369 AMANITA viſcidus, petioli carne flava, pileo plano, ſordide luteo, lamellis albis †.

2370 AMANITA minimus, oris adtractis, flavus, lamellis albis. *Fungus minimus aurantius mammillaris* VAILL. t. 11. f. 19. 20. inter muſcos.

2371 AMANITA petiolo procero, anulato, in acetabulum pilei inmiſſo, pileo ſquamoſo & maculato, lamellis albis. *Fungus coronatus aut marmoreus* STERBEEK. p. 77. t. 7. in ſylvis abiegnis.

2372 AMANITA petiolo gracili, anulato, pileolo albo, ſquamis ſanguineis aſpero †. An *Fungus minimus &c.* MICHELI t. 78. f. 8?

2373 AMANITA petiolo anulato, ſanguineus, lamellis albis. *Mel muſcarum venenoſum*, STERBEEK. t. 22. A. in ſylvis.

2374 AMANITA petiolo farto, pileolo convexo, umbilicato, oris rugoſis, lamellis albis. *Fungus piperatus non lacteſcens* VAILLANT. p. 62. variat pileo roſeo, ſanguineo, violaceo, cæruleo, viridi, livido, flavo, ochroleuco.

2375 AMANITA petiolo anulato, pileo viridi, ſtriato, lamellis albis. *Fungus magnus viridis* STERBEEK t. 5. E. in ſylvis.

2376 AMANITA pileo umbilicato ſtriato, obſcure viridi, lamellis albis †.

2377 AMANITA pileo pulvinato, viridi, lamellis albis †.

2378 AMANITA petiolo breviſſimo, pileo umbilicato, cinereo, lamellis tenuiſſimis, albis †. *Omphalomyces cinereus acris* BATARRA t. 13. E.

2379 AMANITA petiolo farinoſo, pileo ſubcinereo viſcido, lamellis albis toroſis †. MICHEL. *Fungus eſculentus &c.* t. 73, f. 2.

2380 AMANITA petiolo bulboſo, breviſſimo, laterali, pileolo hemiſphærico, ſpadiceo, lamellis albis. † an SCHÆFFER. t. 71. in ſylvis iſti.

2381 AMANITA petiolo farto, gracili, pileo plano, murino, ſericeis lineis ſtriato, lamellis albis, SCHÆFFER. t. 14. f. 64. ad vias.

2382 AMANITA petiolo gracili, farto, pileo ſquamoſo murino, lamellis albis †. *Fungus pileolo conico maculato* VAILLANT. p. 63. n. 19.

2383 AMANITA petiolo farto, gracili, pileo hemiſphærico, cinereo, purpureo, lamellis albis †. an *Fungus ſuperficie murini coloris lamellis albicantibus* BUXBAUM. *Centt IV.* t. 12. f. 2.

2384 AMANITA petiolo farto, gracili, pileo pulvinato, cinereo, lamellis albis †.

2385 AMANITA petiolo gracili, fiſtuloſo, ſpadiceo. pileolo plano, cinereo, oris luteis ſtriatis, lamellis albis †. SCHÆFFER. t. 45.

2386 AMANITA petiolo procero, fiſtuloſo, pileo plano, umbonato, ſtriato, lamellis albis †. an *Monomyces* BATARRÆ t. 21. F?

2387 AMANITA radice tuberoſa, caudata, petiolo præalto, pileo plano, nigricante, lamellis albis † in ſylvis.

2388 AMANITA radice caudata, petiolo fiſtuloſo procero, pileo umbonato, cinereo, ſtriato, lamellis albis †. *Hydrophorus cinereus* BATARR. t. 25. E.

2389 AMANITA ceſpitoſus, petiolo procero, fiſtuloſo, pileo umbonato, ſtriato, ſquamoſo †. *Fungus ſoboliferus fugax, pileo galericulato, obſcuro, vertice levi, reliqua parte ſubtiliſſime ſtriato, lamellis murinis, pediculo albo, fiſtuloſo* MICHEL. p. 195. t. 79. f. 4.

2390 AMANITA tener, petiolo procero, fiſtuloſo, pileo umbonato

umbonato plicato murino, lamellis albis †. iste in hortis.

2391 AMANITA petiolo, procero gracilissimo, pileolo conico, striato, murino, lamellis albis †. *Fungus fuscus, lamellis albis, ex musco terrestri nascens* BUXBAUM. *Cent. IV.* t. 28. f. 2. in gramineis & foliis putridis.

2392 AMANITA minimus, pileolo campaniformi, spadiceo, lamellis albis †. *Fungus parvus, capitulo conico, in cellis vinariis proveniens* BUXBAUM. *Cent. IV.* t. 13. f. 1. in ligno putrido.

2393 AMANITA pileolo conico, spadiceo, lamellis albis †.

2394 AMANITA petiolo curvulo, pileolo campaniformi, flocculento, farinoso, striato, lamellis albis. †

2395 AMANITA volva exceptus, pileolo farinoso, pileo cinereo striato, lamellis albis †.

2396 AMANITA petiolo gracili, anulato, pileolo hemisphærico, spadiceo, lamellis albis †. *Agarici VI.* GLEDITSCH. varietates *a. c. d.*

2397 AMANITA petiolo procero, fistuloso, anulato, pileolo plano, verrucoso, fordido, lamellis albis †. *Fungus fuscus pediculo bulboso, capitulo albis pustulis notato* STERBEEK. t. 21. D.

2398 AMANITA petiolo bulboso, pileo hemisphærico, spadiceo, lamellis albis. Icon SCHÆFFERI t. 38.

II. LAMELLIS OCHROLEUCIS CERVINIS, ET ADFINIUM COLORUM.

2399 AMANITA cervinus, petiolo procero, anulato, pileo cervino, squamis fuscis exasperato †. *Fungus pileolo lato, micis furfuraceis adsperso* VAILLANT. p. 54. n. 2.

2400 AMANITA rufus, petiolo fistuloso, pileo squamoso †. Tabula SCHÆFFERI 25.

2401 AMANITA cervinus, petiolo bulboso, farto, pileolo per oram tuberculoso & striato †. annon T. 79. SCHÆFFERI.

2402 AMANITA cervinus, petiolo procero, anulato, SCHÆFFER. t. 19. f. 102.

2403 AMANITA cervinus, anulatus, procerus, exiguus. †
2404 AMANITA cervinus, pileo pulvinato, oris adtractis. †
2405 AMANITA cervinus, petiolo fiſtuloſo, pileoli centro ſquamoſo †.
2406 AMANITA cervinus, petiolo flavo, curvulo, excentrico, pileolo ſquamoſo, lamellis ramoſis †.
2407 AMANITA ex vaccino avellaneus, ſericeus, lamellis numeroſiſſimis albidis †,
2408 AMANITA cervinus, petiolo craſſiſſimo †.
2409 AMANITA cervinus, tener, oris ſtriatis & fiſſis †.
2410 AMANITA faſciculatus, pileolo cervino, conico. †
2411 AMANITA pileo flaveſcente, lamellis butyraceis, anulo araneoſo †.
2412 AMANITA pileo flaveſcente, ſquamoſo, lamellis terreis. obſcuris, anulo araneoſo †.
2413 AMANITA anulatus, cervinus, pediculo ſuperne albo †.
2414 AMANITA pileolo plano, lacero, corio cervino, lamellis terreis obſcuris †. Tab. 43. 44. SCHÆFFERI.
2415 AMANITA ſiccus, pileo plano, ſubcinereo, lamellis coloris lignei †.
2416 AMANITA ſiccus, pileolo albido, lamellis toroſis flaveſcentibus †.
2417 AMANITA ſiccus, pileolo hemiſphærico, obſolete umbrino, lamellis ſubcarneis †.
2418 AMANITA tener, pediculo nigro, procero, ileol terreo ſtriato, lamellis ſordide albis †.

III. LAMELLIS FLAVIS.

2419 AMANITA fulvus, lacte croceo. *Omphalomyces acris lateritii cooloris* BATARR. t. 16. A. & aliæ varietates.
2420 AMANITA glutinoſus, flavus, pileo umbonato †. *Fungus gelatinoſus colore aurantio* VAILLANT. t. 12. f. 8. 9.
2421 AMANITA flavus, viſcidus, pileolo conico. † an *Fungus viscidus ſordide luteus* BUXBAUM. *Cent. IV.* t. 9.
β. Varietas ſuperne purpurea SCHÆFFER. t. 4.

2422 AMANITA ficcus, fulfureus, lamellis craffis †.

2423 AMANITA flavus, campanulatus, ficcus †. *Fungus durus citrini coloris* BUXBAUM. *Cent. IV.* t. 10.

2424 AMANITA flavus, pileo hemifphærico, fquamofo †. *Fungus totus per maturitatem coloris aurantii* VAILLANT. p. 64. n. 20.

2425 AMANITA flavocinnameus, vifcidus, ftriatus, papillatus †.

2426 AMANITA flavus, petiolo graciliffimo & proceriffimo, pileo conico vifcido †. *Fungus pediculo croceo, fplendoris participe* VAILLANT. t. 11. f. 16. 17. 18.

2427 AMANITA flavus, petiolo gracili, procero, pileolo conico vifcido †. *Bulla flavicante pileolo* BATARRA t. 20. Z. in ligno putrido.

2428 AMANITA flavus, tuberculofus, petiolo fquamofo, lamellis cervinis †.

2429 AMANITA flavus, totus ftriatus, tenuiffimus †. SCHÆFFER. t. 63. f. 1. 2. 3. 4.

2430 AMANITA flavus, volvatus, anulo latiffimo. *Fungus planus orbicularis aureus* MICHEL. t. 77. f. 1. ifte rarior.

2431 AMANITA leoninus, fericeus †. SCHÆFFER. t. 4. 29. 41. 65.

2432 AMANITA ficcus, leoninus, anulo araneofo. *Amanita dura ex fufco rubens quercina* DILLEN Syn. *III.* t. 12. p. 23.

2433 AMANITA viridis, pileolo plano, lamellis pallidis †.

2434 AMANITA pileo pulvinato viridi, lamellis obfcure luteis †.

2435 AMANITA pediculo bulbofo, lineato, pileo convexo, flavorufo †. SCHÆFFER. t. 13.

IV. LAMELLIS RUFIS aut RUBRIS.

2436 AMANITA petiolo bulbofo, lineato, pileo convexo, flavorufo †. SCHÆFFER. t. 13.

2437 AMANITA petiolo fiftulofo, lineato, pileolo vaccino fquamofo †.

2438 AMANITA petiolo farto, lamellis torofis †.

2439

2439 AMANITA flavoſanguineus, lamellis raris, petiolo procero †.

2440 AMANITA petiolo albo, pileo ex ochroleuco & lateritio vario, lamellis roſeis †.

2441 AMANITA ſubrubellus, petiolo procero, pileo campanulato, ſtriato †.

2442 AMANITA cupreus, pileolo campanulato, ſtriato †. *Fungus multiplex convexus colore caſtaneo* VAILLANT. t. 12. f. 3. 4.

2443 AMANITA petiolo anulato, pileo campaniformi, albido, laminis roſeis. *Fungus campeſtris, albus ſuperne, inferne rubens* I. B. III. p. 824.

2444 AMANITA anulatus, pileo pulvinato, cæruleo viridi, lamellis roſeo cæruleis †. SCHÆFFER. t. 1.

2445 AMANITA pileo pulvinato, cervino, lamellis cinnameis †.

2446 AMANITA ceſpitoſus, ramoſus, hemiſphæricus, mollis, lamellis cinnameis. accedit *Fungus ramoſus maximus &c.* MICHEL. t. 79. f. 1.

2447 AMANITA pileo campanulato, cinereo, ſquamoſo, lamellis ruberrimis †.

2448 AMANITA pileo plano, flaveſcente, ſtriato, viſcido, lamellis roſeis †.

2449 AMANITA pileo murino, umbilicato, lamellis ſubrufeis. *Fungus foliaceus & lamellatus, infundibuli forma, fuſco lividus* VAILLANT. t. 14. f. 1. 2. 3.

2450 AMANITA pileo campanulato, caſtaneo; lamellis ſubrufis †.

2451 AMANITA pileo hemiſphærico, murino, lineis rubellis ſtriato †.

2452 AMANITA pileo ſpadiceo, ſubvilloſo. lamellis ſubrufis †.

2453 AMANITA leoninus, pileolo campanulato †.

2454 AMANITA leoninus, pileolo conico lineato †.

V. LAMELLIS CÆRULEIS.

2455 AMANITA violaceus, petiolo bulboſo, anulato, pileo plano. *Fungus cæruleus major* BUXBAUM *Cent. IV.* t. 9.

2456 AMANITA obſcure cervinus, petiolo bulboſo, anulo araneoſo, lamellis extus conſpicuis, ſubviolaceis †.

2457 AMANITA violaceus, petiolo gracili, pileolo pulvinato †.

2458 AMANITA obſcure violaceus, pileolo conico †.

2459 AMANITA violaceus, pileolo plano, ſtriato †. *Fungus dilute carneus ut incarnatus* VAILLANT p. 64. n. 46.

VI. LAMELLIS VIRIDIBUS.

2460 AMANITA totus viridis †.

VII. LAMELLIS OBSCURI COLORIS, LIGNEIS, PALMEIS.

2461 AMANITA ceræ crudæ colore, ora ſtriata †.

2462 AMANITA pileo umbrino, lamellis obſcure cinnameis †.

2463 AMANITA pileolo umbrino, campaniformi, ſtriato, lamellis obſcure ligneis †.

2464 AMANITA minimus, pileolo papillato, villoſo, albo, lamellis ligneis †.

VIII. LAMELLIS CINEREIS. MURINIS.

2465 AMANITA cinereo umbrinus, cute ſtriata, lamellis cinereis †.

2466 AMANITA pulvinatus, cinereus, petiolo ſuperne farinoſo †.

2467 AMANITA cinereo ſpadiceus, cuticula ſtriata, lamellis umbrino violaceis †.

2468 AMANITA cinereus, petiolo craſſo & farto †. SCHÆFFER. t. 89.

2469 AMANITA ſpadiceo cinereus, petiolo fiſtuloſo, pileolo ſericeo †. *Fungus læte fuſco colore*, VAILLANT. t. 64. n. 22.

2470 AMANITA cinereo ſpadiceus, petiolo farinoſo †.

2471 AMANITA fordide ex luteo cinereus, petiolo bulbofo, pileolo villofo †.

2472 AMANITA murinus, petiolo procero, pileo late conico ftriato †.

2473 AMANITA murinus, pileo ovato adtracto †.

2474 AMANITA terreo luteus, pileo plano ftriato, lamellis umbrino violaceis †.

2475 AMANITA pileo cinereo femicirculari †. *Fungus parvus viscofus, pileo grifeo femiorbiculari* MICHEL. p. 147. n. 3.

2476 AMANITA minimus, pileolo & petiolo villofis, albis, lamellis obfcure ligneis †. in ligno putrefcente.

2477 AMANITA cinereus, prolifer, vagina infundibuliformi †. *Fungus ramofus, parvus, albus, pileis in tubum quafi contractis* MICHEL. p. 144. t. 79. f. 3.

2478 AMANITA petiolo anulato, pileo hemifphærico albo, lamellis murinis †.

2479 AMANITA pileolo ovato, ftriato, cinereo, anulo fugaci.

2480 AMANITA campanulatus albns, lamellis fubluteis, anulo araneofo †.

IX. LAMELLIS UMBRINIS.

2481 AMANITA anulo araneofo, pileolo pulvinato, livide fpadiceo, lamellis ex cinereo umbrinis †.

2482 AMANITA anulo araneofo, pileo flavo, lamellis ex flavo fuliginofis †. *Fungus major fubluteus, lamellis luridis* BUXBAUM. *Cent. IV.* t. 4.

2483 AMANITA campaniformis, cinereus, laminis nigris †. *Fungus multiplex campaniformis colore fufco* VAILLANT. t. 12. f. 5. 6.

2484 AMANITA pileolo conico ftriato, lamellis nigris †. *Fungus parvus, pileolo plicatili, cinereus, oris crenatis* BUXBAUM. *Centur. II.* t. 50. f. 2.

2485 AMANITA tener, cinereus, lacer, cervinus, lamellis nigris †. *Fungus pileo plicatili major* BUXBAUM. *Cent. II.* t. 10. f. 1.

2486 AMANITA nigerrimus †.

XX. ZOOPHYTA.

2487 SPONGIA ramosa fluviatilis polyspermos, ad Confervam accedens RUPP. cum icone. Ex lacu Moratensi extraxit PENNÆUS ap. GESNER.

Computatis & emendatis omnibus verus numerus est plantarum 2490.

Ex Officina BRUNNERI & HALLERI.

...ntæ Stamin. præd. & petal. Systema flore connat., planipet. ... N. ...
(plac. squam.) Cichor., Hypochær. 3, (plac. nuda) Laps. 3, Rhagadiol., Tragop. 2, Scorz. 3, Lact. 4, Chondr., Prenanthes 2, Sonchus, Picris 5, Crepis 6, Hierac. 22, Tarax. 2
Radiatæ: Senecio 11, Solidago 3, Aster 10, Erigeron 4, Doron., Arnica 4; (sem. nudo) Bellis, Calend.; (sem. coron.) Pyrethrum, Matric. 4, Chamæmel. 4, Achillea 12, Buphthalm. 2, Bidens 2, Coryza, Chrysanth., Stratiot., Tanac.
Flosculosæ (sem. nudo, disco squam.) Xeranth., Santolina; (disco papposo) Absinth. 3; (disco nudo) Artemis. 5, Tanac. 24
Semin. coron.): Conyza, Eupator., Cacalia, Petasites 6, Chrysocoma, Filago 13 [Gnaphal.] Carpesium
Capitatæ (cal. proprio) Echinops; (sine cal. pr. flosc. hermaphrod.) Onopord., Centaur., Lappa, Carduus 6, Cirsium 13, Silybum, Carlina 2, Jacea; (flosc. rad. steril.) Cyanus 7, Atractylis, Calcitrapa 2, Rhaponticum 3, Serratula
Stamin. liberis disco communi: Dipsacus 3, Succisa 3, Scabiosa 4
Gymnomonospermæ: Valeriana 6, Valerianella 2; (Pericarpiæ) Globularia 3
2. Stamin. 2 longior. 2 brevioribus, flore difformi,
1. Gymnotetraspermæ: (bilabiatæ) Verbena, Hyssopus, Mentha 10, Erica, Lavandula, Origanum 3, Thymus, Clinopodium 3, Melissa 3, Horminum, Melissophyllum, Chamædrys, Cataria 3, Hyssopus, Rosmarinus, Salvia 3, Dracocephalum, Stachys 3, Marrubium, Ballote, Betonica 6, Galeopsis 4, Lamium 4, Cardiaca 2, Prunella 3, Cassida 2 — (unilabiatæ) Bugula 3, Chamædrys 6
2. Vasculiferæ (monangiæ) Utricularia 2, Pinguicula 2, Orobanche 3, Squamaria, Tozzia, Linaria, Limosella, Montia — (diangiæ) Perinus, Euphrasia 3, Odontites 3, Melampyrum 5, Bartsia, Alectorolophus 2, Pedicularis 10, Scrophul. 4, Gratiola, Digitalis 3, Antirrhinum 10
3. Stamin. connatis, flore polypet. difformi
1. Tripetalæ Octostemones Polygala 2, Polygaloides
2. Tetrapetalæ Hexastemones: Fumaria 4
3. Tetrapetalæ Decastemones, Papilionaceæ; (foliis simplic. vel ternis) Genista 4, Spartium 2, Ononis 4 — (fol. ternatis) Cytisus 2, Melilotus, Trifolium 16, Buceras, Medica 4 — (fol. quinis) Dorycnium, Lotus 2 — (fol. pinnatis) Coronilla 4, Ferrum equinum 2, Ornithopodium, Galega, Hedysarum, Onobrychis, Vulneraria 2, Cicer, Colutea, Astragalus 15, Orobus 4, Ervum, Lens, Vicia 9, Lathyrus 12
4. Tetrapetalæ siliquosæ, stamin. senis, sc. 2 brevior., Cruciatæ
1. Siliquosæ: Leucojum 5, Hesperis 3, Arabis 3, Turritis 3, Eruca 6, Sinapi 5, Raphanus, Dentaria 2, Cardamine 6, Erysimum 4, Sisymbrium 5, Radicula 2
2. Siliculosæ: Alyssum 8, Draba 4, Lunaria, Biscutella, Coronopus, Nasturtium 13, Lepidium 4, Iberis 2, Rapistrum, Isatis, Myagrum 2, Bunias, Trapa
5. Meiostemones:
Tetrapet. Distemones Fraxinus
Monopet. Distemones: Jasminum, Ligustrum, Syringa, Veronica 21
Monostemones: Stellaria 3, Najas
6. Isostemones:
1. flore difformi polypetalo: Impatiens, Viola 13
2. Dicarpiæ: Asclepias, Pervinca 2
3. Cucurbitaceæ: Bryonia
4. Solanaceæ: Solanum 2, Physalis, Mandragora, Belladonna, Hyoscyamus, Verbasc. 5, Stramon.
5. Asperifoliæ: Cynoglossum 3, Scorpiurus 3, Heliotrop. 2, Lithosperm. 2, Pulmon. 2, Buglossum, Symphyt. 2, Cerinthe, Echium 2, Lycopsis, Asperugo, Borrago
6. Vasculiferæ: Primula 8, Aretia, Androsace, Anagallis, Centunculus, Lysim. 4, Hottonia, Menyanthes, Soldanella, Cyclaminus, Gentiana 18, Cuscuta, Plantago 8, Convolv. 2, Polemonium, Azalea, Aquifol.
7. Coronatæ: Opulus, Viburnum, Sambucus, Caprifol. 6, Rapunculus 7, Campanula 20, Pimpinella 2, Samolus
8. Stellatæ: Rubia, Galium 19, Asperula 6, Sherardia
9. Umbelliferæ: Eryngium 2, Sanicula 2, Caucalis 6, Daucus, Libanotis, Cerefolium 3, Myrrhis 5, Oenanthe 2, Phellandrium, Ligusticum 2, Podagraria, Foeniculum, Meum, Seseli 2, Coriandrum, Aethusa, Cicuta, Bupleurum 10, Sium 6, Bulbocastanum, Apium, Tragoselinum 4, Carum, Astrantia 2, Laserpitium, Peucedanum, Selinum 6, Imperatoria, Angelica 2, Pastinaca, Sphondylium 2, Tordylium, Hydrocotyle
10. Coronatæ flore polypetalo: Circæa, Cornus 2, Ribes 4
11. Polypetalæ Pericarpiæ: Rhamnus 4, Vitis, Hedera, Rhus, Berberis, Evonymus 2, Staphylea, Parnassia, Morella 2, Statice, Linum 6, Telephium, Corrigiola, Potamogeton
12. Calyciftoræ: Salicaria 2, Peplis
7. Diplostemones:
1. Caryophyllæ: Elatine 2, Cherleria, Alsine 26, Myosotis 18, Tunica, Saponaria 7, Viscago 11, Lychnis 7, Oxys 3, Geranium 17, Tribulus, Tamariscus.

2. Succulentæ: Sedum 19, Portulaca, Saxifraga 31, Sedum
3. Epicarpiæ: Agrimonia, Pentapteris 2, Oenothera, Epilobium 7
4. Petalorum num. variantium: Hypopitys, Ruta 3, Moschatellina
5. Bacciferæ: Paris, Phytolacca
6. Corniculatæ: Pyrola 4, Erica 3, Rhododendron, Andromeda, Arbutus, Vaccinium
7. floribus tubulosis: Thymelæa 4, Stellera
8. flore difformi monopetalo: Aristolochia 2
9. polypetalo: fraxinella, Hippocastanum
10. staminibus dicolobis octonis: Acer 3

8. Polystemones:
1. Ascyroideæ: Tilia, Cistus 6, Hypericum 7
2. Nectariferæ: Tithymalus 12, Reseda 3
3. Rhoeadeæ: Chelidonium, Glaucium, Papaver 5, Nymphæa 2, Hydrocharis
4. Columniferæ: Malva 4, Althæa 2, Abutilon
5. fructu molli (flore circundato) Actæa, Capparis, Amygdalus, Prunus 3, Cerasus
(8) Chamæcerasus, Padus; (coronato) Mespilus 8, Pyrus 3, Punica, Opuntia, [illegible]
Rosa 6
7. Gymnopolyspermæ (calyciflora) Rubus 4, fragaria 17 (Potent., Torm.), Geum 4, Dryas, Fili[pendula]
(8) (thalamiflora) Thalictrum 5, Clematis 3, Atragene, Anemone 10, Hepatica, A[donis]
Myosurus, ficaria, Ranunculus 23, Damasonium (Plant.), Sagitta
9. Multisiliquæ: Butomus, Paeonia, Caltha, Trollius, Isopyrum, Helleborus 3,
Aquilegia 2, Aconitum 3, Delphinium 3

9. Liliaceæ:
1. Trisiliquæ: Veratrum, Anthericum
2. fructu triloculari (intra florem, petalis patulis) Asphodelus, Phalangium 8, Ornith[ogalum]
(3) (floribus aggregatis) Allium 13; (flore campaniformi) Hemerocallis 5, Lilium 3,
Erythronium, fritillaria, Tulipa
6. Bacciferæ: Uvularia, Ruscus, Asparagus, Unifolium, Polygonatum 4
6. flore tubuloso: Hyacinthus 4
7. flore fructui insito: Agave, Narcissus 3, Galanthus 2, Colchicum 2; (tri[...])
9. flore difformi (hexastemones): Gladiolus | Crocus 2, Iris 3

10 Satyria: Orchis 26, Epipactis 12, Calceolus, Corallorhiza

11. Spathaceæ: Arum

Apetalæ — Graminibus adfines seu Gramineæ
1. Triglumes: Sparganium 2, Typha 2
2. Sexglumes: Acorus, Triglochin, Vallisneria, Scheuchzeria, Juncus 20
3. Uniglumes: Eriophorum 3, Scirpus 9, Mariscus 4, Cyperus 3, Carex 60

12. Biglumes, Gramina:
1. (calice nullo) Nardus, Homalocenchrus, Phoenix
2. cal. uniglumi: Tragus, Andropogon 2, Lolium 5
3. biglumi: Secale, Triticum 11, festuca 13, Sesleria 2, Poa 29, Avena 25, Bri[za]
Stipa, Arundo 10, Milium, Digitaria (Dactylis) 2, Phleum 5, Hordeum 6
4. folliculo uniglumi: Alopecurus 3
5. calice triglumi: Panicum 3. — ~~6. cal.~~
6. cal. pinnato: Cynosurus 2

13. Apetalæ 1. flor. utq. sexus conjunctis:
1. Vasculiferæ polyspermæ: Asarum, Chrysosplenium
6. Monospermæ: (diplostemones) Scleranthus 2; (anomala) Herniaria 2, Polygonum
(meiostemones) Alchemilla 4, Polycnemon, Blitum; (isostemones) Salsola, Th[...]
Chenopodium 11, Ulmus, Lapathum 12 (Oxalide)
2. Sexubus divisis in ead. planta
1. Polystemones: Ceratophyllum, Mercurialis 2, Laurus
2. 3. Diplostemones: Hippophae — Meiostemones: Zanichellia, Empetrum
4. Isostemones: Amaranthus, ficus, Lemna, Viscum, Buxus, Morus, Parieta[ria]
Urtica 2, Cannabis, Atriplex 2, Lupulus, Celtis, Taxus (Populus 3, Sa[lix])
5. flore composito: Xanthium
6. Juliferæ: fagus, Castanea, Juglans, Corylus, Quercus, Carpinus, Betula
7. Coniferæ: Pinus 6, Juniperus 2, Taxus, Ephedra

Caulifoliæ:
Equisetum 6, Chara 4
Epiphyllospermæ:
Ophioglossum, Osmunda, Struthiopteris, Filix 2, Asplenium 6, Polypodium 17
Adiantum *, Acrostichum 2
Musci:
Lycopodium 8, Sphagnum 4, Buxbaumia, Hypnum 69, Bryum 37, Mnium 22,
Blasia, Jungermannia 30, Marchantia 5, Anthoceros 2, Riccia 3, Hydroplace 4
Crustaceæ s. Lichenes 199 sc.
* Corniculati & Pyxidati 50, Coralloidei 14, Usneæ 8, Laciniati, Cyrrii 14, Antilyssi, Pulmonarii 16, Soræ 11, Nostoch 10, Scutellati Crustacei, Herpetes 39, Crustacei absq. scutellis Lepræ 20)
Filamentosæ: Byssus 8, Conferva 16, Tremella 3, Ulva
Fungi:
Mucilago 5, Fuligo 3, Embolus 3, Botrytis 3, Lycogala 5, Mucor 5, Aspergillus 6
Trichia 12, Lycoperdon 9, Sphæria 16, Clavaria 13, Puccinia 4, Ceratospermum 2,
Cyathus 2, Peziza 30, Boletus 2, Phallus, Agaricum 23, Polyporus 44, Echinus 10,
Merulius 4, Amanita 157
Zoophyta: Spongia *

alpibus ⋂ rupibus ⋂ collibus ⌒ locis singulis * vel aliquibus (nb. species omnes .... !
silvis △, ad in dumetis ad vias umbrosas △, in ruderibus ⋂ muris, lapidos.
udis ○, in aqua ▽, ad ripes ▽ in pratis humidis ⊟ torfaceis
pratis □; in stipulis arvis &c. ⊟ ad vias in cemeter. in hortis, vineis ⊞